

自然珍藏

AD

图鉴丛书

# 盆栽花草

365种观赏植物的彩色图鉴



海红豆



蒜香藤



非洲菊



矮斗菜



彩叶草



三色堇



石莲花



英冠玉



瓜叶菊

汕头大学出版社



自然珍藏 图鉴丛书

# 盆栽花草

- 365种常见的盆栽花草，以及可供食用、药用或改善家居环境的栽培花卉；
- 各种花卉的科属、拉丁学名、产地分布、习性的基本介绍，以及详尽的形态特征描述；
- 不同花卉在家居或庭院栽培、盆栽观赏以及食用、药用、材用等各方面应用的重点介绍；
- 近800帧精美的彩色图片，清晰展现植株外观及花朵、叶片、果实的局部特写；
- 丰富、完整、详尽的图文交互运用，提供最佳的辨识认知及必要的栽培花草指引；
- 详尽的目录（按科别排列）、拉丁学名索引以及中文名（按笔画顺序）索引。



ISBN 978-7-61120-134-3



9 787811 201543

定价：38.00元

上架建议：科普 生活 鉴赏



公元图书



自然珍藏图鉴丛书

# 盆栽花草

徐晔春 江 珊 主编

钟荣辉 孙光闻 副主编

崔晓东 邹春萍 马骁勇 任红云 曾沛芳 易永强 参编

徐晔春 孙光闻 等 摄影

汕头大学出版社

新平知覺



图书在版编目(CIP)数据

盆栽花草 / 徐晔春, 江珊主编. — 汕头: 汕头大学出版社, 2008.1 (2009.6重印)

ISBN 978-7-81120-154-3

I. 盆… II. ①徐…②江… III. 盆栽—花卉—观赏园艺 IV. S68

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第103546号

Copyright © 2008 Anno Domini Media Co. Ltd., Guangzhou

广州公元传播有限公司

All rights reserved

所有权利保留

图片代理:  www.fototee.com

## 盆栽花草

主 编 / 徐晔春 江 珊

责任编辑 / 胡开祥

特约编辑 / 蔡国才

装帧设计 / 唐 薇 王 勇

责任技编 / 姚健燕 刘春芳

出版发行 / 汕头大学出版社

广东省汕头市汕头大学内 邮编 515063

电话 0754-82903126

制 作 /  广州公元传播有限公司

印 刷 / 广州市一丰印刷有限公司

规 格 / 889mm × 1194mm 1/32开 7印张

版 次 / 2010年1月第2版第3次印刷

书 号 / 978-7-81120-154-3

定 价 / 38.00元

(咨询电话: 020-38865309)





# 前言 PREFACE

姿态万千、芳香醉人的花草，既可美化环境，又能陶冶情操。繁忙工作之余、茶余饭后之时，亲手栽种几盆花草，既可缓解紧张的生活压力，又可为生活增添情趣。养花已成为人们亲近自然、怡情养性时不可或缺的乐趣之一。

花卉除可用作家庭、办公室装饰及庭院栽培观赏外，还可供食用和药用，如木槿、桂花、槐花等做成的花粥，菊花、金银花、银杏等做成的茶饮，对人体健康有一定的保健作用；此外，一些花卉还能净化空气，如吊兰、芦荟等可吸收室内有毒气体，改善居家环境。

本书收录了365种盆栽花草，侧重室内栽培养护的品种，同时兼顾适合庭院及园林栽培的品种。科属按恩格勒系统进行划分，排序以科为单位，各科之间按英文字母排列，同科植物则按属的拉丁学名的第一个字母以英文字母排序。

本书除对收录花卉品种的中文名、别名、拉丁学名、形态特征、产地分布、习性等一一作出简要说明外，还着重介绍它们在栽培观赏、切花插花等方面的用途，同时配插了大量高清晰彩色图片，包括褪底主图、局部特写及原生态图等，使读者更全面地了解各种花卉的特征。

本书图文并茂，适合大专院校师生、园林工作者及花卉爱好者参考使用。

编著者

2008年1月





# 目录

## CONTENT

### 爵床科Acanthaceae

|            |    |
|------------|----|
| 红网纹草·····  | 10 |
| 白网纹草·····  | 10 |
| 嫣红蔓·····   | 11 |
| 金脉爵床·····  | 12 |
| 硬枝老鸦嘴····· | 12 |
| 大花老鸦嘴····· | 13 |
| 黑美人·····   | 13 |

### 铁线蕨科Adiantaceae

|          |    |
|----------|----|
| 铁线蕨····· | 14 |
|----------|----|

### 番杏科Aizoaceae

|          |    |
|----------|----|
| 生石花····· | 14 |
|----------|----|

### 苋科Amaranthaceae

|           |    |
|-----------|----|
| 大叶红草····· | 15 |
| 鸡冠花·····  | 15 |
| 千日红·····  | 16 |

### 石蒜科Amaryllidaceae

|           |    |
|-----------|----|
| 雷神·····   | 16 |
| 六出花·····  | 17 |
| 君子兰·····  | 17 |
| 文殊兰·····  | 18 |
| 南美水仙····· | 19 |
| 网球花·····  | 19 |
| 朱顶红·····  | 20 |
| 中国水仙····· | 20 |
| 洋水仙·····  | 21 |

### 番荔枝科Annonaceae

|          |    |
|----------|----|
| 鹰爪花····· | 21 |
|----------|----|

### 夹竹桃科Apocynaceae

|           |    |
|-----------|----|
| 软枝黄蝉····· | 22 |
| 黄蝉·····   | 22 |

|            |    |
|------------|----|
| 长春花·····   | 23 |
| 海芒果·····   | 24 |
| 狗牙花·····   | 25 |
| 飘香藤·····   | 25 |
| 夹竹桃·····   | 26 |
| 鸡蛋花·····   | 26 |
| 黄花夹竹桃····· | 27 |
| 金香藤·····   | 27 |
| 蔓长春·····   | 28 |

### 天南星科Araceae

|            |    |
|------------|----|
| 观音莲·····   | 28 |
| 海芋·····    | 29 |
| 红掌·····    | 29 |
| 火鹤花·····   | 30 |
| 花叶芋·····   | 30 |
| 花叶万年青····· | 31 |
| 龟背竹·····   | 31 |
| 仙洞万年青····· | 32 |
| 心叶蔓绿绒····· | 32 |
| 芙蓉莲·····   | 33 |
| 绿萝·····    | 33 |
| 星点藤·····   | 34 |
| 白鹤芋·····   | 34 |
| 绿巨人·····   | 35 |
| 合果芋·····   | 36 |
| 绒叶合果芋····· | 36 |
| 金钱树·····   | 37 |

### 五加科Araliaceae

|            |    |
|------------|----|
| 澳洲鸭脚木····· | 37 |
| 八角金盘·····  | 38 |
| 洋常春藤·····  | 38 |
| 常春藤·····   | 39 |



|                          |    |                           |    |
|--------------------------|----|---------------------------|----|
| 鹅掌柴·····                 | 39 | 火龙果·····                  | 57 |
| <b>南洋杉科Araucaria</b>     |    | 层云·····                   | 57 |
| 南洋杉·····                 | 40 | 黄翁·····                   | 58 |
| <b>萝藦科Asclepiadaceae</b> |    | 英冠玉·····                  | 58 |
| 马利筋·····                 | 40 | 仙人掌·····                  | 59 |
| 爱之蔓·····                 | 41 | 仙人指·····                  | 59 |
| 气球果·····                 | 41 | 蟹爪兰·····                  | 60 |
| 球兰·····                  | 42 | <b>桔梗科Campanulaceae</b>   |    |
| 夜来香·····                 | 43 | 风铃草·····                  | 60 |
| <b>铁角蕨科Aspleniaceae</b>  |    | 桔梗·····                   | 61 |
| 鸟巢蕨·····                 | 43 | <b>美人蕉科Cannaceae</b>      |    |
| <b>凤仙花科Balsaminaceae</b> |    | 大花美人蕉·····                | 61 |
| 新几内亚凤仙·····              | 44 | <b>白花菜科Capparidaceae</b>  |    |
| 凤仙花·····                 | 45 | 醉蝶花·····                  | 62 |
| 非洲凤仙花·····               | 45 | <b>忍冬科Caprifoliaceae</b>  |    |
| <b>秋海棠科Begoniaceae</b>   |    | 金银花·····                  | 62 |
| 丽格海棠·····                | 46 | <b>石竹科Caryophyllaceae</b> |    |
| 四季秋海棠·····               | 46 | 石竹·····                   | 63 |
| 秋海棠·····                 | 47 | <b>金粟兰科Chloranthaceae</b> |    |
| 球根秋海棠·····               | 47 | 珠兰·····                   | 64 |
| <b>紫葳科Bignoniaceae</b>   |    | <b>鸭跖草科Commelinaceae</b>  |    |
| 凌霄·····                  | 48 | 斑叶水竹草·····                | 64 |
| 炮弹树·····                 | 48 | 白雪姬·····                  | 65 |
| 叉叶木·····                 | 49 | 吊竹梅·····                  | 65 |
| 紫芸藤·····                 | 50 | 小蚌花·····                  | 66 |
| 蒜香藤·····                 | 50 | <b>菊科Compositae</b>       |    |
| 炮仗花·····                 | 51 | 西洋蓍草·····                 | 66 |
| 火焰木·····                 | 51 | 藿香蓟·····                  | 67 |
| 黄钟花·····                 | 52 | 重瓣玛格丽特·····               | 68 |
| 硬骨凌霄·····                | 52 | 雏菊·····                   | 68 |
| <b>木棉科Bombacaceae</b>    |    | 金盏菊·····                  | 69 |
| 木棉·····                  | 53 | 菊花·····                   | 70 |
| 美丽异木棉·····               | 53 | 瓜叶菊·····                  | 70 |
| 发财树·····                 | 54 | 蛇目菊·····                  | 71 |
| <b>凤梨科Bromeliaceae</b>   |    | 金鸡菊·····                  | 71 |
| 姬凤梨·····                 | 54 | 大丽花·····                  | 72 |
| 圆锥擎天·····                | 55 | 紫锥花·····                  | 73 |
| 莺哥凤梨·····                | 55 | 勋章菊·····                  | 73 |
| <b>仙人掌科Cactaceae</b>     |    | 非洲菊·····                  | 74 |
| 金琥·····                  | 56 | 紫鹅绒·····                  | 74 |
| 昙花·····                  | 56 | 向日葵·····                  | 75 |



|                          |    |                           |     |
|--------------------------|----|---------------------------|-----|
| 麦秆菊·····                 | 76 | 银边翠·····                  | 92  |
| 蓝目菊·····                 | 76 | 虎刺梅·····                  | 92  |
| 黑心菊·····                 | 77 | 布纹球·····                  | 93  |
| 桂圆菊·····                 | 77 | 一品红·····                  | 93  |
| 万寿菊·····                 | 78 | 红背桂·····                  | 94  |
| 孔雀草·····                 | 78 | 琴叶珊瑚·····                 | 95  |
| 南美蟛蜞菊·····               | 79 | 佛肚树·····                  | 95  |
| 百日草·····                 | 79 | <b>龙胆科Gentianaceae</b>    |     |
| <b>旋花科Convolvulaceae</b> |    | 紫芳草·····                  | 96  |
| 月光花·····                 | 80 | 洋桔梗·····                  | 96  |
| <b>景天科Crassulaceae</b>   |    | <b>牻牛儿苗科Geraniaceae</b>   |     |
| 玉树·····                  | 80 | 天竺葵·····                  | 97  |
| 石莲花·····                 | 81 | 蚊净香草·····                 | 97  |
| 趣蝶莲·····                 | 81 | <b>苦苣苔科Gesneriaceae</b>   |     |
| 长寿花·····                 | 82 | 毛萼口红花·····                | 98  |
| 鸡爪三七·····                | 82 | 美丽口红花·····                | 98  |
| 褐斑伽蓝·····                | 83 | 非洲紫罗兰·····                | 99  |
| 白菩提·····                 | 83 | 大岩桐·····                  | 99  |
| <b>十字花科Cruciferae</b>    |    | <b>金缕梅科Hamamelidaceae</b> |     |
| 紫罗兰·····                 | 84 | 红继木·····                  | 100 |
| <b>桫欏科Cyatheaceae</b>    |    | 红花荷·····                  | 100 |
| 笔筒树·····                 | 84 | <b>鸢尾科Iridaceae</b>       |     |
| <b>苏铁科Cycadaceae</b>     |    | 射干·····                   | 101 |
| 苏铁·····                  | 85 | 火星花·····                  | 102 |
| 鳞秕苏铁·····                | 86 | 小苍兰·····                  | 102 |
| <b>茅膏菜科Droseraceae</b>   |    | 唐菖蒲·····                  | 103 |
| 捕蝇草·····                 | 86 | 长葶鸢尾·····                 | 103 |
| <b>柿科Ebenaceae</b>       |    | 花菖蒲·····                  | 104 |
| 金弹子·····                 | 87 | 黄菖蒲·····                  | 104 |
| <b>杜英科Elaeocarpaceae</b> |    | <b>唇形科Labiatae</b>        |     |
| 尖叶杜英·····                | 87 | 彩叶草·····                  | 105 |
| <b>杜鹃花科Ericaceae</b>     |    | 齿叶薰衣草·····                | 106 |
| 西洋杜鹃·····                | 88 | 羽叶薰衣草·····                | 106 |
| 石楠杜鹃·····                | 88 | 薄荷·····                   | 107 |
| 毛鹃·····                  | 89 | 贝壳花·····                  | 107 |
| 杜鹃花·····                 | 90 | 蓝花鼠尾草·····                | 108 |
| <b>大戟科Euphorbiaceae</b>  |    | 一串红·····                  | 108 |
| 红尾铁苋·····                | 90 | <b>樟科Lauraceae</b>        |     |
| 红桑·····                  | 91 | 兰屿肉桂·····                 | 109 |
| 变叶木·····                 | 91 | <b>豆科Leguminosae</b>      |     |
|                          |    | 海红豆·····                  | 110 |



|       |     |
|-------|-----|
| 合欢    | 110 |
| 蔓花生   | 111 |
| 首冠藤   | 111 |
| 朱樱花   | 112 |
| 刺莢黄槐  | 112 |
| 开心果   | 113 |
| 紫荆    | 113 |
| 蝶豆    | 114 |
| 凤凰木   | 115 |
| 珊瑚刺桐  | 115 |
| 鸡冠刺桐  | 116 |
| 刺桐    | 117 |
| 香豌豆   | 117 |
| 含羞草   | 118 |
| 禾雀花   | 118 |
| 中国无忧树 | 119 |
| 紫藤    | 119 |

#### 百合科Liliaceae

|       |     |
|-------|-----|
| 不夜城芦荟 | 120 |
| 库拉索芦荟 | 120 |
| 文竹    | 121 |
| 蜘蛛抱蛋  | 122 |
| 吊兰    | 122 |
| 朱蕉    | 123 |
| 也门铁   | 123 |
| 山海带   | 124 |
| 巴西铁   | 124 |
| 千年木   | 125 |
| 百合竹   | 125 |
| 富贵竹   | 126 |
| 墨钗    | 126 |
| 萱草    | 127 |
| 风信子   | 128 |
| 火把莲   | 128 |
| 百合花   | 129 |
| 葡萄风信子 | 130 |
| 酒瓶兰   | 130 |
| 虎尾兰   | 131 |
| 郁金香   | 131 |

#### 马钱科Loganiaceae

|    |     |
|----|-----|
| 灰莉 | 132 |
|----|-----|

#### 千屈菜科Lythraceae

|    |     |
|----|-----|
| 紫薇 | 132 |
|----|-----|

|       |     |
|-------|-----|
| 大花紫薇  | 133 |
| 细叶雪茄花 | 133 |

#### 木兰科Magnoliaceae

|      |     |
|------|-----|
| 白兰花  | 134 |
| 紫花含笑 | 135 |
| 含笑   | 135 |
| 荷花玉兰 | 136 |
| 紫玉兰  | 136 |

#### 锦葵科Malvaceae

|     |     |
|-----|-----|
| 金铃花 | 137 |
| 蜀葵  | 137 |
| 芙蓉葵 | 138 |
| 木芙蓉 | 138 |
| 扶桑  | 139 |
| 木槿  | 140 |
| 锦葵  | 141 |

#### 竹芋科Marantaceae

|      |     |
|------|-----|
| 孔雀竹芋 | 141 |
| 苹果竹芋 | 142 |
| 波浪竹芋 | 142 |
| 紫背竹芋 | 143 |
| 水竹芋  | 143 |

#### 野牡丹科Melastomataceae

|     |     |
|-----|-----|
| 宝莲花 | 144 |
|-----|-----|

#### 楝科Meliaceae

|    |     |
|----|-----|
| 米兰 | 145 |
|----|-----|

#### 防己科Menispermaceae

|       |     |
|-------|-----|
| 金线吊乌龟 | 146 |
|-------|-----|

#### 桑科Moraceae

|     |     |
|-----|-----|
| 橡皮树 | 146 |
| 琴叶榕 | 147 |
| 榕树  | 147 |
| 薜荔  | 148 |
| 菩提树 | 148 |
| 桑   | 149 |

#### 芭蕉科Musaceae

|       |     |
|-------|-----|
| 旅人蕉   | 150 |
| 富红蝎尾蕉 | 150 |

#### 紫金牛科Myrsinaceae

|     |     |
|-----|-----|
| 虎舌红 | 151 |
| 朱砂根 | 152 |



|                           |     |  |  |
|---------------------------|-----|--|--|
| <b>桃金娘科Myrtaceae</b>      |     |  |  |
| 红果仔.....                  | 152 |  |  |
| 松红梅.....                  | 153 |  |  |
| 洋蒲桃.....                  | 153 |  |  |
| <b>猪笼草科Nepentheaceae</b>  |     |  |  |
| 猪笼草.....                  | 154 |  |  |
| <b>紫茉莉科Nyctaginaceae</b>  |     |  |  |
| 叶子花.....                  | 154 |  |  |
| 紫茉莉.....                  | 155 |  |  |
| <b>睡莲科Nymphaeaceae</b>    |     |  |  |
| 荷花.....                   | 156 |  |  |
| 萍蓬草.....                  | 156 |  |  |
| 睡莲.....                   | 157 |  |  |
| <b>木犀科Oleaceae</b>        |     |  |  |
| 迎春.....                   | 157 |  |  |
| 茉莉花.....                  | 158 |  |  |
| 桂花.....                   | 159 |  |  |
| 紫丁香.....                  | 159 |  |  |
| <b>柳叶菜科Onagraceae</b>     |     |  |  |
| 倒挂金钟.....                 | 160 |  |  |
| 山桃草.....                  | 160 |  |  |
| 美丽月见草.....                | 161 |  |  |
| <b>兰科Orchidaceae</b>      |     |  |  |
| 卡特兰.....                  | 161 |  |  |
| 大花蕙兰.....                 | 162 |  |  |
| 中国兰花.....                 | 162 |  |  |
| 石斛兰.....                  | 163 |  |  |
| 树兰.....                   | 163 |  |  |
| 文心兰.....                  | 164 |  |  |
| 兜兰.....                   | 165 |  |  |
| 鹤顶兰.....                  | 165 |  |  |
| 蝴蝶兰.....                  | 166 |  |  |
| 拟蝶唇兰.....                 | 166 |  |  |
| 万代兰.....                  | 167 |  |  |
| <b>酢浆草科Oxalidaceae</b>    |     |  |  |
| 紫叶酢浆草.....                | 167 |  |  |
| 阳桃.....                   | 168 |  |  |
| <b>棕榈科Palmae</b>          |     |  |  |
| 三药槟榔.....                 | 169 |  |  |
| 短穗鱼尾葵.....                | 170 |  |  |
| 袖珍椰子.....                 | 170 |  |  |
| 棕竹.....                   | 171 |  |  |
| <b>罂粟科Papaveraceae</b>    |     |  |  |
| 荷包牡丹.....                 | 171 |  |  |
| 花菱草.....                  | 172 |  |  |
| 虞美人.....                  | 172 |  |  |
| <b>松科Pinaceae</b>         |     |  |  |
| 雪松.....                   | 173 |  |  |
| <b>胡椒科Piperaceae</b>      |     |  |  |
| 西瓜皮椒草.....                | 173 |  |  |
| 红皱椒草.....                 | 174 |  |  |
| 圆叶椒草.....                 | 174 |  |  |
| 豆瓣绿.....                  | 175 |  |  |
| 荷叶椒草.....                 | 175 |  |  |
| 斑叶垂枝椒草.....               | 176 |  |  |
| <b>海桐科Pittosporaceae</b>  |     |  |  |
| 海桐.....                   | 176 |  |  |
| <b>白花丹科Plumbaginaceae</b> |     |  |  |
| 蓝雪花.....                  | 177 |  |  |
| <b>花荵科Polemoniaceae</b>   |     |  |  |
| 福禄考.....                  | 177 |  |  |
| <b>蓼科Polygonacea</b>      |     |  |  |
| 何首乌.....                  | 178 |  |  |
| <b>雨久花科Pontederiaceae</b> |     |  |  |
| 梭鱼草.....                  | 178 |  |  |
| <b>马齿苋科Porulacaceae</b>   |     |  |  |
| 太阳花.....                  | 179 |  |  |
| <b>报春花科Primulaceae</b>    |     |  |  |
| 仙客来.....                  | 179 |  |  |
| 欧洲报春.....                 | 180 |  |  |
| <b>凤尾蕨科Pteridaceae</b>    |     |  |  |
| 银脉凤尾蕨.....                | 180 |  |  |
| <b>石榴科Punicaceae</b>      |     |  |  |
| 石榴.....                   | 181 |  |  |
| <b>毛茛科Ranunculaceae</b>   |     |  |  |
| 耬斗菜.....                  | 182 |  |  |
| 欧洲银莲花.....                | 182 |  |  |
| 大花翠雀.....                 | 183 |  |  |
| 芍药.....                   | 183 |  |  |
| 牡丹.....                   | 184 |  |  |
| 花毛茛.....                  | 184 |  |  |



|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>蔷薇科Rosaceae</b>         |     |
| 桃花·····                    | 185 |
| 梅花·····                    | 186 |
| 棣棠·····                    | 186 |
| 火棘·····                    | 187 |
| 月季·····                    | 187 |
| 鸡麻·····                    | 188 |
| 硕苞蔷薇·····                  | 188 |
| 黄刺玫·····                   | 189 |
| 日本绣线菊·····                 | 190 |
| <b>茜草科Rubiaceae</b>        |     |
| 梔子·····                    | 190 |
| 白蟾·····                    | 191 |
| 龙船花·····                   | 191 |
| 六月雪·····                   | 192 |
| <b>芸香科Rutaceae</b>         |     |
| 鲁贝拉茵芋·····                 | 192 |
| 佛手·····                    | 193 |
| 九里香·····                   | 193 |
| <b>瓶子草科Sarraceniaceae</b>  |     |
| 瓶子草·····                   | 194 |
| <b>三白草科Saururaceae</b>     |     |
| 鱼腥草·····                   | 194 |
| <b>虎耳草科Saxifragaceae</b>   |     |
| 虎耳草·····                   | 195 |
| 八仙花·····                   | 195 |
| <b>玄参科Scrophulariaceae</b> |     |
| 心叶假面花·····                 | 196 |
| 金鱼草·····                   | 196 |
| 蒲包花·····                   | 197 |
| 吊钟柳·····                   | 198 |
| 炮仗竹·····                   | 198 |
| <b>茄科Solanaceae</b>        |     |
| 鸳鸯茉莉·····                  | 199 |
| 观赏辣椒·····                  | 199 |
| 黄瓶子花·····                  | 200 |
| 紫瓶儿花·····                  | 200 |
| 矮牵牛·····                   | 201 |
| 金杯藤·····                   | 201 |
| <b>梧桐科Sterculiaceae</b>    |     |
| 苹婆·····                    | 202 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>山茶科Theaceae</b>       |     |
| 山茶·····                  | 202 |
| 金花茶·····                 | 203 |
| <b>瑞香科Thymelaeaceae</b>  |     |
| 金边瑞香·····                | 204 |
| <b>旱金莲科Tropaeolaceae</b> |     |
| 旱金莲·····                 | 204 |
| <b>伞形科Umbelliferae1</b>  |     |
| 香菇草·····                 | 205 |
| <b>荨麻科Urticaccae</b>     |     |
| 冷水花·····                 | 205 |
| 圆叶冷水花·····               | 206 |
| <b>马鞭草科Verbenaceae</b>   |     |
| 杜虹花·····                 | 206 |
| 龙吐珠·····                 | 207 |
| 赧桐·····                  | 208 |
| 金叶假连翘·····               | 208 |
| 五色梅·····                 | 209 |
| 美女樱·····                 | 210 |
| <b>堇菜科Violaceae</b>      |     |
| 三色堇·····                 | 210 |
| <b>葡萄科Vitaceae</b>       |     |
| 地锦·····                  | 211 |
| <b>姜科Zingiberaceae</b>   |     |
| 红豆蔻·····                 | 211 |
| 益智·····                  | 212 |
| 瓷玫瑰·····                 | 212 |
| 姜花·····                  | 213 |
| 金姜花·····                 | 213 |
| <b>笔画索引·····</b>         |     |
| <b>拉丁学名索引·····</b>       |     |
| <b>参考文献·····</b>         |     |



|            |                                  |        |
|------------|----------------------------------|--------|
| 科属：爵床科网纹草属 | 学名： <i>Fittonia versaffeltii</i> | 别名：费通花 |
|------------|----------------------------------|--------|

红网纹草

**形态：**多年生常绿草本，株高10 ~ 20厘米。植株低矮，呈匍匐状。叶对生，卵圆形，红色叶脉纵横交替，形成网状。叶柄与茎上有茸毛，顶生穗状花序。花黄色。



**习性：**喜高温多湿和半阴环境，极不耐寒，冬季需阳光充足，但也怕强光暴晒，夏季需适当遮光。土壤以富含腐殖质的沙质壤土为佳。生长适温为20℃ ~ 30℃。



**应用：**适合盆栽观赏，可摆放于宾馆、商厦、橱窗及办公室；或吊盆用于点缀居室，摆放案几或窗台。

分布：原产南美秘鲁。主要分布于热带雨林中。

|            |                                                          |        |
|------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 科属：爵床科网纹草属 | 学名： <i>Fittonia versaffeltii</i> var. <i>argyroneura</i> | 别名：网格草 |
|------------|----------------------------------------------------------|--------|

白网纹草

**形态：**多年生常绿草本，株高10 ~ 20厘米。匍匐，叶对生，卵圆形，叶面密布白色网纹。叶柄、花梗、枝条均具绒毛。

**习性：**喜高温、多湿和半阴环境。不耐寒，忌强光，夏季不宜置于阳光充足的向阳处。土壤以富含腐殖质的沙质壤土为好。生长适温为20℃ ~ 30℃，夏季适当遮光。

**应用：**优良的室内阴生观叶植物，适合做小盆栽，常用于宾馆、商厦及居室书桌、案几或窗台装饰；也可用于吊挂装饰。



分布：原产南美秘鲁。主要分布于热带雨林中。



|            |                                    |            |
|------------|------------------------------------|------------|
| 科属：爵床科枪刀药属 | 学名： <i>Hypoestes phyllostachya</i> | 别名：红点草、溅红草 |
|------------|------------------------------------|------------|



嫣红蔓

**形态：**株高可达60厘米，枝条伸长后呈半蔓性。叶对生，卵形或长卵形，叶全缘，叶面橄榄绿色，布满粉红色或白色斑点。小型穗状花序，淡紫色，花期春季。

**习性：**喜温暖、湿润和半阴环境，忌强烈日光直射，夏季栽培适当遮阴。适宜深厚肥沃、透水、富含腐殖质的土壤。生长适温为20℃ ~ 30℃。

**应用：**多用于盆栽欣赏，适合居家、办公室等装饰欣赏；也可用于园林绿地、庭院及花坛、花台及大型容器栽培。

叶面布满粉红色或白色斑点



分布：原产马达加斯加。我国引种栽培。



|             |                              |             |
|-------------|------------------------------|-------------|
| 科属：爵床科黄脉爵床属 | 学名： <i>Sanchezia nobilis</i> | 别名：黄脉爵床、金叶木 |
|-------------|------------------------------|-------------|

# 金脉爵床

**形态：**常绿灌木，株高0.3 ~ 1米。叶对生，卵圆形叶脉具黄色条带，叶缘具细齿。花序顶生，花为管状，簇生于短花茎上，苞片红色。花期春季。

**习性：**喜温暖、湿润及半阴环境，也可耐强光，但不耐寒，低于5℃即会落叶。一般土壤均可生长良好。生长适温为22℃ ~ 30℃。

**应用：**色彩明艳，对比性强，南方多用于园林绿地及庭园，群植、片植或与植物配植均可；还可盆栽用于厅堂、会议室及办公室等。



分布：原产巴西、厄瓜多尔。我国南部至台湾省引入栽培。

|            |                              |              |
|------------|------------------------------|--------------|
| 科属：爵床科山牵牛属 | 学名： <i>Thunbergia erecta</i> | 别名：立鹤花、直立山牵牛 |
|------------|------------------------------|--------------|

# 硬枝老鸦嘴

**形态：**常绿灌木，株高1 ~ 2米，易分枝。叶对生，卵形至长卵形，叶近革质，先端渐尖，基部楔形至圆形，边缘具波状齿或不明显3裂。花单生于叶腋，花冠斜喇叭形，蓝紫色，喉管部为黄色。花期全年，以夏秋较盛。蒴果无毛，果柄长4厘米。

**习性：**喜高温高湿及阳光充足的环境，不耐寒，冬季不宜长期低于8℃。喜微酸性土壤，以肥沃、排水良好的沙质土壤为佳。

**应用：**花型奇特，适合公园、庭院丛植、片植，也可盆栽观赏。



分布：原产西非热带地区。我国各地引种栽培，以南方栽培为多。



|            |                                  |             |
|------------|----------------------------------|-------------|
| 科属：爵床科山牵牛属 | 学名： <i>Thunbergia grandflora</i> | 别名：大邓伯花、山牵牛 |
|------------|----------------------------------|-------------|

# 大花老鸦嘴

**形态：**木质大藤本，株高可达7米以上。叶对生，阔卵形，基部心形，先端渐尖，两面粗糙、有毛，叶缘有角或浅裂，叶柄无翅。总状花序，花大喇叭状，腋生，初花蓝色，盛花浅蓝色，末花近白。花期5 ~ 11月。

**习性：**适应性强，性喜高温多湿。以肥沃、透气、疏松、富含腐殖质的壤土或沙质土壤最佳。

**应用：**花型奇特，花期长，可作为大型棚架的攀缘材料，适合公园、小区、庭园等地的棚架应用。



分布：原产我国广东、海南、福建等地。多生于山地灌丛中，现我国南方栽培普遍。

|        |             |
|--------|-------------|
| 科属：爵床科 | 别名：披散爵床、弹簧草 |
|--------|-------------|

# 黑美人

**形态：**多年生常绿草本，丛生，株高5 ~ 15厘米。叶对生，暗黑色，心形或广卵形，微皱面卷曲。

**习性：**喜温暖、湿润的环境条件，喜光照充足，较耐阴，稍耐旱，不耐寒，应避免叶片因滞水隔夜而冻伤。对土壤要求不严，以富含腐殖质、排水良好的沙质土壤为佳。生长适温为20℃ ~ 30℃。

**应用：**多盆栽欣赏，适合置于案头、茶几等处，南方也可于庭院或作地被植物栽培。



分布：原产热带非洲。我国广东、台湾栽培较多。



|             |                                      |            |
|-------------|--------------------------------------|------------|
| 科属：铁线蕨科铁线蕨属 | 学名： <i>Adiantum capillus-veneris</i> | 别名：铁丝草、铁线草 |
|-------------|--------------------------------------|------------|



叶柄细长、坚硬，如铁丝

## 铁线蕨

**形态：**多年生常绿草本蕨类，株高15 ~ 40厘米。叶基生，叶柄细长、坚硬如铁丝，柄长5 ~ 20厘米，粗约1毫米。叶片卵状三角形，2 ~ 3回羽状细裂，小羽片近圆形或扇形，深绿色，有钝圆的粗缺刻。孢子囊群圆形，生于叶背面。

**习性：**喜温暖、湿润和半阴环境，不耐寒，忌阳光直射。喜疏松、肥沃和含石灰质的沙质壤土。

**应用：**① 适合小盆栽培和点缀山石盆景。小盆栽可置于案头、茶几上；较大盆栽可用于布置背阴房间的窗台、过道或客厅。② 叶片是良好的切叶材料及干花材料。③ 全草入药，用于治疗人畜疾病。



叶片卵状三角形

分布：原产热带美洲和亚热带地区，多生于石灰质或钙质土地区。

|            |                         |           |
|------------|-------------------------|-----------|
| 科属：番杏科生石花属 | 学名： <i>Lithops</i> spp. | 别名：石头花、曲玉 |
|------------|-------------------------|-----------|



## 生石花

**形态：**多年生常绿多肉多浆植物。茎短，二片叶肥厚对生，密接成缝状，形成半圆形或倒圆锥形的球体，灰绿色，成熟时自其顶部裂缝分成两个短而扁平或膨大的裂片。花从裂缝中央抽生，花大，单独座生，黄色，午后开放，花期4 ~ 6月。

**习性：**喜温暖、干燥和阳光充足环境，怕低温，耐高温，忌强光，怕水湿和霜冻。要求种植于排水良好的沙质壤土中。生长适温为20℃ ~ 25℃。



二片叶肥厚对生

**应用：**外形和色泽酷似彩色卵石，品种繁多，色彩丰富，是世界著名的小型多浆植物，常用于盆栽供室内观赏或布置专类园。

分布：原产非洲南部。广泛分布于南非干燥地区，多生于高原的茂盛草丛中。



科属：苋科莲子草属

biginosa 别名：红苋草、红龙草

# 大叶红草

**形态：**多年生草本，株高30 ~ 50厘米。叶对生，长椭圆形，茎叶紫红色，冬季开花，花乳白色，小球形。头状花序腋生，无柄。

**习性：**生性强健，喜温暖，耐湿、耐阴，耐寒，也耐热、耐旱、耐瘠薄、耐修剪。对土壤无特殊要求，一般土质均能生长。

**应用：**适合花坛、花台栽培，也可于庭园栽植，或在林缘下做背景材料，也适合小区、公路两侧绿化。



叶对生，长椭圆形

分布：原产热带和亚热带地区。现为园艺种，我国南方栽培较多。

科属：苋科青箱属

学名：Celosia cristata

别名：鸡冠苋、鸡冠、鸡冠头、红鸡冠、鸡公花

# 鸡冠花

**形态：**一年生草本，株高60 ~ 90厘米，全株无毛。茎直立，粗壮。单叶互生；长椭圆形至卵状披针形，先端渐尖，全缘，肉质穗状花序顶生或腋生，呈扁平鸡冠状，花被膜质。花色深红。

肉质穗状花序

也有黄、白及复色变种。花果期7 ~ 9月。

**习性：**喜光照充足和湿热气候条件，不耐寒，忌涝。喜肥沃、疏松排水良好的沙质土壤。生长适温为20℃ ~ 30℃。

**应用：**① 可用于布置花坛和花境，也可盆栽及作切花材料，也是庭园的优良草花。② 花及种子供药用，为收敛剂，有止血、凉血、止泻功能。



花序扁平鸡冠状



先端渐尖

分布：原产印度。现广布于温暖地区。



|           |                              |                       |
|-----------|------------------------------|-----------------------|
| 科属：苋科千日红属 | 学名： <i>Gomphrena globosa</i> | 别名：千日粉火球花、杨莓花、火球花、千年红 |
|-----------|------------------------------|-----------------------|

千日红

**形态：**一年生草本，株高30 ~ 60厘米。茎直立，全株密被白色柔毛。单叶对生，长椭圆形或矩圆状倒卵形，全缘。头状花序着生于顶端，球形，花小，两性，呈深红、紫红、粉红或白色。花期7 ~ 9月。

**习性：**性强健，喜温热干燥的气候。喜疏松肥沃、排水良好的土壤。对环境适合性强，生长适温为20℃ ~ 30℃。

**应用：**① 多用于花坛、花台、花境栽培欣赏，或植于林缘下作背景材料，也适合作切花

和干花。② 花序入药，有止咳定喘、平肝明目功效，主治支气管哮喘，急、慢性支气管炎，百日咳等。



单叶对生



紫红色花

分布：原产美洲热带地区。现我国南北各地广泛栽培。

|            |                                                       |          |
|------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 科属：石蒜科龙舌兰属 | 学名： <i>Agave potatorum</i> var. <i>verscheffeltii</i> | 别名：棱叶龙舌兰 |
|------------|-------------------------------------------------------|----------|

雷神

**形态：**多年生常绿多肉植物。叶倒卵状匙形，基生莲座状，灰白色或淡青色。叶端急尖，有长的尖刺，叶缘有浅波状齿。齿端具尖刺，红褐色或黄褐色。花黄绿色。本种属龙舌兰中的小型种，常见栽培的还有雷神锦。

雷神锦



**习性：**喜温暖干燥和阳光充足环境，适应性强，较耐寒，略耐阴，怕水涝。以排水良好、肥沃的沙壤土为好。生长适温为20℃ ~ 28℃。

**应用：**常用于盆栽观赏，适合家庭阳台、花架摆设；也常用来布置多肉植物专类园。

分布：原产墨西哥。



|            |                                    |         |
|------------|------------------------------------|---------|
| 科属：石蒜科六出花属 | 学名： <i>Alstroemeria aurantiaca</i> | 别名：秘鲁百合 |
|------------|------------------------------------|---------|

六出花

**形态：**具肉质须根，株高0.5 ~ 1米。叶片多数散生，披针形，表面亮绿色。伞形花序，花橙黄色，具紫色斑点和条纹，现栽培的均为园艺种。花期夏季。

**习性：**喜凉爽、湿润环境，忌炎热，较耐阴，不耐旱。要求肥沃、疏松排水良好的沙壤土。六出花生长环境差异较大，不同种之间对环境要求有所不同。



花橙黄色，具紫色斑点和条纹



伞形花序

**应用：**① 适于布置花坛和花镜，也适合庭园栽培，还可用于盆栽观赏及装饰居室或宾馆大堂。② 应用较广泛的切花花卉。

分布：原产南美洲。丘陵、沙漠、山谷及森林均有分布。

|            |                           |               |
|------------|---------------------------|---------------|
| 科属：石蒜科君子兰属 | 学名： <i>Clivia miniata</i> | 别名：大花君子兰、大叶石蒜 |
|------------|---------------------------|---------------|

君子兰

**形态：**多年生常绿草本，株高30 ~ 50厘米。假鳞茎短而粗。叶片扁平带状，光亮、常绿。伞状花序生于花葶顶部，小花漏斗形，花橘红色。浆果，圆形，成熟后红色，花期冬季及春季，果期春、夏。

**习性：**喜冷凉、湿润、通风良好的环境，怕冷畏热。春、秋、冬应阳光充足，夏季应适当遮阴。以湿润、富含腐殖质、通透性良好的土壤为佳。生长适温为10℃ ~ 25℃。

**应用：**园林极少应用，可用于布置温室，常于室内栽培，以装饰客厅、居室及宾馆大堂、客房等场所。



浆果，圆形

花橘红色



叶片扁平带状

分布：原产南非，原生种多生于南非南部温暖干旱的森林地区。我国均室内栽培观赏。



|            |                                                 |                  |
|------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 科属：石蒜科文殊兰属 | 学名： <i>Crinum asiaticum</i> var. <i>sinicum</i> | 别名：十八学士、文珠兰、白花石蒜 |
|------------|-------------------------------------------------|------------------|



# 文殊兰

**形态：**多年生常绿草本。鳞茎粗壮，呈长圆柱形，叶宽带状或剑形，基部抱茎，叶脉平行。花葶从叶丛中抽出，伞形花序顶生，外具大苞片两枚；花白色、具浓香，花被片线形。花期5 ~ 10月。蒴果球形。常见栽培的品种有红花文殊兰。

**习性：**喜温暖湿润气候，夏季忌烈日曝晒，也不耐严寒。耐盐碱土，盆栽宜用腐殖质丰富的培养土。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**① 多用于园林绿地，可植于林缘、水岸、路边等地，也可植于小区、校园欣赏，还可作盆花观赏，观花赏叶两相宜。② 叶与鳞茎药用，有活血散瘀、消肿止痛功效，对跌打损伤、风热头疼、疮毒有一定疗效。

分布：原产我国福建、广东、台湾及广西等省，多生于海滨或河旁沙地。



|             |                                 |          |
|-------------|---------------------------------|----------|
| 科属：石蒜科南美水仙属 | 学名： <i>Eucharis grandiflora</i> | 别名：亚马逊百合 |
|-------------|---------------------------------|----------|

南美水仙

**形态：**多年生草本，具被膜球茎。叶片宽大，深绿色有光泽。顶生伞形花序，花冠筒圆柱形，中央生有一个副花冠，花瓣开展呈星状。花为纯白色，有芳香。花期冬春季。



深绿色  
有光泽



花为纯  
白色

**习性：**性喜高温多湿和散射光环境，忌强光暴晒，也不耐寒。适宜生长在疏松肥沃和排水良好的沙质壤土中。生长适温为20℃ ~ 30℃。

**应用：**① 暖地可在户外栽培，应用于花境、花坛或作冬、春温室盆栽观花植物。② 可作切花。

花冠筒圆柱形

分布：原产哥伦比亚和秘鲁。

|            |                                   |             |
|------------|-----------------------------------|-------------|
| 科属：石蒜科网球花属 | 学名： <i>Haemanthus multiflorus</i> | 别名：火球花、网球石蒜 |
|------------|-----------------------------------|-------------|

网球花

**形态：**多年生落叶球根草本，地下具鳞茎，扁球形。叶3 ~ 4枚，长圆形，全缘，叶柄短。花先叶开放，花茎直立，伞形花序顶生，呈球状，着花数十朵，红色，花丝红色，伸出花被之外。浆果红色。花期夏季。



花红色

**习性：**喜温暖、湿润的环境，喜充足的散射光，忌强光。以疏松、排水良好的沙质土壤为佳。

**应用：**花型奇特，观赏性佳，有较强的装饰性，可用于园林绿地的草地边缘、山石边、水畔种植，也适合花坛、花境栽培，还可盆栽欣赏。

叶长圆形

分布：原产非洲热带。我国引种栽培。



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|------------|
| 科属：石蒜科朱顶红属                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 学名： <i>Hippeastrum rutilum</i>                     | 别名：百枝莲、华胥兰 |
| <div><div><div><h3>朱顶红</h3><p><b>形态：</b>多年生球根草本，具肥大的鳞茎，近球形。叶从鳞茎抽生，叶片呈带状，两列状着生，扁平淡绿。花茎也从鳞茎抽出，绿色粗壮、中空。伞形花序着生花茎顶端，喇叭形，有红色、红色带白条纹、白色带红条纹等。</p><p><b>习性：</b>喜温暖、湿润和阳光充足的环境，不耐寒，怕水涝。喜疏松、富含有机质、排水良好的土壤。生长适温为18℃ ~ 25℃。</p><p><b>应用：</b>① 除盆栽观赏以外，还可配植露地庭园形成群落景观，也适合园林绿地应用，多植于路边、山石旁、池畔观赏。② 鳞茎入药，具有活血解毒、散瘀消肿的功效。</p><p>分布：原产巴西。现我国南北栽培广泛。</p></div><div><p>叶片呈带状</p></div><div><p>鳞茎肥大，近球形</p></div></div></div>                               |  |                                                    |            |
| 科属：石蒜科水仙属                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 学名： <i>Narcissus tazetta</i> var. <i>chinensis</i> | 别名：水仙、天蒜   |
| <div><div><div><h3>中国水仙</h3><p><b>形态：</b>多年生球根草本，株高20 ~ 40厘米。鳞茎肥大，卵圆形，外被棕褐色。叶狭长而扁平。伞房花序着花4 ~ 8朵，花被6片，白色，内有杯状黄色副冠，具芳香。有单瓣及重瓣，重瓣香味不及单瓣浓郁。花期1 ~ 2月。</p><p><b>习性：</b>喜阳光充足、温暖、湿润的环境，忌酷热，喜凉爽，较耐寒。对土壤要求较严，以湿润、肥沃、排水良好的土壤为佳。</p><p><b>应用：</b>① 花香淡雅，适合盆栽、地栽观赏；对氯化氢、二氧化硫等有害气体有一定的抗性。② 可提炼芳香油。③ 鳞茎内含有生物碱，有毒，入药，外科用作镇痛剂，鳞茎捣烂敷于患处可治疗痈肿。</p><p>分布：原产我国、日本及朝鲜等地。我国浙江、福建沿海岛屿有野生。</p></div><div><p>鳞茎肥大</p></div><div><p>花白色</p></div></div></div> |  |                                                    |            |



|           |                                       |        |
|-----------|---------------------------------------|--------|
| 科属：石蒜科水仙属 | 学名： <i>Narcissus pseudo-narcissus</i> | 别名：黄水仙 |
|-----------|---------------------------------------|--------|

叶片线形  
或披针形

洋水仙



**形态：**球根草本，株高20 ~ 30厘米。叶片4 ~ 6片，从鳞茎抽出，直立向上，线形或披针形。花单生，花茎高约30厘米，花顶生，着花1朵，花黄色。花期春季。

**习性：**喜冷凉，忌高温多湿，较耐寒，不耐热，在中原一带可露地越冬。生育适温为10℃ ~ 20℃。对土壤要求不严，土壤以富含有机质的微酸性沙质土壤为佳。

**应用：**花色艳丽，观赏性强，为春节重要的年宵花卉，适合置于阳台、案几及卧室盆栽观赏，也可用于布置庭院或园林小径。



花黄色

分布：原产地中海沿岸地区，我国引种栽培。

|             |                                   |           |
|-------------|-----------------------------------|-----------|
| 科属：番荔枝科鹰爪花属 | 学名： <i>Artabotrys hexapetalus</i> | 别名：鹰爪、鹰爪兰 |
|-------------|-----------------------------------|-----------|

鹰爪花

**形态：**常绿攀缘灌木，株高约4米。单叶互生，长圆形或阔披针形。花淡绿或淡黄色，芳香，1 ~ 2朵生于钩状总花梗上，花期5 ~ 8月。浆果卵圆形，果期6 ~ 12月。

**习性：**喜温暖、湿润气候，喜光照，也耐阴。以疏松、肥沃排水良好的土壤为佳。生长适温为20℃ ~ 30℃。

**应用：**① 优良的棚架植物，也可作绿篱或修剪成独立观赏树，多用于庭园花架、花墙，也可与假山石配植。  
② 含芳香油，可提制浸膏，用于香水化妆品和皂用的香精原料，也可用于熏茶。③ 根入药，可治疗疟疾。



花淡绿或淡黄色



浆果卵圆形



单叶互生

分布：原产我国、印度、斯里兰卡、越南、泰国、印尼及菲律宾等国。分布较广。



|            |                                 |       |
|------------|---------------------------------|-------|
| 科属：夹竹桃科黄蝉属 | 学名： <i>Allamanda cathartica</i> | 别名：黄莺 |
|------------|---------------------------------|-------|

软枝黄蝉

**形态：**常绿蔓性藤本。枝长而软，长达4米以上，向下俯垂。叶轮生或对生全缘，叶片倒卵状披针形或长椭圆形，先端渐尖。聚伞花序顶生，花冠漏斗状，黄色，喉部白色，基部不膨大。蒴果球形。花期4 ~ 8月，果期冬季。

**习性：**喜高温、多湿及阳光充足的环境，耐热、不耐寒。以富含腐殖质之壤土或沙质壤土为佳。生长适温为18℃ ~ 30℃。

**应用：**盆栽观赏或庭园美化、围篱美化、花棚、花廊、花架、绿篱等攀爬栽培。

**注意：**植株乳汁、树皮和种子有毒，人畜误食会引起腹痛、腹泻。



分布：原产巴西至中美洲。我国引进栽培，现世界热带地区栽培普遍。

|            |                                 |        |
|------------|---------------------------------|--------|
| 科属：夹竹桃科黄蝉属 | 学名： <i>Allamanda neriifolia</i> | 别名：黄兰蝉 |
|------------|---------------------------------|--------|

黄蝉

**形态：**常绿直立或半直立灌木，株高1 ~ 2米。叶轮生，椭圆形或倒披针状矩圆形，全缘，被短柔毛，叶脉在下面隆起。聚伞花序顶生，花冠黄色，漏斗形，中心有红褐色条纹斑。蒴果球形。花期5 ~ 8月，果期11 ~ 12月。

**习性：**生性强健，喜光照，喜温暖、湿润气候，不耐寒。以肥沃、排水良好的土壤为佳。生长适温为20℃ ~ 30℃。

**应用：**可盆栽欣赏，也适合庭院栽培观赏；园林中常用于路边及林缘下绿化。

**注意：**植株乳汁有毒，人畜中毒会刺激心脏，使循环系统及呼吸系统受阻，妊娠动物误食会流产。



分布：原产巴西。我国南方庭院栽培较多，北方温室栽培，现广植于热带及亚热带地区。



|             |                                |                        |
|-------------|--------------------------------|------------------------|
| 科属：夹竹桃科长春花属 | 学名： <i>Catharanthus roseus</i> | 别名：雁来红、日日新、日日春、山矾花、五瓣梅 |
|-------------|--------------------------------|------------------------|



## 长春花

**形态：**常绿多年生草本或亚灌木，株高30～50厘米。茎直立，多分枝。叶对生，长椭圆形，叶柄短，全缘，深绿具光泽。聚伞花序顶生，花冠高脚蝶状，花玫瑰红、白色、粉红色或紫红色。花期7～10月。

**习性：**喜光，喜高温，耐半阴，怕严寒，忌水湿。对土壤要求不严，宜肥沃和排水良好的壤土，忌土壤粘重及碱性。

**应用：**① 常用于布置花坛、花境，多片植，也适合庭院栽培及盆栽室内观赏。  
② 植株含有长春花硷，药用，有降低血压的功效，还可用于治疗肿瘤。



分布：原产非洲东部。我国西南、中南及华东等省区栽培较多，现广植于热带及亚热带地区。



|             |                           |                |
|-------------|---------------------------|----------------|
| 科属：夹竹桃科海芒果属 | 学名： <i>Cerbera mangha</i> | 别名：牛金茄、黄金茄、牛心荔 |
|-------------|---------------------------|----------------|

# 海芒果

**形态：**常绿乔木，株高4 ~ 8米。枝粗壮，全株具乳汁。叶披针形，厚纸质，倒卵状长圆形或倒卵状披针形，稀长圆形，两端均渐狭。聚伞花序，花白色，喉部红色，芳香。核果，椭圆形或卵圆形，橙黄色。花期6 ~ 7月，果期7月至翌年4月。

**习性：**喜光照、高温、高湿环境，稍耐干旱和盐碱，较耐半阴。对土质无特殊要求，喜排水良好的沙质土壤。生长适温为20℃ ~ 32℃。

**应用：**① 树型优美，花美而芳香，适于道路绿化，或用于公园、庭园、小区及水景边栽培观赏，也适合大型盆栽欣赏。② 树皮、叶、乳汁可药用，有催吐、下泻、堕胎效用。

**注意：**果皮含有海芒果碱、毒性苦味素、生物硷及氰酸，毒性强，人、畜误食可致死。



花白色，  
喉部红色



全株具乳汁

分布：原产我国南部。印度及澳大利亚也有分布。



|             |                                                 |                            |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 科属：夹竹桃科狗芽花属 | 学名： <i>Ervatamia divaricata</i> cv.<br>Gouyahua | 别名：马蹄香、白狗花、<br>狮子花、豆腐花、白狗蹄 |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------|

## 狗牙花

**形态：**常绿灌木，株高3米，多分枝，无毛，有乳汁。单叶对生，长椭圆形，两端尖，全缘，光亮，叶坚纸质，叶面绿色，背面淡绿色。聚伞花序腋生，通常双生，花白色，高脚碟状。蓇葖果，长圆形。花期6 ~ 11月，果实秋季。

**习性：**性喜温暖湿润，不耐寒，宜半阴。  
对土壤要求不严，喜肥沃、排水良好的酸性土壤。生长适温为20℃ ~ 28℃。

**应用：**① 为著名的香花树种，适合公园、小区绿化，也可栽培于庭院，还可盆栽欣赏。② 叶可入药，有降低血压的功效，民间常用来治疗眼病、疮疥、癫狗咬伤等症；根可治头痛及骨折。



分布：原产我国南部沿海诸省。现我国南部各省区栽培较多。

|              |                               |               |
|--------------|-------------------------------|---------------|
| 科属：夹竹桃科巴西素馨属 | 学名： <i>Mandevilla sanderi</i> | 别名：双喜藤、文藤、红皱藤 |
|--------------|-------------------------------|---------------|


## 飘香藤

**形态：**多年生常绿藤本。叶对生，全缘，长卵圆形，先端急尖，革质，叶面有皱褶，叶色浓绿并富有光泽。花腋生，花冠漏斗形，花有红色、桃红色、粉红等色，花期主要为夏、秋两季。

**习性：**喜温暖、湿润及阳光充足的环境，稍耐阴。对土壤的适应性较强，但以富含腐殖质、排水良好的沙质壤土为佳。

**应用：**可用于篱垣、棚架、天台、小型庭院美化；也适合室内盆栽，可置于阳台做成球形及吊盆观赏。

分布：原产中南美洲。本种为园艺种。





|             |                           |                  |
|-------------|---------------------------|------------------|
| 科属：夹竹桃科夹竹桃属 | 学名： <i>Nerium indicum</i> | 别名：桃红、半年红、柳叶桃、柳桃 |
|-------------|---------------------------|------------------|

# 夹竹桃

**形态：**常绿灌木或小乔木，株高约5米。叶革质轮生或对生。聚伞花序顶生，线状披针形。花冠漏斗状，花色有桃红色、白色、粉红色和黄色等。花期几乎全年，夏、秋最盛。果期冬、春两季，一般较少结果。

**习性：**喜光，喜温暖湿润气候，不耐寒，忌水渍，耐干旱。适生于排水良好、肥沃的中性土壤，微酸性、微碱土也能适应。生长适温为22℃ ~ 32℃。



聚伞花序顶生



对生叶

**应用：**① 园林绿化的重要树种，也是庭院栽培的优良观花植物，丛植、群植、片植均可；还可用于大型花盆盆栽欣赏。② 种子含油，可用作润滑油。

**注意：**叶、皮、根、花、种子含有多种配糖体，毒性强，人、畜误食可致死。叶、茎皮可提制强心剂，有毒，慎用。

分布：原产印度、伊朗及尼泊尔等地。我国栽培较普遍，现广植于热带及亚热带地区。

|             |                                                 |           |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 科属：夹竹桃科鸡蛋花属 | 学名： <i>Plumeria rubra</i> cv. <i>Acutifolia</i> | 别名：缅栀、蛋黄花 |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|

# 鸡蛋花

**形态：**落叶灌木或小乔木，株高可达4米。小枝肥厚多肉。叶互生，有柄，披针形，簇生于枝头顶端，全缘，两端尖。聚伞花序顶生，花冠筒状，花瓣外白内黄，具有浓郁的芳香，花期5 ~ 10月。

**习性：**性喜阳光充足和温暖湿润的环境，不耐寒，稍耐阴，耐干旱。需排水良好的肥沃土壤。生长适温为23℃ ~ 32℃。

**应用：**① 适于热带地区园林绿化、庭院布置，也可盆栽观赏。② 广东、广西民间常用其花晒干泡茶饮用，具有解毒、润肺的功能，可治湿热下痢。



叶全缘，  
两端尖



花瓣外白内黄

分布：原产热带美洲。广植于亚洲热带及亚热带地区，我国南方栽培普遍。



|               |                               |                |
|---------------|-------------------------------|----------------|
| 科属：夹竹桃科黄花夹竹桃属 | 学名： <i>Thevetia peruviana</i> | 别名：酒杯花、断肠草、柳木子 |
|---------------|-------------------------------|----------------|

黄花夹竹桃



核果扁三角状球形

**形态：**常绿灌木或小乔木，株高达4 ~ 5米。树皮暗褐色。单叶互生，狭披针形，近革质，全缘，叶表面亮绿色，叶背面淡绿色。聚伞花序，顶生或腋生，花黄色，漏斗状，芳香。花期5 ~ 8月。核果扁三角状球形，果期8月至翌年3月。

**习性：**喜温暖、湿润、光照充足的环境。不耐寒，耐湿，耐干旱，耐半阴，抗风，抗大气污染。以疏松肥沃、排水良好的微酸性土壤上生长较好。

**应用：**① 多用于公园、庭园绿化观赏，丛植、单植或墙边种植均可；也适宜盆栽观赏。② 种子可用于榨油，果仁含有黄花夹竹桃素，具有强心、利尿、祛痰、发汗、催吐的作用。

**注意：**树液和种子有毒，误食可致命。



花黄色

单叶互生，狭披针形

分布：原产美洲热带地区。现我国台湾、福建、广东、广西及云南栽培较多，有时野生。

|         |                            |        |
|---------|----------------------------|--------|
| 科属：夹竹桃科 | 学名： <i>Urachites lutea</i> | 别名：蛇尾蔓 |
|---------|----------------------------|--------|

金香藤

**形态：**常绿缠绕性蔓性藤本，茎有白色乳汁。叶对生，椭圆形，先端圆或微突，全缘，革质，富有光泽。花腋生，花冠黄色，漏斗形。花期春至秋季。

**习性：**喜光照，喜湿润，忌长期积水。栽培应置于光线充足的地方，过荫开花减少。土壤以疏松、肥沃的沙质壤土为佳。生长适温为22℃ ~ 30℃。

**应用：**叶色翠绿，花色鲜艳，可供小型花架、庭院的栅栏、窗前的绿化；也适合盆栽欣赏。



花冠黄色，漏斗形



分布：原产美国及西印度群岛。现我国南方部分省区有引进栽培。



|              |                        |             |
|--------------|------------------------|-------------|
| 科属：夹竹桃科蔓长春花属 | 学名： <i>Vinca major</i> | 别名：长春蔓、锦蔓长春 |
|--------------|------------------------|-------------|

蔓长春

**形态：**常绿蔓性半灌木，矮生、匍匐生长，长达2米以上。叶椭圆形，全缘对生，有叶柄，亮绿色，有光泽，叶缘乳黄色。小花蓝色，花期4 ~ 5月。常见变种有花叶蔓长春。

**习性：**性喜温暖湿润，喜阳光，也较耐阴，稍耐寒。对土壤要求不严，喜欢生长在深厚肥沃、湿润的土壤中。生长适温为20℃ ~ 28℃。

**应用：**在园林中常用于地被及垂直景观，也可吊盆栽培布置于室内或窗前、阳台。



分布：原产欧洲。现我国以江浙、云南、台湾栽培为多，广东有少量栽培。

|            |                               |              |
|------------|-------------------------------|--------------|
| 科属：天南星科海芋属 | 学名： <i>Alocasia amazonica</i> | 别名：美叶芋、黑叶观音莲 |
|------------|-------------------------------|--------------|

观音莲

**形态：**多年生常绿草本。叶箭形盾状，先端尖，叶缘有5 ~ 7个大型齿状缺刻，叶面墨绿色，叶脉银白色，叶背紫褐色。花序肉穗状，佛焰苞白色。花期初夏。

**习性：**喜高温多湿和半阴环境，耐寒力差，忌强光直射和土壤干燥。要求土壤疏松肥沃和排水良好。生长适温为20℃ ~ 30℃。

**应用：**盆栽观赏，适宜摆放客厅、卧室及几案之上欣赏，也适合于办公室、宾馆等装饰应用。



分布：原产亚洲热带。我国各地均有栽培。



|            |                                |                             |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 科属：天南星科海芋属 | 学名： <i>Alocasia macrorhiza</i> | 别名：滴水观音、广东狼毒、野芋、独脚莲、老虎芋、象耳芋 |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|


海芋

**形态：**多年生草本，高约3 ~ 5米。茎肉质粗壮；叶盾状，着生于茎顶，阔卵形，叶柄粗壮，基部扩大而抱茎。总花梗成对由叶鞘中抽出；佛焰苞上部舟状，先端锐尖；肉穗花序短于佛焰苞，雌花位于下部，雄花位于上部。浆果淡红色。花期4 ~ 5月，果期6 ~ 7月。

**习性：**喜高温多湿的半阴环境，忌烈日。以肥沃疏松的沙质土为佳。

**应用：**①可作庭院栽培，可栽植在池边、假山旁较荫蔽处，也适合用大盆栽植布置会议室、大客厅等。②根茎入药，可治疗腹痛、霍乱、疝气等，还可治疗肺结核、关节炎、气管炎、流感、伤寒等，外用可治疗疗疮肿毒、蛇虫咬伤、烫伤等。

**注意：**植株有毒，忌误食。



分布：原产我国华南和西南，常成片生于林缘、河谷、溪畔等潮湿的地方。


|            |                                 |               |
|------------|---------------------------------|---------------|
| 科属：天南星科花烛属 | 学名： <i>Anthurium andraeanum</i> | 别名：安祖花、花烛、蜡烛花 |
|------------|---------------------------------|---------------|

红掌

**形态：**多年生常绿草本，株高30 ~ 50厘米。茎短；叶革质，叶具长柄，单生，心形，鲜绿色。花葶自叶腋抽出，革质，正圆状卵圆形，橙红或猩红色，也有粉、白等其他颜色，肉穗花序黄色，在佛焰苞之上。周年开花。

**习性：**喜温暖、荫蔽、湿润，忌炎热，怕阳光直射，不耐寒，喜肥而忌盐碱。要求疏松透气、排水良好、富含腐殖质微酸性土壤。生长适温为15℃ ~ 30℃。

**应用：**主要作切花及盆栽观赏，盆栽可装饰客厅、卧室，也可用于会议室、办公室、宾馆大堂欣赏。



分布：原产美洲热带。我国栽培较多，现栽培的均为园艺种。



|            |                                    |            |
|------------|------------------------------------|------------|
| 科属：天南星科花烛属 | 学名： <i>Anthurium scherzerianum</i> | 别名：红鹤芋、红苞芋 |
|------------|------------------------------------|------------|

火鹤花

**形态：**多年生常绿草本。叶革质，长圆形，先端尖。花序肉穗状，橙红色，螺旋状卷曲，佛焰包卵形，红色。自然花期2 ~ 7月。

**习性：**性喜高温高湿，忌阳光直射，对基质要求较高，可用附生类型基质栽培，怕寒冷，越冬温度以8℃以上为佳。

盆栽宜选用腐叶土或泥炭土、苔藓加少量园土和木炭以及过磷酸钙的混合基质。

**应用：**主要盆栽观赏，适合家庭、宾馆大堂等应用，也可用于园林绿地配植。



分布：原产美洲。

|             |                             |            |
|-------------|-----------------------------|------------|
| 科属：天南星科五彩芋属 | 学名： <i>Caladium bicolor</i> | 别名：彩叶芋、两色芋 |
|-------------|-----------------------------|------------|

花叶芋

**形态：**多年生常绿草本，株高30 ~ 50厘米。基生叶，心形或箭形，绿色，具白色或红色斑点。佛焰苞白色，肉穗花序黄至橙黄色。

**习性：**喜高温、湿润、光照充足环境，也耐半阴，忌阳光曝晒和空气干燥，不耐寒。要求肥沃、疏松、排水良好的微酸性土壤。

**应用：**小型盆栽可置于矮几或桌面上用于装饰。大盆可用于阳台、窗台美化。



分布：原产西印度群岛及巴西。



|               |                                |                |
|---------------|--------------------------------|----------------|
| 科属：天南星科花叶万年青属 | 学名： <i>Dieffenbachia picta</i> | 别名：细斑粗肋草、银斑万年青 |
|---------------|--------------------------------|----------------|

# 花叶万年青

**形态：**多年生常绿灌木状草本。茎粗壮，直立，高达1米。叶矩圆形至矩圆状披针形，尖端光滑，绿色，具不规则白色或淡黄色斑块。肉穗花序圆柱形，直立，先端稍弯垂，花序柄短，隐藏于叶丛之中。佛焰苞卵圆形。



肉穗花序  
圆柱形

**习性：**喜温暖、多湿和半阴环境，不耐干旱。要求肥沃、疏松、排水良好的酸性土壤。生长适温为20℃ ~ 32℃。

**应用：**品种较多，是重要的观叶植物，可用于室内盆栽观赏，也可用于园林绿地。



叶尖端光滑，绿色

分布：原产南美。我国广东、福建栽培较多，在部分地区已逸为野生。

|             |                               |                |
|-------------|-------------------------------|----------------|
| 科属：天南星科龟背竹属 | 学名： <i>Monstera deliciosa</i> | 别名：龟背芋、电线莲、蓬莱蕉 |
|-------------|-------------------------------|----------------|

# 龟背竹

**形态：**多年生常绿蔓性藤本。茎粗壮，具气生根。叶大型，厚革质，叶心形或歪斜长卵形，全缘或羽状深裂，叶片上有不规则的孔洞，表面发亮，淡绿色，背面绿白色。肉穗花序，淡黄色。花后结实，浆果淡黄色。花期8 ~ 9月，果实于翌年花期后成熟。

**习性：**喜温暖、湿润的环境，不耐寒，喜充足的散射光，忌强光。以肥沃、排水良好的沙质壤土为佳。

**应用：**① 园林中可植于山石旁任其攀爬，或植于大型棚架边，也适合盆栽置于客厅、阳台栽培欣赏。  
② 花序可食，常具麻味。



叶心形或歪斜长卵形



肉穗花序，淡黄色

分布：原产墨西哥和中美洲。我国广东、广西、云南、福建等地常露地栽培，北方均植于温室。



|             |                                                  |                |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------|
| 科属：天南星科龟背竹属 | 学名： <i>Monstera oblique</i> var. <i>expilata</i> | 别名：多孔龟背竹、迷你龟背竹 |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------|

## 仙洞万年青

**形态：**多年生蔓性草本。茎基部多节，多有分枝。叶片鲜绿，纸质，卵状椭圆形，叶片上有数量不等的穿孔。

**习性：**喜温暖湿润环境，较耐阴，不耐低温，忌强光暴晒和干燥。要求土质肥沃、排水透气性能良好。

**应用：**株形小巧，为家庭居室常见的盆栽或水培观叶花卉，适合装饰客厅、案几及卧室，也可用于攀缘栽培观赏，常用于装饰厅堂、会议室、走廊及办公室；切叶可用于插花。



叶片上有数量不等的穿孔

叶片鲜绿，纸质

分布：原产哥斯达黎加。我国各地引种作室内观叶植物。

|             |                                    |          |
|-------------|------------------------------------|----------|
| 科属：天南星科喜林芋属 | 学名： <i>Philodendron oxycardium</i> | 别名：圆叶蔓绿绒 |
|-------------|------------------------------------|----------|

## 心叶蔓绿绒

**形态：**多年生常绿蔓性草本。茎具气生根，需攀附他物生长。叶长约10厘米，宽约5厘米片，叶片茂密，呈绿色，先端渐尖，基部心形。佛焰苞绿色，一般较少开花。

**习性：**性喜温暖、湿润的环境条件，忌强光，以半阴为佳，忌干燥。对土质要求不严，以疏松、肥沃、排水良好的土壤为佳。生育适温为20℃～28℃，空气湿度为70%左右。

**应用：**盆栽观赏，可用于装饰客厅、宾馆酒店的大堂及客房等地；也可植于小型棚架、墙垣、假山石等处，供其攀爬。



叶片茂密，呈绿色

分布：原产巴西、牙买加及西印度群岛。



科属：天南星科大藻属

学名：*Pistia stratiotes*

别名：大藻、大萍、水莲、肥猪草、水芙蓉



叶倒卵形或扇形

# 芙蓉莲

**形态：**多年生漂浮性的水生草本。叶基的短茎着生须根，漂浮水中。叶呈莲座状，倒卵形或扇形，直立，波状缘，叶面有数条纵纹。雌雄同株，花小，生于叶腋，绿色。

花期夏、秋季。

**习性：**喜光照充足、喜温暖、多雨的环境，不耐寒。



叶面有数条纵纹

**应用：**① 水养于室内外观赏，也可用于点缀水面。② 全株可用作猪饲料；也可入药，外敷可治肿毒，煮水可治汗斑、消跌打肿痛等症，煎水内服可治水肿、小便不利等症。

分布：原产热带美洲，现广布于热带及亚热带地区。我国的福建、台湾、广东、广西、云南等省有野生，生于池塘、沟渠之中；其他省区均有栽培。

科属：天南星科绿萝属

学名：*Scindapsus aureus*

别名：黄金葛、魔鬼藤

# 绿萝

**形态：**多年生常绿藤本。茎叶均肉质，茎节具气生根。幼枝鞭状，细长，叶纸质，宽卵形，基部心形；成熟枝上叶卵状长椭圆形或心形，薄革质，叶深绿色，光亮，具不规则条纹或黄斑点，全缘。



**习性：**强健，喜温暖、潮湿的环境，喜光亦耐半阴。喜疏松、富含有机质的微酸性和中性沙壤土。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**可用于园林绿化，也可用于盆栽，置于桌案及柜子上或吊挂欣赏。

叶深绿色，光亮

分布：原产所罗门群岛。现广植于亚热带及热带地区。



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| 科属：天南星科绿萝属                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 学名： <i>Scindapsus pictus</i> cv. <i>Argyraeus</i> | 别名：银星绿萝 |
| <div><div><div>叶面布满银色斑点或斑块</div><div>星点藤</div><div>形态：多年生常绿藤本。茎叶常生出气生根，具有较强的攀附性，可附于树干、山岩及坡地向上生长。叶长圆形，叶端突尖，叶绿色，质厚，上布满银色斑点或斑块。叶缘白色，叶背深绿色。</div><div>习性：喜温暖、湿润的半阴环境，不耐寒，忌强光，以充足的散射光为佳。以疏松、排水良好的微酸性土壤为佳。生长</div><div>应用：可用吊盆或附着在木柱上栽培观赏，适合客厅、厅台、大型案几及阳台装饰。</div><div>分布：原产印尼及菲律宾。近年来我国引进栽培。</div></div><div><div><div>叶端突尖</div><div>适温为20℃ ~ 30℃。</div></div></div></div> |                                                   |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 科属：天南星科苞叶芋属                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 学名： <i>Spathiphyllum floribundum</i> cv. <i>Clevelandii</i> | 别名：白掌、苞叶芋 |
| <div><div><div>佛焰苞阔卵形，白色</div><div>白鹤芋</div><div>形态：多年生常绿草本，株高40 ~ 60厘米。具短根茎。叶基生，革质，长椭圆形或阔披针形，有长尖，叶色浓绿。佛焰苞直立向上，阔卵形，白色；高出叶面，大而显著。肉穗花序细长，小花密生，白色。花期5 ~ 10月。</div><div>习性：喜温暖湿润和半阴环境，忌阳光直射，怕寒冷。忌粘重土壤，宜富含腐殖质的沙质壤土。生长适温为20℃ ~ 28℃。</div><div>应用：① 多盆栽室内观赏，大型盆栽可装饰客厅一隅，小型盆栽可装饰案几，或置于阳台、窗台栽培欣赏。② 适合作切花。</div><div>分布：原产哥伦比亚。</div></div><div><div><div>肉穗花序细长</div><div>叶有长尖</div></div></div></div> |                                                             |           |



|             |                                                       |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 科属：天南星科苞叶芋属 | 学名： <i>Spathiphyllum floribundum</i><br>cv. Maura Loa | 别名：绿巨人白掌、<br>大叶白掌 |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------|

# 绿巨人

**形态：**多年生常绿草本，株高1 ~ 1.3米。茎较短而粗壮，叶呈莲座状基生，阔椭圆形；顶端急尖，厚革质，有光泽，腹面墨绿色，背面绿色，全缘。佛焰花序腋生，长勺状。花期4 ~ 7月，花后不易结实。

**习性：**喜温暖、湿润、半荫蔽的气候环境，忌旱涝、忌阳光直射，较耐低温。喜富含腐殖质、排水良好的中性或微酸性土壤。生长适温为18℃ ~ 25℃。



叶顶端急尖

佛焰花序  
长勺状

**应用：**室内观赏，适宜布置厅堂、会场、商场、办公楼等公共场所，也可作切叶材料。



叶阔椭圆形

产地分布：原产哥伦比亚。现我国栽培广泛。



|             |                                  |                |
|-------------|----------------------------------|----------------|
| 科属：天南星科合果芋属 | 学名： <i>Syngonium podophyllum</i> | 别名：箭叶芋、丝素藤、白蝴蝶 |
|-------------|----------------------------------|----------------|

合果芋

**形态：**多年生常绿藤本。茎绿色，攀附生长，有多数气生根。叶互生，幼叶箭形或戟形，淡绿色，老叶为掌状叶，多裂，深绿色。肉穗状花序，花序外有佛焰苞包被，其内部红色或白色，外部绿色，花期夏、秋季。合果芋园艺品种极多，如白蝶合果芋、红粉佳人等。

**习性：**适应性强，喜高温、多湿、半阴的环境，不耐寒，要求肥沃、疏松、排水良好的微酸性土壤。生长适温为22℃ ~ 30℃。

**应用：**盆栽或吊篮栽植作为室内观叶植物，适于布置会议室、客厅、书房和卧室；园林中常用于地被或攀缘。



幼叶箭形或戟形



佛焰苞包被

肉穗状花序

分布：原产中、南美洲热带雨林中。

|             |                                 |          |
|-------------|---------------------------------|----------|
| 科属：天南星科合果芋属 | 学名： <i>Syngonium wendlandii</i> | 别名：银脉合果芋 |
|-------------|---------------------------------|----------|

绒叶合果芋

**形态：**合果芋的园艺栽培品种之一，形态特征与合果芋基本相同，主要区别是叶脉处叶片银白色。

**习性：**喜高温、多湿、半阴的环境，不耐寒，要求肥沃、疏松、排水良好的微酸性土壤。生长适温为22℃ ~ 30℃。

**应用：**观赏性强，适合室内栽培观赏，可用于卧室、餐桌、卫生间及台几之上装饰。



叶脉处叶片银白色

分布：原产中、南美洲热带雨林中。




|             |                                   |                       |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 科属：天南星科雪铁芋属 | 学名： <i>Zamioculcas zamiifolia</i> | 别名：泽米芋、金币树、雪铁芋、泽米叶天南星 |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------|

金钱树

**形态：**多年生常绿草本，株高30 ~ 50厘米，地下具肥大的块茎，浅黄色。羽状复叶自块茎顶端抽生，小叶在叶轴上呈对生或近对生，卵形，全缘，厚革质，先端急尖，有光泽。花瘦小，浅绿色。

**习性：**喜暖热略干的气候，耐阴、耐旱，怕高湿，怕低温、怕雨淋、畏寒冷，忌强光暴晒，怕土壤粘重和盆土内积水。要求土壤疏松肥沃，排水良好，富含有机质酸性至微酸性。生长适温为22℃ ~ 32℃。

**应用：**盆栽观赏，可置于卧室、客厅或宾馆的大堂、客房及办公室等处。



分布：原产非洲东部。现我国栽培广泛，以广东、海南栽培为多。

|            |                                    |              |
|------------|------------------------------------|--------------|
| 科属：五加科鸭脚木属 | 学名： <i>Schefflera actinophylla</i> | 别名：辐射叶鹅掌柴、伞树 |
|------------|------------------------------------|--------------|

澳洲鸭脚木

**形态：**常绿乔木，茎干平滑，株高可达30米。掌状复叶，具长柄，丛生于枝条先端。小叶3 ~ 16枚，长椭圆形，叶端突尖，革质，叶色浓绿，有光泽。花为圆锥状花序，花小型。

**习性：**喜高温、多湿的环境，对光照适应性强，全日照、半日照均可。以排水良好的壤土或沙质壤土为佳。生长适温为20℃ ~ 30℃。

**应用：**多用于园林绿化，可植于路边、草地、池畔等地，或与其他园林树木配植；也可庭院种植或盆栽室内观赏。



分布：原产澳大利亚及太平洋中的一些岛屿。



|             |                            |       |
|-------------|----------------------------|-------|
| 科属：五加科八角金盘属 | 学名： <i>Fatsia japonica</i> | 别名：手树 |
|-------------|----------------------------|-------|

八角金盘

**形态：**常绿灌木或小乔木，株高可达3 ~ 5米，分枝少。叶革质，近圆形，掌状7 ~ 9深裂。伞形花序集成圆锥花序，花白色。花期10 ~ 11月，果熟期为翌年4月。

**习性：**喜温暖、湿润的气候，较耐寒，喜光，也较耐阴，但忌强光直射。对土壤要求不严，以疏松、肥沃的土壤为佳。生长适温为10℃ ~ 25℃。

**应用：**可用于盆栽观赏，布置厅堂及居室；也可植于庭院、水畔、栅栏边缘及群植于草地、林缘下；对二氧化硫有一定的抗性，适宜厂矿区种植绿化。



花白色



叶掌状  
7 ~ 9深裂

分布：原产我国台湾及日本。

|            |                         |           |
|------------|-------------------------|-----------|
| 科属：五加科常春藤属 | 学名： <i>Hedera helix</i> | 别名：加那利常春藤 |
|------------|-------------------------|-----------|

洋常春藤

**形态：**常绿蔓性藤本，茎节可生气生根。叶为掌状裂叶，不同品种叶型有差异，或浅裂或深裂，或全缘或波状缘，叶片具黄色、白色斑块或镶纹，变化较大。

**习性：**喜冷凉、湿润，喜充足散射光，忌强光直射。以富含腐殖质、排水良好的沙质壤土为佳。生长适温为10℃ ~ 25℃。

**应用：**多盆栽观赏，可置于阳台、窗台及案几上观赏。也可用于地被或立体绿化。



叶为掌状裂叶

分布：原产北非、欧洲、亚洲等地。



|            |                                                      |              |
|------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 科属：五加科常春藤属 | 学名： <i>Hedera nepalensis</i><br>var. <i>sinensis</i> | 别名：中华常春藤、爬树藤 |
|------------|------------------------------------------------------|--------------|



单叶较大

## 常春藤

**形态：**常绿藤本。茎蔓长达30米，具气生根。单叶较大，互生，叶形变化较大，表面暗绿色，有光泽，全缘。伞形花序，花小，淡绿白色。果为浆果状球形，熟时红色或黄色。花期8 ~ 9月，果期翌年4 ~ 5月。

**习性：**适应性强，喜湿润环境，但对干燥的环境也能适应。性极耐阴，亦不怕阳光，有一定耐寒性。对土壤要求不严，以疏松富含有机质的中性或酸性土壤为佳，不耐盐碱。

**应用：**①适用于攀附建筑墙面、山石、壮老龄树干；多种园艺品种适用于阳台阴处吸附或室内盆栽观赏。②茎叶含鞣酸，可提制栲胶。③全株供药用，具舒筋散风功效，茎叶捣烂可治痈疽或其他初起肿毒。



表面暗绿色

分布：原产我国华中、华南、西南等地。越南也有分布。

|            |                                  |        |
|------------|----------------------------------|--------|
| 科属：五加科鹅掌柴属 | 学名： <i>Schefflera arboricola</i> | 别名：鹅掌藤 |
|------------|----------------------------------|--------|

## 鹅掌柴

**形态：**常绿灌木或小乔木，株高约3 ~ 5米。分枝多，枝条紧密。掌状复叶，互生，小叶5 ~ 8枚，长卵圆形，革质，全缘，具光泽。圆锥状花序，小花淡绿色或黄褐色，花期11 ~ 12月。浆果球形，果期12月至翌年1月。常见栽培的有花叶鹅掌柴。

**习性：**喜温暖、湿润和半阴环境，喜湿怕干，喜光，耐半阴，较耐旱。

以深厚、肥沃的酸性土壤为佳。生长适温为20℃ ~ 30℃。

**应用：**适宜盆栽布置客室、书房和卧室，大型盆栽适用于宾馆大厅、图书馆的阅览室和博物馆展厅摆放；也可在庭园孤植；枝叶可作插花陪衬材料。



花叶鹅掌柴



浆果球形

小叶5 ~ 8枚，  
长卵圆形

分布：原产我国。现栽培的多为园艺种。



科属：南洋杉科南洋杉属

学名: *Araucaria cunninghamii*

别名：肯氏南洋杉

## 南洋杉



**形态：**现代孑遗植物之一。常绿乔木，一般株高30 ~ 40米。树冠尖塔形，树干直立，大枝轮生平展。叶二型，幼树和侧枝的叶钻状、针状、镰状或三角状；成株叶排列紧密，卵形，三角状卵形或三角状。雄球花单生枝顶，球果卵形或椭圆形。

**习性：**喜阳光充足、温暖湿润的环境，不耐寒和干旱，不耐干燥，冬季需充足阳光，夏季避免强光暴晒。要求排水良好的沙壤土。生长适温为 $18^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ 。

**应用:** ①可用于园林绿化,可群植、列植及孤植,还可用于庭院种植,幼树则是珍贵的盆栽观叶植物。②木材可供建筑、家具等用。

分布：原产大洋洲东南沿海地区。我国广东、海南、福建、云南、广西等地有栽培，北方盆栽。

科属：萝藦科马利筋属

学名: *Asclepias curassavica*

别名：莲生桂子花、金凤花、芳香草

## 马利筋

**形态：**多年生直立草本，株高0.6 ~ 1米。其茎基部半木质化，茎直立。叶对生，膜质，披针形或椭圆状披针形。聚伞花序顶生及腋生，紫红色，副花冠黄色。蓇葖果刺刀形。花期几乎全年，以夏季最旺，果期8 ~ 12月。



**习性：**喜向阳、通风、温暖、干燥环境。以疏松、肥沃的沙质壤土为佳。生长适温为22℃~30℃。

**应用：**① 适于盆栽观赏，也可用于花坛、花境及林缘下种植。② 可入药，具有调经活血、消炎散肿、止痛、驱虫的功效。



**注意：**有毒，汁液含强心甙，栽种时注意不要接触其汁液及误食。



分布：原产拉丁美洲的西印度群岛。现广植于热带及亚热带地区，我国南方省市栽培较多，且已逸为野生。



科属：萝藦科吊灯花属

学名：*Ceropegia woodii*

别名：吊金钱、吊灯花、心叶蔓

爱之蔓

**形态：**多年生蔓性多浆草本。地下具较大的块茎，藤本茎细长下垂，节间长。叶对生，心形、肉质、银灰色，花淡紫红色，花期每年4 ~ 5月和9 ~ 10月两次开放。

叶心形、肉质、银灰色

**习性：**喜温暖湿润环境，好阳光也较耐阴，怕高温，忌强阳光直晒，忌积水。适栽于排水良好的腐殖土。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**常于室内吊盆栽培养观赏，也可置于室内墙角、高花架上或书柜顶上装饰。

藤本茎细长下垂



分布：原产南非、马来西亚及印度等地。我国各地均有栽培。

科属：萝藦科钉头果属

学名：*Gomphocarpus physocarpus*

别名：唐棉、风船唐棉

气球果

**形态：**常绿灌木，株高1 ~ 2米。叶对生，线形。聚伞花序，花顶生或腋生，五星状，白色或淡黄色。蓇葖果，卵圆形，黄绿色，外果皮具软刺。花期6 ~ 10月，果熟期10 ~ 12月。

**习性：**喜高温、多湿及阳光充足的环境，不耐寒。不择土壤，以疏松、肥沃的微酸性沙质壤土为佳。生长适温为20℃ ~ 28℃。

**应用：**①可单植或丛植于草地、小桥边、假山石旁点缀，也可植于庭院观赏。  
②花是优良的插花材料。

叶对生，线形

花五星状

外果皮具软刺



分布：原产非洲热带地区。



|           |                         |                 |
|-----------|-------------------------|-----------------|
| 科属：萝藦科球兰属 | 学名： <i>Hoya carnosa</i> | 别名：毡兰、蜡兰、玉绣球、腊花 |
|-----------|-------------------------|-----------------|

球兰



花白色，  
心部淡红色

**形态：**多年常绿藤本状草本。茎蔓2米以上，可附生生长。叶全缘、对生、肥厚多肉，卵形或卵状长圆形。伞形花序腋生，常聚集成球形。花白色，心部淡红色，花期5 ~ 9月。常见栽培的有心叶球兰及斑叶球兰。

**习性：**喜高温多湿的半阴环境，忌阳光曝晒。喜肥沃、透气、排水良好的土壤，忌水湿。生长适温为15℃ ~ 28℃。

**应用：**① 适于攀附与吊挂栽培，可攀缘支持物、树干、墙壁和绿篱等。② 全株供药用，民间多用于治疗关节肿痛、眼目赤肿、肺炎等。



心叶球兰



叶全缘、对生、  
肥厚多肉

分布：原产我国南方各省区，多生于平原或山地附生于树上或岩石之上。



|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 科属：萝藦科夜来香属 | 学名： <i>Telosma cordata</i> | 别名：夜香花、夜兰香 |
|------------|----------------------------|------------|

叶卵状椭圆形至阔卵形

## 夜来香



**形态：**藤状灌木。叶对生，膜质，卵状椭圆形至阔卵形，顶端渐尖，基部心形。伞形状聚伞花序腋生，着花多达30朵，花冠高脚蝶状。花黄绿色，芳香。花期5～8月，一般极少结果。

**习性：**喜光照充足、温暖湿润气候。要求肥沃排水良好的土壤。

**应用：**① 香味浓郁，可用作庭院点缀，也可盆栽观赏。② 华南地区常取其花入菜；花还可蒸香油。③ 花、叶入药，具明目、清肝、去翳的功效。



花黄绿色，芳香

分布：原产我国华南地区，多生于山坡灌木丛中。我国栽培广泛，国外也有引种栽培。

|            |                               |                 |
|------------|-------------------------------|-----------------|
| 科属：铁角蕨科巢蕨属 | 学名： <i>Neottopteris nidus</i> | 别名：巢蕨、山苏花、台湾山苏花 |
|------------|-------------------------------|-----------------|

## 鸟巢蕨

**形态：**多年生常绿附生草本，株高1米左右。根状茎短，叶呈放射状，丛生于根状茎周围，形如鸟巢状。叶片呈条状倒披针形，草质，浅绿色，两面光滑，中脉明显突起，叶柄粗短。孢子囊线形，生于叶背面侧脉间。

**习性：**喜温暖、湿润环境，不耐低温，忌强光。喜腐殖质丰富的微酸性土壤。生长适温为20℃～25℃。

**应用：**吊盆栽植观赏，常用于宾馆、庭院及室内布置装饰。



叶呈放射状



叶片呈条状倒披针形

分布：原产热带及亚热带地区。我国、日本、东南亚、大洋洲及东部非洲均有分布，主要附生于海拔100～1900米雨林中的树干上或岩石之上。



|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| 科属：凤仙花科凤仙花属 | 学名： <i>Impatiens hawkeri</i> |
|-------------|------------------------------|

# 新几内亚凤仙

**形态：**多年生常绿草本。茎肉质，多分枝。叶互生，有时上部轮生状，叶片卵状披针形，叶脉红色。花单生或数朵聚成伞房花序，花瓣桃红、粉红色、橙红色、紫红色、白色等。花期6 ~ 8月。

**习性：**喜温暖、湿润、日照充足的环境，忌炎热，夏季要求凉爽并适当遮阴，怕寒冷。要求深厚、肥沃、排水良好的土壤。生长适温为20℃ ~ 28℃。

**应用：**花色多，花期长，适合于花坛、花境布置或盆栽观赏。



分布：原产非洲山地。现我国栽培广泛。



|             |                                |                                |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 科属：凤仙花科凤仙花属 | 学名： <i>Impatiens balsaming</i> | 别名：指甲花、小桃红、急性子、透骨草、指甲草、金凤花、洒金花 |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|

# 凤仙花

**形态：**一年生草本，高20 ~ 80厘米。茎肉质，粗壮。叶互生，阔披针形，有锯齿。花单朵或数朵簇生叶腋，花冠蝶形，有单瓣、重瓣，有白、粉、红、紫等色。花期6 ~ 10月。

**习性：**喜暖畏寒，要求阳光充足，也耐半阴，但不耐热。适宜深厚潮润、疏松肥沃、排水良好的微酸性土壤。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**①可种植于庭院屋角，也可作花坛的材料，还可盆栽观赏。②茎及种子入药，茎有祛风湿、活血、止痛的功效，种子具有消积的作用。



分布：原产我国南部及印度和马来西亚。我国栽培极为广泛。

|             |                                 |        |
|-------------|---------------------------------|--------|
| 科属：凤仙花科凤仙花属 | 学名： <i>Impatiens walleriana</i> | 别名：洋凤仙 |
|-------------|---------------------------------|--------|

# 非洲凤仙花

**形态：**多年生草本。茎多汁，光滑，节间膨大，多分枝，在株顶呈平面开展。叶有长柄，叶片卵形，边缘钝锯齿状。花腋生，1 ~ 3朵，花形扁平，花色丰富，四季开花。

**习性：**适应性极强，喜充足的散射光，在半阴环境下生长良好，喜温暖、湿润气候，耐热性较佳，不耐寒。对土质没有特殊要求。

**应用：**在园林中应用广泛，可用于花坛、花台、花境栽培观赏，或用于路边、墙角、墙垣下绿化；也适合盆栽观赏。



分布：原产非洲。现栽培广泛。



|             |                           |         |
|-------------|---------------------------|---------|
| 科属：秋海棠科秋海棠属 | 学名： <i>Begonia mannii</i> | 别名：玫瑰海棠 |
|-------------|---------------------------|---------|

丽格海棠

**形态：**多年生草本，为杂交种。茎肉质多汁，单叶互生，心形，叶缘为重锯齿状或缺刻，掌状脉，多为绿色，也有的为棕色。花形多样，多为重瓣，花色有红、橙、黄、白等。花期冬季。

花多为  
重瓣

**习性：**属短日照植物，喜温暖、湿润、通风良好的栽培环境，喜散射光，忌强光直射，不耐高温。要求肥沃、疏松，排水、通气良好的微酸性土壤。生长适温为18℃ ~ 22℃。

**应用：**常盆栽置于茶几、书房、卧室中观花欣赏，也适合办公室、宾馆等应用。

叶缘为重锯  
齿状或缺刻

分布：原产亚热带或热带地区。现世界各地广泛栽培。

|             |                                  |                  |
|-------------|----------------------------------|------------------|
| 科属：秋海棠科秋海棠属 | 学名： <i>Begonia semperflorens</i> | 别名：四季海棠、玻璃翠、玻璃海棠 |
|-------------|----------------------------------|------------------|

四季秋海棠

**形态：**多年生草本，株高15 ~ 30厘米。茎直立，多分枝，肉质光滑。叶互生，有光泽，卵形，边缘有锯齿，绿色或带淡红色。聚伞花序腋生，花有单瓣和重瓣，花色有红、白、粉红，四季开花。

**习性：**喜温暖、湿润和阳光充足的环境，不耐寒，怕酷热，忌暴晒、雨淋。喜排水良好、富含腐殖质的沙质壤土。生长适温为20℃ ~ 25℃。

**应用：**小型盆栽观赏，常用于点缀家庭书桌、茶几、案头；也可用于布置城市中心广场、花坛或花槽。

花色多样

卵形，  
边缘有  
锯齿

分布：原产南美巴西。世界各地栽培广泛。



|             |                         |        |
|-------------|-------------------------|--------|
| 科属：秋海棠科秋海棠属 | 学名： <i>Begonia</i> spp. | 别名：八月春 |
|-------------|-------------------------|--------|

秋海棠

**形态：**多年生肉质草本，稀为灌木，具根状茎。单叶，稀为掌状复叶，互生或全部基生；叶片常偏斜，基部两侧不相等，边缘常有不规则疏而浅的锯齿，常浅至深裂，偶有全缘。花单性，多雌雄同株，少异株。数朵花组成聚伞花序，有时呈圆锥状。花有白、粉、红等色。蒴果有时浆果状，种子极多数，浅褐色。花果期依品种而定。



**习性：**喜阴湿，夏季忌高温，耐寒力弱，喜湿润，不耐干旱，忌直射阳光。土壤以疏松肥沃、微酸性为宜。生长适温为20℃ ~ 25℃。

**应用：**多用于绿地美化环境，也用于布置专类园；为室内美化的重要盆花，在暖季也适用于花坛布置。

边缘常有不规则  
疏而浅的锯齿

分布：原产热带及亚热带。全世界有1000多种，我国有130多种。

|             |                                |                  |
|-------------|--------------------------------|------------------|
| 科属：秋海棠科秋海棠属 | 学名： <i>Begonia tubehybrida</i> | 别名：茶花海棠、夫妻花、牡丹海棠 |
|-------------|--------------------------------|------------------|

球根秋海棠

**形态：**多年生块茎草本，株高为0.3 ~ 1米。地下茎块为不规则的扁球形。叶互生，多偏心脏状卵形，叶端尖锐，叶缘具齿牙和缘毛。聚伞花序腋生，有单瓣、半重瓣和重瓣之分，花色有白、红、粉、橙、黄、紫红及复色等。蒴果。花期夏秋。

**习性：**喜凉爽湿润的半阴环境，忌强光直射，忌空气干燥。以疏松、肥沃、排水良好的微酸性的沙壤土栽培为宜。生长适温为16℃ ~ 22℃。

**应用：**盆栽观赏，可用于装饰会议室、大堂及办公室等，也可用于居家装饰，适合客厅、卧室及案几摆放观赏。



复色花



叶端尖锐

分布：原产南美。



|           |                                |               |
|-----------|--------------------------------|---------------|
| 科属：紫葳科凌霄属 | 学名： <i>Campsis grandiflora</i> | 别名：紫葳、中国凌霄、女葳 |
|-----------|--------------------------------|---------------|

## 凌霄

**形态：**落叶木质藤本。羽状复叶对生，小叶7 ~ 9枚，卵形至卵状披针形，顶端尾状渐尖。聚伞花序集成顶生圆锥花序，花冠钟形，外橙黄色，内鲜红色。蒴果，顶端钝。花期5 ~ 8月，果期10月。

**习性：**喜温暖向阳的环境，耐旱、耐阴，不耐寒。以肥沃、湿润、排水良好的壤土为佳。生长适温为20℃ ~ 25℃。

**应用：**① 适用于墙垣、大型棚架、庭院的绿化，也可制作成盆景观赏。② 花入药，具有通经利尿的功效，主治跌打损伤等症。



花冠钟形，外橙黄色，内鲜红色



羽状复叶对生

分布：原产我国中部，现栽培广泛。日本也有分布，越南、印度等地均有栽培。

|            |                              |               |
|------------|------------------------------|---------------|
| 科属：紫葳科葫芦树属 | 学名： <i>Crescentia cujete</i> | 别名：瓢瓜木、葫芦树、红椏 |
|------------|------------------------------|---------------|

## 炮弹树

**形态：**常绿乔木，株高5 ~ 18米。叶丛生，大小不等，阔倒披针形。花大，生于老茎之上，花冠钟状，微弯，淡黄绿色，具紫色脉纹。果卵圆球形，坚硬，大如篮球，可作盛水的葫芦瓢。

**习性：**喜光照。对土质无特殊要求，以排水良好的沙质土壤为佳。

**应用：**老干结果，果如炮弹，相当奇特，是科普教育的良好素材，可用于校园、公园、庭院绿化及科普教育。



果卵圆球形


分布：原产热带美洲、印度、菲律宾等地。我国广东、福建、台湾、云南等地有栽培。



科属：紫葳科葫芦树属

学名： *Parmentiera alata*

别名：蜡烛树、十字架



# 叉叶木

**形态：**常绿小乔木，株高3 ~ 6米。叶簇生于小枝上，小叶3枚，三叉状，长披针形至倒匙形。花着生于主枝或老干上，花冠钟状，具有紫褐色斑纹。花期夏季，秋季也可少量见花。

**习性：**喜温暖、湿润的环境，喜光照，也较耐阴，不耐寒。对土质要求不严，以疏松、排水良好的微酸性土壤为佳。

**应用：**❶ 花、叶、果均有较强的观赏价值，适合栽植于公园、小区、庭院及风景区等欣赏，丛植、单植效果均佳。❷ 果壳可入药。



果球形



**分布：**原产南美热带地区。现菲律宾、印尼及大洋洲栽培较多，我国广东、福建、云南等省也有栽培。



|             |                                 |              |
|-------------|---------------------------------|--------------|
| 科属：紫葳科非洲凌霄属 | 学名： <i>Podranea ricasoliana</i> | 别名：非洲凌霄、肖粉凌霄 |
|-------------|---------------------------------|--------------|

紫芸藤

**形态：**常绿半蔓性灌木。奇数羽状复叶，对生，小叶长卵形，先端尖，叶缘具锯齿。花顶生，花冠钟形，花色粉红色至淡紫色。花期秋至春季。蒴果，种子卵形。

**习性：**喜光照，喜温暖及高温的环境，不耐寒，较耐旱。土质以疏松、排水良好的沙质壤土为宜。

**应用：**适用于庭院花架、篱墙美化或大型盆栽观赏。



花冠钟形



奇数羽状复叶

分布：原产非洲南部。我国台湾省栽培较多，现广东、福建已引种栽培。

|            |                                    |             |
|------------|------------------------------------|-------------|
| 科属：紫葳科蒜香藤属 | 学名： <i>Pseudocalymma alliaceum</i> | 别名：张氏紫葳、紫铃藤 |
|------------|------------------------------------|-------------|

蒜香藤

**形态：**常绿木质藤本。三出复叶对生，中叶椭圆形，全缘。圆锥花序腋生，花冠筒状，花瓣前端5裂，花初开为紫色，后渐淡，变至白色。花期5 ~ 11月。花及叶经过揉搓之后有浓浓的蒜香味，故名。

三出复叶对生



**习性：**喜高温及阳光充足的环境，较耐旱、不耐寒。土壤以排水良好的肥沃沙质壤土为佳。生长适温为20℃ ~ 28℃。

**应用：**开花时节，花团锦簇，十分美丽，适于公园、学校及庭院绿化（需设立支架）；也可盆栽观赏。



花冠筒状，花瓣前端5裂

分布：原产印度、哥伦比亚、阿根廷等地。现我国栽培普遍。



科属：紫葳科炮仗藤属

学名： *Pyrostegia venusta*

别名：黄金珊瑚、炮仗藤、黄鳝藤

## 炮仗花

**形态：**常绿木质大藤本，有线状卷须，可攀缘至7 ~ 8米。复叶对生，小叶卵状至卵状矩圆形，先端渐尖，茎部阔楔形至圆形，叶柄有柔毛。圆锥花序顶生，下垂，花冠管状至漏斗状，橙红色，反卷。花期1 ~ 2月。

花冠管状  
至漏斗状

**习性：**喜光照，喜温暖及高湿的环境，不耐寒，较耐旱。对土壤无特殊要求，以肥沃、疏松的微酸性土壤栽培为佳。生长适温为20℃ ~ 30℃。

**应用：**多用于低层建筑物墙面覆盖绿化，也可供棚架、花廊、阳台、花架、门亭等作垂直绿化材料。



先端  
渐尖

分布：原产南美洲巴西。我国广东、海南、广西、台湾等地栽培较多。

科属：紫葳科火焰树属

学名： *Spathodea campanulata*

别名：火焰树、喷泉树、火烧花

## 火焰木

**形态：**常绿大乔木，株高10 ~ 20米。树干直立，灰白色。叶为奇数羽状复叶，小叶具短柄，卵状披针形或卵状长椭圆形，侧脉很明显。圆锥或总状花序，顶生，花大，形如火焰，红色或橙红红。果为蒴果，长椭圆形状披针形，长约20厘米，种子具翅。全年开花。

**习性：**属阳性植物，喜阳光，喜高温湿润的气候，耐热、耐旱、耐湿也耐贫瘠。一般土壤均可良好生长。生长适温为22℃ ~ 30℃。

**应用：**花艳如火，极为醒目，适宜作行道树及园林绿化，常植于庭园、校园、公园、游乐区等地，单植、列植、群植均可取得较佳的景观效果。



花大，形如火焰



分布：原产非洲热带。我国台湾地区栽培较多，华南地区有少量引种。



|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 科属：紫葳科黄钟花属 | 学名： <i>Tecoma stans</i> | 别名：金钟花 |
|------------|-------------------------|--------|

## 黄钟花

**形态：**灌木或小乔木。奇数羽状复叶，对生，小叶披针形至长圆状卵形，叶缘有锯齿。总状花序或穗状花序，花冠钟状，鲜黄色。蒴果，细长如豆荚，线状。主要花期夏季，温暖地区其他季节也可见开花。



**习性：**喜温暖、湿润的气候，喜光且耐阴，也耐热，较耐旱。一般土壤均可良好生长。生长适温为22℃ ~ 30℃。

**应用：**花开时节，一片金黄，观赏性极佳，成片种植或丛植为花径花丛，极为醒目，也可用于庭院美化或大型盆栽观赏。



花冠钟状，鲜黄色

叶缘有锯齿

分布：原产热带中美洲各地。我国的云南、海南、广东有栽培。

|           |                               |              |
|-----------|-------------------------------|--------------|
| 科属：紫葳科凌霄属 | 学名： <i>Tecomaria capensis</i> | 别名：四季凌霄、常绿凌霄 |
|-----------|-------------------------------|--------------|

## 硬骨凌霄



**形态：**常绿灌木，株高可达2米。羽状复叶，对生，小叶5 ~ 9枚，卵形到椭圆形。总状花序，花冠漏斗状，红色，略弯。主要花期8 ~ 11月。

**习性：**性喜光照，喜温暖、湿润的环境，不耐寒，较耐阴，忌土壤积水。对土质要求中等，一般在肥沃、富含有机质、排水良好壤土中生长较佳。生长适温为18℃ ~ 28℃。

**应用：**花色艳丽，观花期长，是公园、小区绿化的优良树种，也适合布置庭院或室内盆栽观赏。



花冠漏斗状，红色

分布：原产南非。现热带及亚热带地区栽培广泛。



科属：木棉科木棉属

学名： *Bombax ceiba*

别名：斑芝树、英雄树、攀枝花

## 木棉



**形态：**落叶大乔木，高达30多米。幼树的树干及枝条有扁圆锥形的皮刺，老树树干粗大、光滑，侧枝轮生，向四周平展。叶互生，掌状复叶，由5 ~ 7片长椭圆形的小叶组成。花红色，先叶开放，生于枝端，花萼杯状。花期3 ~ 4月。

**习性：**喜阳光、喜温暖，不耐寒，耐干旱、稍耐湿，忌积水。对土壤要求不严，以微酸性及中性土为佳。

**应用：**① 常作园景树、庭荫树，也可作行道树。② 木材可用来造纸、制箱板、火柴梗等。

③ 种子油可作润滑油。④ 花可食用，也供入药，具有清热除湿的功效，华南地区常用来煲汤；树皮为滋补药。



花冠红色



掌状复叶

分布：原产印度、印尼、菲律宾及我国，多生于海拔1400米以下的干热河谷及稀树草原中。

科属：木棉科异木棉属

学名： *Ceiba speciosa*

别名：美人树



花冠淡紫红色

## 美丽异木棉

**形态：**落叶大乔木，株高10 ~ 15米。树干下部膨大。掌状复叶有小叶5 ~ 9片，小叶椭圆形。花单生，花冠淡紫红色，中心白色。花期冬季。蒴果椭圆形。种子次年春季成熟。

**习性：**阳性植物，喜高温、多湿的气候，抗风，不耐旱。对土质要求中等，以疏松、排水良好的微酸性土壤为佳。

**应用：**花姿清雅，观赏性强，为优良的观花乔木，是庭院绿化和美化的高级树种，也可作为高级行道树于园林栽种。



树干下部膨大

分布：原产南美洲的巴西、阿根廷。我国广东、台湾、海南等地栽培较多。



|           |                               |                          |
|-----------|-------------------------------|--------------------------|
| 科属：木棉科瓜栗属 | 学名： <i>Pachira macrocarpa</i> | 别名：瓜栗、马拉巴栗、大果木棉、栗子树、美国土豆 |
|-----------|-------------------------------|--------------------------|

发财树

**形态：**常绿乔木，树高可达10米左右。掌状复叶互生，小叶长椭圆形、全缘，叶前端尖，羽状脉，小叶柄短。花单生于叶腋，有小苞片2 ~ 3枚，花朵淡黄白色。花期4 ~ 5月，果熟期9 ~ 10月。

**习性：**喜温暖、湿润，对光照要求不严，但不可暴晒，较耐水湿，也较耐旱。对土壤要求不严，以富含腐殖质沙质肥沃酸性土为最佳。生长适温为15℃ ~ 30℃。

果实



**应用：**① 我国重要的观叶树种，花、果均可观赏，常用于各大宾馆、饭店、商场及家庭等场所的室内绿化装饰，也可用于园林绿化，适合作行道树种。② 果皮未熟时可食，种子可炒食。



花朵淡黄白色



小叶长椭圆形

分布：原产中美洲。我国南北各地均有广泛栽培，广东、海南、广西及福建可露地栽培。

|            |                                |                   |
|------------|--------------------------------|-------------------|
| 科属：凤梨科姬凤梨属 | 学名： <i>Cryptanthus acaulis</i> | 别名：蟹叶姬凤梨、紫锦凤梨、海星花 |
|------------|--------------------------------|-------------------|

姬凤梨

叶密集丛生呈莲座状



叶边缘呈波状，且具有软刺

**形态：**多年生常绿草本，全株矮小，株高仅5 ~ 6厘米左右。叶从根茎上密集丛生，水平伸展呈莲座状，叶片坚硬，边缘呈波状，且具有软刺，叶片呈条带形，先端渐尖。花两性，白色，雌雄同株，花期6月。

**习性：**喜高温、高湿、半阴的环境，忌阳光直射，忌积水，不耐旱。要求疏松、肥沃、腐殖质丰富、通气良好的沙性土壤。生长适温为20℃ ~ 30℃。

**应用：**常置于桌面、窗台等处装饰观赏，也可在室内作吊挂植物栽培或栽植于室外架上、假山石上，也适合布置专类园。

分布：原产南美热带地区。我国各地均有栽培。



|            |                              |             |
|------------|------------------------------|-------------|
| 科属：凤梨科果子蔓属 | 学名： <i>Guzmania conifera</i> | 别名：咪头、圆锥果子蔓 |
|------------|------------------------------|-------------|

圆锥擎天

**形态：**多年生常绿草本。叶宽带形，外弯，暗绿色。穗状花序呈圆锥状，苞片密生，鲜红，尖端黄色。

**习性：**喜温暖、湿润及冷凉的环境，也喜充足的散射光，忌强光直射，常采用附生基质栽培。生长适温为20℃ ~ 28℃。

**应用：**优良的盆栽花卉，为我国重要的年宵花卉，可置于客厅、会客室、宾馆的大堂、会议室等装饰观赏。



分布：原产安第斯山脉。我国广东、上海等地多利用大棚进行生长栽培。

|             |                             |         |
|-------------|-----------------------------|---------|
| 科属：凤梨科丽穗凤梨属 | 学名： <i>Vriesea carinata</i> | 别名：虾爪凤梨 |
|-------------|-----------------------------|---------|

莺哥凤梨

**形态：**小型附生种，株高15 ~ 30厘米。叶呈莲座状，叶片绿色，带状，薄肉质，叶面平滑且富有光泽。花梗顶端具扁平的苞片，整齐有序地叠生成莺哥鸟的冠毛状，苞片基部呈红色，苞端呈嫩黄色或黄绿色，小花黄色。

**习性：**喜阳光充足温暖环境，忌强光直射，忌水湿，忌空气干燥。以富含腐殖质的砂壤土为宜。生长适温为20℃ ~ 28℃。

**应用：**常盆栽置于窗前、台案观赏，也用于布置凤梨专类园。



分布：原产巴西。我国均采用大棚、温室进行生长栽培。



|            |                                  |               |
|------------|----------------------------------|---------------|
| 科属：仙人掌科金琥属 | 学名： <i>Echinocactus grusonii</i> | 别名：象牙球金琥、黄刺金琥 |
|------------|----------------------------------|---------------|

金琥



白刺金琥

**形态：**多年生有刺肉质植物。茎深绿色，圆球形，有棱，并密生金黄色扁平的强刺及黄色冠毛。花黄色，自茎顶开出。花期6 ~ 10月。果被鳞片及绵毛，种子黑色光滑。常见栽培的有狂刺金琥、白刺金琥及裸琥等。

**习性：**喜阳光充足，夏天也忌强光直射，喜温暖，耐干旱。以肥沃、透水性好的石灰质沙壤土为佳。越冬温度不要低于8℃。

**应用：**强刺球类的代表种，大型盆栽点缀厅堂，更显金碧辉煌；也是仙人掌多肉植物专类园中必不可少的种类，或用于布置大型标本园。



狂刺金琥

分布：原产墨西哥沙漠地区。分布于火热干燥的热带沙漠中。

|            |                                  |            |
|------------|----------------------------------|------------|
| 科属：仙人掌科昙花属 | 学名： <i>Epiphyllum oxypetalum</i> | 别名：琼花、月下美人 |
|------------|----------------------------------|------------|

昙花



分枝扁平叶状，边缘波浪状

**形态：**多年生常绿肉质植物，高约1米。茎叉状分枝，主枝圆筒形，分枝扁平叶状，边缘波浪状。中筋木质化，无叶片。花单生于边缘，花筒下垂，花很大，重瓣，白色。花期7 ~ 8月，多在夜晚开放，香气四溢，开后4 ~ 5个小时即凋谢。



花重瓣，白色



果

**习性：**喜阴湿，耐旱，忌强光，怕涝，不耐寒。对土质要求不严，宜排水良好富含腐殖质的沙质壤土。生长适温为13℃ ~ 20℃。

**应用：**盆花观赏，南方可室外露地栽培，也用于布置仙人掌类专类园。

分布：原产墨西哥和危地马拉，生于温暖、湿润、半阴的热带森林中，多附生于树干、岩石上。



|             |                                 |                     |
|-------------|---------------------------------|---------------------|
| 科属：仙人掌科量天尺属 | 学名： <i>Hylocereus undulatus</i> | 别名：仙人掌果、红龙果、仙人果、仙密果 |
|-------------|---------------------------------|---------------------|

## 火龙果

**形态：**攀缘肉质灌木，具气根。植株三角柱状，具3棱；棱常翅状，边缘波状或圆齿状，深绿色至淡蓝绿色。花漏斗状，花大，夜间开放。浆果红色，长球形，果肉白色、红色，种子倒卵形，墨色。花果期6 ~ 12月。

**习性：**阳性花卉，喜温暖湿润、光线充足的环境，有很强的抗热、抗旱能力。对土壤的适应性较强，以中性或微酸性的土壤为宜。

**应用：**多作为食用水果规模化栽培，也可植于公园及植物园的专类园或旅游观光区栽培观赏，也适合庭院种植，还可盆栽于阳台、天台观赏及食用。



花漏斗状



棱常翅状，边缘波状或圆齿状



浆果红色，长球形

分布：原产中、南美洲的哥斯达黎加等地，生于热带及亚热带森林中，多附着于树干上生长。

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 科属：仙人掌科花座球属 | 学名： <i>Melocactus amoenus</i> |
|-------------|-------------------------------|

## 层云

**形态：**植株单生，球形，表皮蓝绿色至灰绿色。球体高约20厘米，具棱10 ~ 15。花座由很密的白毛和少数红褐色刚毛组成。刺座排列稀，刺锥状，红色至红褐色。花淡红色，但很难见开放，大多是隐藏在花座中。果红色。

**习性：**喜光照，喜温暖环境，不耐寒，耐旱。以排水良好的微酸性沙质壤土为佳。

**应用：**小型仙人掌类植物，球体浑圆，花座鲜艳奇特，观赏性极强，多用于居室、办公室及书桌案头摆设。



花淡红色



花座

刺座

分布：原产委内瑞拉和哥伦比亚的山区。



|             |                                    |       |
|-------------|------------------------------------|-------|
| 科属：仙人掌科南国玉属 | 学名： <i>Notocactus leninghausii</i> | 别名：金晃 |
|-------------|------------------------------------|-------|

黄翁

花着生于茎顶，黄色。



**形态：**多年生常绿多肉植物，株高60 ~ 70厘米。茎圆柱形，基部易分枝。刺座排列紧密，具棱30余个，周刺刚毛状，黄色或白色。中刺黄色，细针状。花着生于茎顶，黄色。花期夏季。

**习性：**喜光照充足、温暖、湿润的环境。土质以富含腐殖质、疏松、排水良好的沙质土壤为佳。冬季土壤保持干燥，能耐0℃的低温。

**应用：**小型盆栽观赏或布置专类园。



刺座排列紧密

分布：原产巴西南部，生于年降水量1000毫米以上的地区。

|             |                                  |        |
|-------------|----------------------------------|--------|
| 科属：仙人掌科南国玉属 | 学名： <i>Notocactus magnificus</i> | 别名：翠绿玉 |
|-------------|----------------------------------|--------|

英冠玉

**形态：**多年生肉质植物。为大型球，外皮蓝绿色，顶部密生白绒毛。直棱，刺座排列密，有白色短绵毛，黄色。

白色短绵毛



花漏斗状，开于球顶，花黄色。果球形。花期5月，果熟期6月。



花漏斗状

**习性：**喜温暖，喜光照，但夏季要进行适当遮阴，耐旱、忌水涝。对土壤要求不严，但以通透性好的沙质土为佳。

**应用：**花色鲜黄夺目，观赏性强，多盆栽观赏，可用于装饰办公室、居室、客厅等；也可植于专类园。

分布：原产巴西，分布于南里奥格兰德州海拔2200米的山区。




|             |                             |            |
|-------------|-----------------------------|------------|
| 科属：仙人掌科仙人掌属 | 学名： <i>Opuntia dillenii</i> | 别名：仙人扇、仙人桃 |
|-------------|-----------------------------|------------|

## 仙人掌

**形态：**多年生肉质植物，多数能长成灌木。茎多近木质，分枝曲折，茎节扁平，多肉多浆，幼时嫩绿色。叶片退化而成硬刺，刺单生或簇生于刺基上。花侧生，黄色、红色或白色。花期夏季。

**习性：**喜日光充足的环境，耐干旱，不耐荫蔽，喜温暖，不耐寒，畏涝。适合于排水良好的沙质土栽培。

**应用：**可盆栽观赏，多栽培于室外，也可植于专类园中。



分布：原产美国、墨西哥及西印度群岛等地。我国栽培广泛，很多地区已逸为野生。

|             |                                    |              |
|-------------|------------------------------------|--------------|
| 科属：仙人掌科仙人指属 | 学名： <i>Schlumbergera bridgesii</i> | 别名：圣诞仙人掌、霸王花 |
|-------------|------------------------------------|--------------|

## 仙人指

**形态：**多年生肉质植物。多分枝，茎节扁平下垂，花瓣张开反卷，着生茎节顶端两侧，花色有紫红、粉红、橙红等。浆果梨形，光滑、暗红色。花期冬春季，果熟期4 ~ 5月。

**习性：**喜温暖、湿润和荫蔽的环境，喜充足的散射光，不耐寒、不耐湿。以肥沃、疏松、排水良好的土壤为佳。生长适温为18℃ ~ 22℃，越冬温度不要低于8℃。

**应用：**冬季室内优良的观花植物，可用于装点书房、客厅。



分布：原产南美热带森林之中。现我国栽培广泛。



|            |                                  |                |
|------------|----------------------------------|----------------|
| 科属：仙人掌科蟹爪属 | 学名： <i>Zygocactus truncactus</i> | 别名：蟹爪莲、蟹爪、锦上添花 |
|------------|----------------------------------|----------------|

蟹爪兰

**形态：**附生性小灌木。叶状茎扁平多节，肥厚，卵圆形，鲜绿色，先端截形，边缘具粗锯齿。花着生于茎的顶端，花被开张反卷，花色有淡紫、黄、红、纯白、粉红、橙和双色等。花期9月至翌年4月。

**习性：**属短日照植物，喜半阴、湿润、温暖环境，忌烈日暴晒和雨淋，忌空气过于干燥及通风不良。

喜肥沃，排水良好的壤土。

**应用：**① 可盆栽或吊盆栽培，常摆放于窗台、阳台等处观赏。② 入药，可治疮疖肿毒。



花被开张反卷



叶状茎扁平多节

分布：原产巴西，多生于巴西东部热带森林，附着于树干上或较蔽荫的山谷中。

|            |                             |           |
|------------|-----------------------------|-----------|
| 科属：桔梗科风铃草属 | 学名： <i>Campanula medium</i> | 别名：钟花、瓦筒花 |
|------------|-----------------------------|-----------|

风铃草

**形态：**二年生草本，全株具粗毛，株高0.3 ~ 1米。基部叶卵状披针形，茎生叶披针状矩形。总状花序顶生，花冠膨大，钟形，花有白、蓝、紫及淡粉等色。花期4 ~ 6月。

**习性：**喜光照，喜温暖、冷凉的气候，不耐热、不耐寒。在微酸性及微碱性土壤中均能生长，以疏松、肥沃、排水良好的沙质土壤为佳。生长适温为15℃ ~ 22℃。

**应用：**花型奇特，宛如风铃，可用于花坛、花境栽培，适合作背景材料或林缘丛植、片植；也常用于盆栽或切花。



总状花序顶生



花冠膨大，钟形

分布：原产南部欧洲。现我国栽培广泛。



|           |                                    |                    |
|-----------|------------------------------------|--------------------|
| 科属：桔梗科桔梗属 | 学名： <i>Platycodon grandiflorus</i> | 别名：六角荷、铃铛花、包袱花、道拉基 |
|-----------|------------------------------------|--------------------|

桔梗

**形态：**多年生草本，株高0.4 ~ 1.2米。叶3枚轮生、对生或互生，叶片卵形至披针形，叶背被白粉。花常单生，稀为数朵聚生在茎面上；花冠宽钟状，花有蓝色、白色、浅雪青色等。花期6 ~ 9月。

**习性：**喜光照，喜凉爽、湿润的环境，要求阳光充足或侧方蔽荫，耐寒，忌积水。适应性较强，最适肥沃排水良好的沙壤土栽培。

**应用：**① 可用于宿根花境，或作丛植，有时也可用作切花。② 根入药，含桔梗皂甙，具有止咳、祛痰、消炎的功效。



分布：原产我国，多生于海拔2000米以下的阳处灌草丛中，很少生于林下。朝鲜、日本、俄罗斯也有分布。

|             |                            |              |
|-------------|----------------------------|--------------|
| 科属：美人蕉科美人蕉属 | 学名： <i>Canna generalis</i> | 别名：法国美人蕉、红艳蕉 |
|-------------|----------------------------|--------------|

大花美人蕉



**形态：**多年生草本，株高1 ~ 2米，根状茎肉质粗壮。叶大，圆至椭圆状披针形，全缘。总状花序顶生，花大，密集；花瓣直立向上，雄蕊瓣化，花色有红、粉红、黄、橙、紫红等。花期全年。

**习性：**喜温暖、湿润的气候，喜阳光充足，耐湿，但忌积水，怕强风，不耐寒。喜疏松肥沃、排水良好的土壤。生长适温为20℃ ~ 30℃。

**应用：**宜作花境背景或在花坛中心栽植，也可成丛或成带状种植在林园、草地边缘；也适合于庭院栽培。



分布：原产美洲热带。我国南北各地均广泛栽培。



|             |                           |                  |
|-------------|---------------------------|------------------|
| 科属：白花菜科白花菜属 | 学名： <i>Cieome spinosa</i> | 别名：西洋白花菜、风蝶草、紫龙须 |
|-------------|---------------------------|------------------|

醉蝶花

**形态：**一年生草本，株高0.6 ~ 1米。茎直立。掌状复叶，小叶草质，椭圆状披针形或倒披针形，全缘。总状花序顶生，花多数白色到淡紫色。蒴果圆柱形，具纵纹。花期6 ~ 9月，果期夏末秋初。



白色花

淡紫色花



**习性：**喜温暖干燥和阳光充足的环境，耐热耐旱，不耐寒，耐半阴。不择土壤，喜肥沃疏松和排水良好的壤土。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**适于布置花坛、花境或在路边、林缘成片栽植；也可作切花插瓶观赏。

分布：原产美洲热带。我国栽培广泛。

|           |                              |                  |
|-----------|------------------------------|------------------|
| 科属：忍冬科忍冬属 | 学名： <i>Lonicera japonica</i> | 别名：金银藤、忍冬、二色藤、银花 |
|-----------|------------------------------|------------------|

金银花



花黄色

单叶对生



**形态：**常绿或半常绿藤本。茎皮条状剥落，枝中空，密被黄色毛。单叶对生，卵形或卵状长椭圆形。双花着生叶腋，花两性，花冠先为白色，后变黄色，有芳香，花冠筒细长。浆果球形。花期4 ~ 6月，果熟期8 ~ 10月。

**习性：**喜光照充足，稍耐阴，耐寒性强，耐干旱及水淹。对土壤要求不严，酸性、碱性土均能适应，以肥沃、深厚而较疏松的土壤最为宜。

**应用：**① 常沿庭廊架植，缠绕生长，是庭院栽培的优良藤本花卉，也适合园林绿地等的棚架、墙垣等地栽培观赏，还适合盆栽。② 花蕾、茎、叶入药，具有清热解毒的功效。

分布：原产我国。分布极广，北起辽宁，西至陕西，南达湖南，西南至云南、贵州等地。



科属：石竹科石竹属

学名： *Diranthus chinensis*

别名：洛阳花、洛阳石竹、中国石竹

## 石竹

**形态：**宿根性不强的多年生草本，多作一二年生植物栽培，株高30 ~ 50厘米。茎光滑，有节。叶对生，线状披针形。花顶生枝端，单生或成对，也有呈圆锥状聚伞花序，花色有粉、红、紫红、白或复色，单瓣或重瓣，芳香。花期4 ~ 10月。蒴果矩圆形，种子扁圆形，黑褐色。

**习性：**喜向阳，喜高燥、通风的环境，耐寒而不耐酷暑，耐干旱，忌涝。以排水良好的肥沃石灰质壤土为佳。

**应用：**① 花色艳丽，是我国重要的草本花卉，可用于花坛、花境、花台或盆栽。② 根和全草入药，具清热利尿、破血通经及散瘀消肿的功效。



花色多样



叶线状披针形

**分布：**原产我国北方，生于草原山坡草地。现我国栽培普遍，俄罗斯及朝鲜也有分布。



|             |                                 |            |
|-------------|---------------------------------|------------|
| 科属：金粟兰科金粟兰属 | 学名： <i>Chloranthus spicatus</i> | 别名：金粟兰、珍珠兰 |
|-------------|---------------------------------|------------|

珠兰

**形态：**常绿灌木，株高30 ~ 70厘米。叶具柄，对生，椭圆形或倒卵状椭圆形，边缘有钝锯齿，顶端急尖或钝，基部楔形。穗状花序排列成圆锥状顶生，稀腋生，花黄绿色，小似鱼子，无花被，芳香。核果椭圆形。花期8 ~ 10月，果期8 ~ 9月。

**习性：**喜温暖、阴湿的环境，畏直射阳光，不耐寒。要求排水良好和富含腐殖质的酸性壤土。

**应用：**① 可用于林荫下绿化，或布置花卉观赏温室，还可用于香花专类园；也适合盆栽室内观赏，多置于窗台、阳台及案几之上装饰。② 花和根状茎可提取芳香油，鲜花可用于熏茶。③ 全株入药，可治疗风湿、跌打损伤等，根状茎捣烂可治疗疮。

**注意：**本品有小毒，入药应注意用量。



分布：原产亚洲热带及亚热带，生于海拔150 ~ 990米的山坡、沟谷密林中。

|             |                                                          |          |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 科属：鸭跖草科鸭跖草属 | 学名： <i>Tradescantia fluminensis</i> cv. <i>Variegata</i> | 别名：花叶水竹草 |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------|

斑叶水竹草

**形态：**常绿草本。茎呈蔓性，茎节极易生根。叶互生，薄肉质，有光泽，长卵形，翠绿色半透明状，具大小、宽度不等的黄白色条纹。花白色。

**习性：**性喜温暖、湿润的环境条件，耐阴，不耐寒，稍耐旱。对土质要求不严，以疏松、排水良好的沙质土壤为佳。生长适温为18℃ ~ 30℃。

**应用：**盆栽观赏，可用于阳台、窗台及小型案几上装饰，也可植于较阴湿的庭院、公园等地作地被美化环境。



分布：原产美洲及南部非洲。现我国广东、台湾栽培较多。



|             |                                      |               |
|-------------|--------------------------------------|---------------|
| 科属：鸭跖草科鸭跖草属 | 学名： <i>Tradescantia sillamontana</i> | 别名：白绢草、银巨冠、雪绢 |
|-------------|--------------------------------------|---------------|

白雪姬

**形态：**多年生肉质草本，植株丛生，茎直立或稍匍匐，株高15 ~ 20厘米。短粗的肉质茎硬而直，被有浓密的白色长毛。叶互生，绿色或褐绿色，稍具肉质，长卵形，也被有浓密的白毛。小花淡紫粉色，着生于茎的顶部。



小花淡紫粉色

**习性：**喜温暖、湿润的环境和充足而柔和的阳光，耐半阴和干旱，不耐寒，忌烈日曝晒和积水。要求疏松肥沃排水透气土壤。生长适温为16℃ ~ 25℃。

**应用：**常作小型盆栽，点缀案几、书桌、窗台等处。



叶被有浓密的白毛

分布：原产中南美洲的危地马拉、伯利兹、墨西哥等国。我国南北均有栽培。

|             |                             |            |
|-------------|-----------------------------|------------|
| 科属：鸭跖草科水竹草属 | 学名： <i>Zebrina purpusii</i> | 别名：吊竹草、吊竹兰 |
|-------------|-----------------------------|------------|

吊竹梅

**形态：**常绿多年生草本。茎蔓生或呈匍匐状，多分枝，节上有根。叶互生，无柄，卵形或长圆形，叶端尖，基部钝，全缘，绿色，有纵长的紫红色和银白色条斑，叶背为紫红色。花数朵，花序腋生，紫红色。花期5 ~ 9月。



叶端尖

**习性：**喜温暖湿润的气候，不耐寒也不耐旱，耐水湿，较耐阴。适应性较强，适于肥沃、疏松的土壤。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**盆栽观赏，适宜美化卧室、书房、客厅，可放在花架、橱顶，也可作悬挂布置；也常用于半阴处作地被植物。

叶有纵长的紫红色和银白色条斑

分布：原产墨西哥，我国栽培广泛。



|            |                            |             |
|------------|----------------------------|-------------|
| 科属：鸭跖草科蚌兰属 | 学名： <i>Rhoeo spathacea</i> | 别名：紫背万年青、蚌兰 |
|------------|----------------------------|-------------|



## 小蚌花

**形态：**多年生常绿草本，株高20 ~ 30厘米。茎短，叶簇生于茎上，叶面绿色，叶背紫色。花白色，腋生，苞片蚌状。常见栽培种有蚌花及斑叶小蚌花。

**习性：**喜光照，喜高温多湿的环境，耐旱性强。对土质无要求，一般土壤均能良好生长。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**习性强健，栽培容易，可粗放管理，园林应用广泛，多用于路边、花境栽培，常片植；也可用于花坛、花台及盆栽欣赏。



分布：原产热带美洲。我国南方园林应用较多。

|          |                                 |            |
|----------|---------------------------------|------------|
| 科属：菊科蓍草属 | 学名： <i>Achillea millefolium</i> | 别名：千叶蓍、多叶蓍 |
|----------|---------------------------------|------------|

## 西洋蓍草

**形态：**多年生草本，株高30 ~ 60厘米。茎直立，被柔毛。叶互生，无柄，常1 ~ 3回羽状深裂。头状花序，着生于茎顶，花有白色、红色、粉红色等。花期6 ~ 8月。



**习性：**喜阳光充足的环境，也耐半阴，耐寒性强。对土壤要求不严，但以富含有机质及石灰质、排水良好的沙质壤土为宜。生长适温为10℃ ~ 25℃。

**应用：**可用于花境、花坛绿化，也可用于岩石园，还适合盆栽及切花观赏。

分布：原产欧洲、亚洲及北美洲。我国江浙一带栽培较多。



科属：菊科藿香蓟属

学名： *Ageratum conyzoides*

别名：胜红蓟



# 藿香蓟

**形态：**多年生草本，常作一年生栽培，株高30 ~ 60厘米。全株被毛，植株基部多分枝。叶对生，叶片卵形。头状花序，小花全部为管状花，花色有淡蓝色、蓝色、粉色、白色等。瘦果，褐黄色。花期7 ~ 10，果熟期9月。

**习性：**喜温暖和阳光充足环境，不耐寒，怕高温。对土壤要求不严，耐瘠薄，以肥沃、排水良好的沙壤土为好。

**应用：**① 常用来配置花坛和地被，可用于小庭院、路边、岩石旁点缀；也可盆栽观赏。② 全草入药，具清热解毒、消炎止血的功效，主治感冒发热、疮疹湿疹、外伤出血、烧烫伤等。



粉色花

分布：原产美洲热带，多见于田间地头，山坡林下、路边及沟渠等地。市场出售的均为园艺种。



|           |                                                  |          |
|-----------|--------------------------------------------------|----------|
| 科属：菊科木茼蒿属 | 学名： <i>Argyranthemum gracile</i> cv. Double Pink | 别名：粉花茼蒿菊 |
|-----------|--------------------------------------------------|----------|



## 重瓣玛格丽特

**形态：**宿根草本，株高25 ~ 40厘米。叶互生，羽状细裂，裂片线形，具缺刻或短突尖。头状花序，粉红色，管状花黄色，有单瓣及重瓣。花期冬春季。

**习性：**喜冷凉至温暖的环境，忌高温、高湿，生长适温为12℃ ~ 25℃。栽培用土以排水良好、日照充足、腐殖质丰富的沙质土壤为佳。

**应用：**①是盆栽的优良观花植物，可置于阳台、窗台等向阳的地方养护，也是庭院、花坛和花境的佳品。②切花可用于插花。



分布：栽培种。

|          |                            |               |
|----------|----------------------------|---------------|
| 科属：菊科雏菊属 | 学名： <i>Bellis perennis</i> | 别名：太阳菊、延命菊、春菊 |
|----------|----------------------------|---------------|

## 雏菊

**形态：**多年生草本，株高15 ~ 20厘米。叶基部簇生，倒卵形或匙形。头状花序单生，花梗自叶丛中抽出，舌状花多轮呈白、粉、红色，管状花黄色。花期2 ~ 5月。瘦果倒卵形，种子灰白色。



**习性：**性喜阳光充足、冷凉湿润环境，耐寒、不耐酷热、不耐水湿。对土壤要求不严，以肥沃、富含腐殖质的土壤最为适宜。生长适温为18℃ ~ 25℃。



**应用：**多盆栽置于阳台、窗台等处观赏，也可用于布置花坛、花境。

分布：原产欧洲至西亚。我国各地均有栽培。



科属：菊科金盏菊属    学名： *Calendula officinalis*    别名：金盏、金盏花、黄金盏、长生菊

# 金盏菊

**形态：**一二年生草本，株高40 ~ 50厘米，全株具毛。叶互生，长圆形至长圆状倒卵形，全缘或有不明显锯齿，基部稍抱茎。头状花序单生，舌状、花黄色、橙黄色，有单瓣、重瓣。花期4 ~ 9月。

**习性：**喜阳光充足环境，耐寒，怕热。以肥沃、疏松和排水良好的沙质壤土为宜。生长适温为15℃ ~ 20℃。

**应用：**适宜布置花坛、花境，也可盆栽或作插花。



头状花序单生



全株具毛

**分布：**原产欧洲南部及地中海沿岸。金盏菊属约有20种，我国常见栽培1种。



|         |                                     |                            |
|---------|-------------------------------------|----------------------------|
| 科属：菊科菊属 | 学名： <i>Chrysanthemum morifolium</i> | 别名：鞠、寿客、傅延年、节华、金蕊、黄花、女华、九华 |
|---------|-------------------------------------|----------------------------|



# 菊花

**形态：**多年生宿根草本，株高0.2 ~ 2米。单叶互生，两侧有托叶或退化，叶卵形至长圆形，边缘有缺刻及锯齿；叶的形态因品种而异。头状花序生于枝顶，舌状花为雌花，管状花为两性花，花序外由绿色苞片构成花苞，花色有红、黄、白、紫、绿、复色等。花期多为秋季。

**习性：**多为短日照，喜凉爽，较耐寒，喜光照充足，耐旱，也稍耐阴，忌涝。要求排水通气良好、富含有机质的土壤。

**应用：**可用于园路、庭廊等绿化栽培，或用作花坛、花镜布置；也是我国重要的盆栽花卉及切花。



分布：原产我国。全国各地均有分布。

|           |                              |            |
|-----------|------------------------------|------------|
| 科属：菊科瓜叶菊属 | 学名： <i>Cineraria cruenta</i> | 别名：千叶莲、千日莲 |
|-----------|------------------------------|------------|



# 瓜叶菊

**形态：**多年生草本，株高30 ~ 60厘米。茎粗大。叶大，心脏形卵状，叶缘具波状或多角状齿，叶面翠绿，背面紫红。花为头状花序簇生成伞状，舌状花具有各种颜色及斑纹；花有紫红、桃红、粉、紫、蓝、白等色。花期12月至次年5月。瘦果纺锤形。

**习性：**喜凉爽、阳光充足及干燥环境，不耐高温，稍耐寒，忌烈日和积水。喜疏松、富含腐殖质、排水良好的沙壤土。生长适温为15℃ ~ 20℃。

**应用：**可作花坛栽植或盆栽布置于庭廊过道，还可于室内盆栽装饰及用作切花。

叶缘具波状或多角状齿



分布：原产大西洋的加那利群岛。我国各地公园及庭院广泛栽培。



|           |                                |             |
|-----------|--------------------------------|-------------|
| 科属：菊科金鸡菊属 | 学名： <i>Coreopsis tinctoria</i> | 别名：小波斯菊、金星菊 |
|-----------|--------------------------------|-------------|



## 蛇目菊

**形态：**一年生草本，株高30 ~ 90厘米。全株光滑多枝。叶对生，二回羽状深裂，裂片披针形，全缘。头状花序有总梗，着生在纤细枝条顶端，舌状花黄色，基部红褐色；管状花紫褐色。花期6 ~ 9月，瘦果纺锤形。

**习性：**喜阳光充足，耐寒力强，耐干旱，耐瘠

薄。不择土壤，以疏松、肥沃、排水良好的壤土为佳。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**①可植于花境或庭院、草地。②可作切花材料。

舌状花黄色，基部红褐色



分布：原产墨西哥。我国有栽培，在少数地区逸为野生。

|           |                              |       |
|-----------|------------------------------|-------|
| 科属：菊科金鸡菊属 | 学名： <i>Coreopsis basalis</i> | 别名：黄菊 |
|-----------|------------------------------|-------|

## 金鸡菊

**形态：**一年生宿根草本，株高60 ~ 80厘米。叶1 ~ 2回羽状裂，裂片少数，短椭圆形；上部叶裂片条形，基部叶披针形或长圆形，全缘。头状花序，舌状花黄色，有薄鳞状翅，冠毛极小或缺，基部红褐色。花期5 ~ 11月。瘦果。

**习性：**喜阳光充足，耐寒力不强，耐半阴、忌炎热。对土壤要求不严，要求排水良好的土壤。

**应用：**①用作花坛、路边的整形布置。②可作切花。③对二氧化硫有较强的抗性，适合植于厂矿区。

舌状花黄色



分布：原产美国东部地区。我国南北均有栽培。



科属：菊科大丽花属

学名： *Dahlia pinnata*

别名：东洋菊、天竺牡丹、大理花、西番莲、洋芍药



# 大丽花

**形态：**多年生草本，株高0.5 ~ 1.5米。肉质块根肥大，呈圆球形。茎直立，有分枝。叶对生，羽状深裂，裂片卵形。头状花序顶生，由中间管状花和外围舌状花组成，管状花两性，多为黄色，舌状花单性或中性，有白、黄、橙、红、紫等色。花期7 ~ 10月。瘦果长椭圆形。

**习性：**喜欢阳光充足、通风良好的环境，不耐寒、忌炎热，不耐旱又忌积水。土壤以富含腐殖质、排水良好的沙质壤土为宜。



**应用：**① 适合花坛、花境栽培应用，各地庭院栽培较多，为大众化花卉；也可盆栽观赏，是近年来南方春节花市常见的热销品种。  
② 根含有菊糖，在医药上与葡萄糖有同样的功效。

外围舌状花

分布：原产墨西哥。现栽培的均为园艺种，约有数千个品种，在我国云南等地，已逸为野生。



科属：菊科松果菊属

学名：*Echinacea purpurea*


别名：紫松果菊

紫椎花

**形态：**多年生草本，株高0.6 ~ 1.5米。全株具粗毛，茎直立。基生叶卵形或三角形，茎生叶卵状披针形，叶柄基部稍抱茎。头状花序单生于枝顶，或数多聚生，舌状花紫红色，管状花橙黄色。花期6 ~ 7月。

**习性：**喜阳光充足、温暖的环境，稍耐寒。喜肥沃、深厚、富含有机质的土壤。

**应用：**适宜作花境、坡地材料，也适合花坛、花台种植，亦可盆栽及切花。



分布：原产北美。我国栽培广泛。

科属：菊科勋章花属

学名：*Gazania splendens*

别名：勋章花

勋章菊

**形态：**一二年生草本。具根茎，叶由根际丛生，叶片披针形或倒卵状披针形，全缘或有浅羽裂，叶背密被白绵毛。头状花序，舌状花白、黄、橙红色，有光泽。花期4 ~ 6月。

**习性：**喜温暖、湿润和阳光充足环境，不耐寒，耐高温，怕积水。以肥沃、疏松和排水良好的沙质壤土为佳。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**① 常盆栽摆放于花坛或草坪边缘，也可点缀小庭园或窗台。  
② 可用作插花材料。



白色舌状花



头状花序

分布：原产非洲南部。现我国南北均有栽培，多盆栽。



|           |                              |            |
|-----------|------------------------------|------------|
| 科属：菊科大丁草属 | 学名： <i>Gerbera jamesonii</i> | 别名：扶郎花、大丁草 |
|-----------|------------------------------|------------|

## 非洲菊



**形态：**多年生草本。全株被细毛，基生叶多数，长椭圆状披针形，羽状浅裂，叶缘具疏齿。头状花序单生于花序总梗顶端，舌状花大，呈倒披针形或带状，多为两轮；筒状花较小，尖端二歧分叉，舌状花有白、黄、橙、红、粉等不同颜色，四季均可开花。

**习性：**喜温暖、阳光充足的环境，耐热、稍耐寒。要求疏松肥沃、排水良好、富含腐殖、土层深厚、微酸性的沙质壤土。生长适温为18℃ ~ 25℃。

**应用：**常用来盆栽装饰门庭、厅室，是我国及国际重要的切花之一；也适合公园绿地大面植栽培欣赏。

分布：原产南非。园艺品种极多，我国南北均有栽培。

|           |                              |                             |
|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 科属：菊科菊三七属 | 学名： <i>Gynura aurantiana</i> | 别名：紫绒三七、红凤菊、爪哇三七草、土三七、橙黄土三七 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------|

## 紫鹅绒

**形态：**多年生常绿草本或亚灌木，株高0.5 ~ 1米。全株被紫红色绒毛，直立、多汁。叶对生，卵圆形，边缘呈不规则锯齿状，两面有细而短的茸毛，叶面红堇色或蓝紫色。头状花序生于茎的叶腋处，小花橙色，花期4 ~ 5月。

**习性：**喜温暖、湿润、半阴的环境，怕阳光直射，耐寒性不强。适宜肥沃、疏松和排水良好的泥炭土或腐叶土。生长适温为18℃ ~ 28℃。

**应用：**适宜盆栽或吊盆种植，用于装饰美化居室或厅堂环境。

全株被紫红色绒毛



分布：原产印度尼西亚等亚洲热带地区。我国引进盆栽。



|           |                              |               |
|-----------|------------------------------|---------------|
| 科属：菊科向日葵属 | 学名： <i>Helianthus annuus</i> | 别名：葵花、朝阳花、转日莲 |
|-----------|------------------------------|---------------|



舌状花黄色

叶片呈心脏形，边缘有缺刻或锯齿



# 向日葵

**形态：**一年生的草本，株高1 ~ 3米。茎直而粗壮，有白色粗硬毛。叶片呈心脏形，边缘有缺刻或锯齿。头状花序单生茎顶，舌状花黄色，雌性，管状花紫褐色、两性。花期7 ~ 10月。果熟期9 ~ 11月。观赏有重瓣种。

头状花序单生茎顶



**习性：**喜温暖，要求阳光充足，耐旱。对土壤要求不严，耐瘠薄，盐碱地也能生长。

**应用：**① 适于宅旁空地种植或作园林中的背景材料，也可用于花境；矮化种也适合盆栽观赏。② 种子可食用，种子含油量高，油可食用。③ 花穗、种皮及茎秆可作饲料及工业原料。④ 花穗也可药用。

**分布：**原产北美。现我国栽培广泛，园艺品种繁多。



|          |                                   |           |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| 科属：菊科蜡菊属 | 学名： <i>Helichrysum bracteatum</i> | 别名：蜡菊、贝细工 |
|----------|-----------------------------------|-----------|

管状花  
黄色

叶条状或  
披针形



## 麦杆菊

**形态：**多年生草本，常作一年生草本，株高0.7 ~ 1.2米。茎秆直立。叶互生，条状或披针形，全缘。头伏花序单生枝顶，内部几层苞片伸长成为花瓣状，淡红色或黄色，基部变厚带绿色，干燥而硬，管状花黄色。花色有白、淡红、玫瑰红、紫红，也有淡黄、深黄至深枣红。花期7 ~ 9月。

**习性：**喜阳光，忌酷热，不耐寒，忌水湿。对土壤的适应性较强，以肥沃及排水良好的土壤为宜。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**可布置花坛花境，也可盆栽观赏，还可用作干燥花、切花和插花。



分布：原产澳洲。我国南北栽培广泛。

|           |                                  |                          |
|-----------|----------------------------------|--------------------------|
| 科属：菊科车轮菊属 | 学名： <i>Osteospermum ecklonis</i> | 别名：美轮菊、蓝心菊、紫轮菊、蓝眼菊、非洲万寿菊 |
|-----------|----------------------------------|--------------------------|

## 蓝目菊

**形态：**半灌木或多年生宿根草本，株高20 ~ 50厘米。基生叶丛生，茎生叶互生，羽裂。顶生头状花序，舌瓣花，中央为蓝紫色管状花，花色有白色、紫色、淡黄色、橘红色等。花期2 ~ 7月。

**习性：**喜温暖阳光充足环境，耐干旱、不耐寒。对土壤要求中等，以疏松、肥沃的沙质壤土为佳。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**用于布置花坛、花镜，也可盆栽观赏。



白色花



顶生头状花序

分布：原产南非。目前栽培的均为杂交种。



科属：菊科金光菊属

学名：*Rudbeckia hirta*

别名：黑心花、黑心金光菊、黑眼菊

黑心菊

**形态：**一二年生草本，株高0.3 ~ 1米。茎不分枝或上部分枝，全株被毛。上部叶互生，长圆披针形，叶缘具齿或全缘，下部叶长椭圆形，长圆形或匙形。头状花序单生，舌状花金黄色，管状花暗褐色或暗紫色。花期5 ~ 9月。

**习性：**性强健，喜阳光充足，耐干旱、耐寒。不择土壤，宜用疏松、肥沃土壤栽培。生长适温为12℃ ~ 30℃。

**应用：**我国各地庭院中常见栽培，可作花境材料，也可在林缘、隙地成片种植。



管状花暗褐色或暗紫色



舌状花金黄色

分布：原产北美地区。我国南北均有栽培。

科属：菊科金纽扣属

学名：*Spilanthes oleracea*

别名：金纽扣、铁拳头、千日菊、斑花菊

桂圆菊

**形态：**一年生草本，株高15 ~ 30厘米。叶对生，具柄，叶缘有锯齿。头状花序单生于茎、枝的顶端或叶腋，花梗细而长，花黄色。花期长，几乎全年。

**习性：**喜温暖及光照充足的环境，光照不足易徒长且开花减少，较耐旱。对土质要求不严，以疏松、排水良好的壤土为佳。生长适温为18℃ ~ 24℃。

**应用：**适合盆栽欣赏，也可用于花坛、花境及园路边栽培。

花梗细而长



分布：原产热带或亚热带。目前栽培的均为园艺种。



|           |                           |               |
|-----------|---------------------------|---------------|
| 科属：菊科万寿菊属 | 学名： <i>Tagetes erecta</i> | 别名：臭芙蓉、蜂窝菊、臭菊 |
|-----------|---------------------------|---------------|

万寿菊

**形态：**一年生草本，株高0.6 ~ 1米。茎粗壮直立。叶对生或互生，羽状全裂，裂片披针形，叶缘背面具油腺点，有强臭味。头状花序单生，花黄色或橘黄色，舌状花有长爪、边缘皱曲。花期6 ~ 10月。



**习性：**喜温暖、湿润和阳光充足环境，耐干旱，不耐高温酷暑，也不耐寒。对土壤要求不严，以肥沃、排水良好的沙质壤土为佳。生长适温为15℃ ~ 20℃。

**应用：**① 矮生种可盆栽观赏，或用于布置花坛、广场、花境。② 为优良的切花材料。

分布：原产墨西哥。目前栽培的均为园艺种，现我国南北均有种植。

|           |                           |                         |
|-----------|---------------------------|-------------------------|
| 科属：菊科万寿菊属 | 学名： <i>Tagetes patula</i> | 别名：小万寿菊、红黄草、臭菊花、西番菊、缎子花 |
|-----------|---------------------------|-------------------------|

孔雀草

**形态：**一年生草本花卉，株高30 ~ 90厘米。叶羽状分裂，裂片线状披针形，边缘有锯齿。头状花序，单生，舌状花黄色或橙色，带有红色斑，管状花黄色。瘦果线形，基部缩小。花期7 ~ 9月，果期8 ~ 10月。

**习性：**喜阳光充足及温暖的环境，在半阴处生长良好，有一定的抗寒性，较耐旱，忌湿。以富含腐殖质、排水良好的沙质壤土为佳。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**多用来布置花坛、花境及庭院种植，优良品种可盆栽置于室内欣赏。



分布：原产墨西哥。现我国各地均有栽培。



科属：菊科蟛蜞菊属

学名：*Wedelia trilobata*

别名：三裂蟛蜞菊、地锦花、穿地龙

## 南美蟛蜞菊

**形态：**多年生常绿草本，株高10 ~ 20厘米，匍匐生长。叶对生，三叉掌状或三裂状披针形，叶缘有锯齿，叶具光泽。花腋生，黄色，具长柄。花期全年，以夏、秋两季为最盛。

**习性：**喜光照，喜温暖、湿润的环境条件，较耐旱。一般土质均能良好生长。生长适温为18℃ ~ 30℃。

**应用：**覆盖性极强，是水土保持的优良植物，适合边坡、绿地及荒地等绿化；也可用于庭院绿化。



花黄色



叶三叉掌，  
叶缘有锯齿

分布：原产南美洲。现我国各地栽培普遍。

科属：菊科百日草属

学名：*Zinna elegans*

别名：步步高、节节高、对叶梅

## 百日草

**形态：**一年生草本花卉，株高0.3 ~ 1米。茎直立。叶对生，广卵形至长椭圆形，基部抱茎，全缘。头状花序着生于枝顶，舌状花扁平、反卷或扭曲，常多轮呈重瓣状，有白、绿、黄、粉、红、橙等色，或有斑纹，或瓣基有色斑。花期6 ~ 10月。

**习性：**喜温暖、阳光充足的环境，不耐寒，耐干旱、耐瘠薄，忌连作。对土壤要求

不严，以排水良好、疏松、肥沃的土壤为佳。生长适温为18℃ ~ 25℃。

**应用：**是庭院绿化的优良品种，也可用于布置花坛，花境；矮化品种也可盆栽观赏，高型品种还可用于切花。



叶广卵形至  
长椭圆形



橙色花

分布：原产北美、墨西哥及南美等地。我国南北均有栽培。



|            |                                  |                |
|------------|----------------------------------|----------------|
| 科属：旋花科月光花属 | 学名： <i>Calonyction aculeatum</i> | 别名：夜光花、夕颜、嫦娥奔月 |
|------------|----------------------------------|----------------|

月光花



花白色

**形态：**草本蔓性植物，蔓长可达10米。叶互生，心形、肾形或戟形，全缘或有角或分裂。聚伞花序腋生，花冠大，高脚蝶形，花冠管狭圆柱形，长而柔软，花白色，芳香。傍晚开放，白天闭合。花期7 ~ 9月。

**习性：**喜温暖、湿润及阳光充足的环境，耐旱，不耐寒。对土壤无特殊要求，盆栽以通透性良好、肥沃的土壤为宜。

**应用：**① 适于花架和篱垣布置，也可在阳台垂直绿化栽培。② 肉质萼及嫩叶可作蔬菜，干花可做汤及点心。



叶心形、肾形或戟

分布：原产非洲热带。现广布于热带地区，我国南方部分省区有栽培，有些地区逸为野生。

|            |                                |            |
|------------|--------------------------------|------------|
| 科属：景天科青锁龙属 | 学名： <i>Crassula portulacea</i> | 别名：燕子掌、景天树 |
|------------|--------------------------------|------------|

玉树



肉质，卵圆形

**形态：**常绿小灌木，株高1 ~ 3米。茎肉质，多分枝，圆柱形。叶对生，扁平，肉质，卵圆形，全缘，灰绿色，有红边。花白色或淡粉色。

**习性：**喜温暖、好阳光充足，耐干旱，也耐半阴，不耐寒。对土质要求不严，喜疏松、排水良好的沙质壤土，忌土壤过湿。

**应用：**肉质茎基部膨大，观赏性较佳，多盆栽，可置于阳台、天台等处观赏，还可用于多肉类植物的专类园栽培。

**注意：**玉树叶中含有大戟脂素，人体接触叶中流出的汁液时，会引起皮肤发红、肿胀、疼痛。

分布：原产南非，多生于年降雨量500毫米左右的地区。现各地有栽培。



科属：景天科石莲花属

学名：*Echeveria peacockii*

别名：莲花掌、仙人荷花

石莲花

**形态：**多年生宿根多浆植物。茎短缩，枝匍匐。叶倒卵形，似荷花瓣，肥厚多汁，先端锐尖，稍带粉蓝色，叶心淡绿色，大叶微带紫晕，表面具白粉。总状聚伞花序，花冠红色，花瓣不张开。花期7 ~ 10月。

**习性：**喜温暖干燥、光照充足，耐干旱，也耐半阴，不太耐寒，忌积水粘滞。对土壤要求不严，以肥沃、排水良好的沙壤土为宜。

**应用：**多盆栽，为室内绿色装饰之佳品，也适用于专类园栽培。



分布：原产墨西哥。我国栽培普遍。

科属：景天科伽蓝菜属

学名：*Kalanchoe synsepala*

别名：双飞蝴蝶、去蝶丽、趣情莲

趣蝶莲

**形态：**多年生常绿多肉草本，植株具短茎。对生叶卵形，有短柄，叶缘有锯齿状缺刻。花葶由叶腋处抽出，小花悬垂铃形，黄绿色。

**习性：**适宜温暖干燥和阳光充足的环境，耐干旱和半阴，怕低温和积水。以疏松、肥沃的沙壤土为佳。

**应用：**适宜盆栽置于窗台、柜顶、书桌等处观赏。



分布：原产非洲东南部的马达加斯加岛。我国南北均有栽培。



|            |                                    |                    |
|------------|------------------------------------|--------------------|
| 科属：景天科伽蓝菜属 | 学名： <i>Kalanchoe blossfeldiana</i> | 别名：圣诞伽蓝菜、矮生伽蓝菜、寿星花 |
|------------|------------------------------------|--------------------|

长寿花



**形态：**多年生肉质草本，株高10 ~ 30厘米。茎直立。叶肉质，交互对生，长圆状匙形，深绿色。圆锥状聚伞花序，小花高脚蝶状，花色有绯红、桃红、橙红、黄、橙黄和白等，有单瓣、重瓣。花期2 ~ 5月。



**习性：**短日照植物，喜温暖稍湿润和阳光充足的环境，不耐寒，耐干旱。以肥沃的沙壤土为好。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**可室内盆栽，布置窗台、书桌、案头，或用于公共场所的花槽、橱窗和大厅等，也可用于秋季花坛布置。

分布：原产非洲马达加斯加，多生于阳光充足的热带地区。现栽培的多为园艺种。

|            |                                |                   |
|------------|--------------------------------|-------------------|
| 科属：景天科伽蓝菜属 | 学名： <i>Kalanchoe laciniata</i> | 别名：伽蓝菜、裂叶落地生根、大还魂 |
|------------|--------------------------------|-------------------|

鸡爪三七

**形态：**多年生肉质草本，株高0.2 ~ 1米。茎直立。叶对生，中部肉羽状深裂，裂片线形或线状披针形，边缘具浅锯齿或浅裂。聚伞花序顶生，花冠黄色，四裂，高脚碟状。冬春开花。



**习性：**喜光照，喜温暖、湿润的气候条件，耐旱、不耐寒、不耐水湿。对土壤要求不严，一般土壤均可生长。生长适温为15℃ ~ 20℃。

**应用：**① 多盆栽置于室内装饰与观赏，也可用于园林绿地及专类园栽培。② 全株入药，具有散瘀止血、清热解毒的功效。



分布：亚洲热带及非洲北部，我国南北均有栽培。



科属：景天科伽蓝菜属

学名： *Kalanchoe tomentosa*

别名：月兔耳

## 褐斑伽蓝

**形态：**多年生多肉类植物，株高20厘米左右。茎直立，分枝较多。叶片肉质，奇特，形似兔耳，肉质匙形叶密被白色绒毛，叶边具齿，叶片边缘着生褐色斑纹。花期夏、秋两季。



**习性：**喜温暖干燥和阳光充足的环境，不耐寒，耐干旱，不耐水湿。

以肥沃、疏松的沙壤土为宜。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**盆栽观赏，用于居室、书桌及案几上进行装饰，效果较佳；也可用于多肉植物专类园。

· 叶片边缘着生褐色斑纹

分布：原产非洲马达加斯加岛。我国引进栽培。

科属：景天科景天属

学名： *Sedum morganianum*

别名：松鼠尾、翡翠景天、串珠草

## 白菩提

**形态：**多年生常绿亚灌木状，分枝从基部分出。叶长圆状披针形，肉质，浅绿色，急尖，叶易脱落，落地后易生根。顶生伞房花序，花紫红色。

**习性：**喜光照，较耐阴，宜植于通风良好的地方。对土壤要求不严，需排水良好。生长适温为15℃ ~ 22℃。

**应用：**优良的室内小盆栽植物，可置于案几、书桌、窗台等地欣赏，也可吊盆栽植欣赏。



· 叶长圆状披针形

分布：原产墨西哥干旱、阳光充足的亚热带地区。



|             |                             |             |
|-------------|-----------------------------|-------------|
| 科属：十字花科紫罗兰属 | 学名： <i>Matthiola incana</i> | 别名：草桂花、草紫罗兰 |
|-------------|-----------------------------|-------------|

紫罗兰

**形态：**一二年生或多年生草本，株高20 ~ 70厘米。全株被灰色星状柔毛，茎直立木质化，多分枝。单叶互生，长圆形至倒披针形，先端钝，全缘。总状花序顶生和腋生，花有紫红、淡红、淡黄、白色等，微香。花期5 ~ 9月。

**习性：**喜冬季温和、夏季凉爽的气候，喜阳光充足，稍耐半阴，忌炎热多湿环境。对土壤的适应性比较广泛，最适宜在排水良好的壤土中生长。生长适温为10℃ ~ 22℃。

**应用：**① 适合盆栽培养观赏，也可植于庭院欣赏。  
② 为切花的优良材料。

分布：原产欧洲地中海沿岸。我国各大城市均有引种栽培。



|            |                                   |                 |
|------------|-----------------------------------|-----------------|
| 科属：桫欏科白桫欏属 | 学名： <i>Sphaeropteris lepifera</i> | 别名：蛇木、多鳞白桫欏、山棕蕨 |
|------------|-----------------------------------|-----------------|

笔筒树

**形态：**大型蕨类，树木状，茎直立，高可达10米。叶片极大，三回羽状裂叶，叶背灰白色，丛生于茎干顶端，叶柄粗，叶背之孢子群囊呈圆形。孢子囊群生长期约4个月，孢子叶一年长两次，分别在4月和10月。

**习性：**喜温暖、潮湿环境，耐阴，忌强光。以富含有机质的土壤为佳。生长适温为18℃ ~ 20℃。

**应用：**树干具叶痕，修长而美观，多用于公园或专类园中，也可用于庭园美化。



分布：原产台湾、琉球和菲律宾，多生于林缘、路边或山坡的向阳地段。广东、福建及香港等地均有引种栽培。



|           |                           |                  |
|-----------|---------------------------|------------------|
| 科属：苏铁科苏铁属 | 学名： <i>Cycas revoluta</i> | 别名：铁树、凤尾蕉、番蕉、避火蕉 |
|-----------|---------------------------|------------------|

# 苏铁

**形态：**常绿木本，全株呈伞形。叶丛生茎端，为大型羽状复叶，由数十对乃至百对以上细长小叶组成；小叶线形，初生时内卷，成长后挺直刚硬，深绿色，有光泽。花顶生，雌雄异株，雄球花圆柱形，黄色；雌球花头状扁球形，密生褐色绒毛。种子倒卵形，略扁，棕红色。花期6 ~ 7月，种子10月成熟。

**习性：**喜光，喜温暖、干燥及通风良好的环境，不耐寒。土壤以肥沃、疏松、微酸性的沙质壤土为佳。生长适温为20℃ ~ 30℃。

**应用：**① 盆栽观叶植物，适宜中心花坛和广场等公共场所摆设，幼株常作室内盆栽观赏。② 种子含油和丰富的淀粉，药用对痢疾有一定的疗效，并有止咳和止血的功效。



大型羽状复叶



**分布：**原产我国南部和印度，多生于山坡湿润之地。日本南部、菲律宾及印尼也有分布。



|            |                             |                    |
|------------|-----------------------------|--------------------|
| 科属：苏铁科泽米铁属 | 学名： <i>Zamia furfuracea</i> | 别名：阔叶铁树、美叶凤尾蕉、南美苏铁 |
|------------|-----------------------------|--------------------|

鳞秕苏铁

**形态：**多年生常绿灌木，株高0.3 ~ 1.5米，丛生。羽状复叶簇生于茎顶，小叶革质，椭圆形或倒长卵形，叶缘具有不规则的浅缺刻，叶翠绿，具光泽，叶被面密被鳞秕。雌雄异株，花期初夏。

**习性：**适应性极强，喜光照，喜温暖、湿润及通风良好的环境，较耐寒、耐热、耐旱，忌积水。对土质无特殊要求。生长适温为20℃ ~ 25℃。



**应用：**多用于园林绿地，可植于山石边、林缘下、水畔等地，也适合布置庭院、小区及盆栽室内观赏。

叶翠绿，具光泽

叶椭圆形或倒长卵形

分布：原产墨西哥及哥伦比亚。

|             |                              |            |
|-------------|------------------------------|------------|
| 科属：茅膏菜科捕蝇草属 | 学名： <i>Dionaea muscipula</i> | 别名：蝇夹子、蚌壳草 |
|-------------|------------------------------|------------|

捕蝇草

**形态：**多年生草本食虫植物。茎很短，基生叶莲座状，叶柄扁平，叶片对生成略为展开的蚌壳状，沿中脉可闭合，边缘有尖锐的硬刺，当昆虫进入后，叶片迅速关闭并产生粘液，将其消化。聚伞花序，直立，顶生，花白色。花期夏季。

**习性：**喜温暖、湿润，要求较高的空气湿度，不耐寒。适宜于疏松透气、富含腐殖质的土壤。生长适温为15℃ ~ 20℃。

**应用：**为珍奇有趣的食虫植物，可供室内盆栽观赏。

叶片对生成略为展开的蚌壳状



分布：原产北美东南部。我国引进栽培。



|         |                                  |                      |
|---------|----------------------------------|----------------------|
| 科属：柿科柿属 | 学名： <i>Diospyros cathayensis</i> | 别名：黑塔子、刺柿、乌柿、瓶兰花、丁香柿 |
|---------|----------------------------------|----------------------|

金弹子

**形态：**常绿灌木或小乔木。枝干黑色，有芒刺，叶椭圆形，黑绿色，有光泽。大多数雌雄异株，偶有雌雄同株，花青白色，雄株开花数量较多，花朵较小；雌株开花数量较少，花朵稍大。果实有椭圆形、圆球形、葫芦形。花期5 ~ 6月份，果期9 ~ 10月。

**习性：**适应性强，喜温暖亦耐寒，喜湿润也耐干旱。以土层深厚、排水良好、富有机质的壤土或粘土壤最适宜。

**应用：**① 既可观叶，又可观花、观果的优良盆景素材；也可用于园林绿地，可单植，列植。  
② 根、果入药，治心气痛。



分布：原产我国四川，湖北、云南、贵州、湖南、安徽等地，生于海拔600 ~ 1500米的河谷、山地或山谷林中。

|           |                                   |         |
|-----------|-----------------------------------|---------|
| 科属：杜英科杜英属 | 学名： <i>Elaeocarpus apiculatus</i> | 别名：长芒杜英 |
|-----------|-----------------------------------|---------|

尖叶杜英

**形态：**常绿大乔木，株高可达30米。小枝粗大，有灰褐色柔毛。单叶互生，倒披针形，锯齿缘。总状花序生于枝顶腋内，花白色。果椭圆形，成熟时黄黑色。花期7月，果熟期10 ~ 11月。

**习性：**喜温暖至高温湿润的环境，耐寒，耐阴。适生于排水良好的微酸性壤土中。生长适温为18℃ ~ 28℃。

**应用：**适作园景树、行道树及庭荫树，宜丛植、片植，或与其他树配植。



分布：原产我国云南、广东及海南，多见于低海拔的山谷中。中南半岛及马来西亚也有分布。



|             |                                 |             |
|-------------|---------------------------------|-------------|
| 科属：杜鹃花科杜鹃花属 | 学名： <i>Rhododendron hybrida</i> | 别名：西鹃、比利时杜鹃 |
|-------------|---------------------------------|-------------|

## 西洋杜鹃

**形态：**常绿小灌木，株高约15 ~ 50厘米。叶互生，叶片绿色，长卵形。花簇生于枝端，花冠喇叭状，花色有红、白、粉、粉红、紫红及复色等，单瓣或重瓣。花期春季。

**习性：**喜温暖、冷凉的环境条件，不耐暑热，忌强光。土质以疏松、肥沃的微酸性壤土为佳。生长适温为18℃ ~ 25℃。

**应用：**花色品种丰富，花色艳丽，为我国著名的年宵花卉，可置于客厅、阳台绿化装饰。

分布：本种为杂交种，是由映山红、皋月杜鹃及白花杜鹃反复杂交而成。

|             |                                 |         |
|-------------|---------------------------------|---------|
| 科属：杜鹃花科杜鹃花属 | 学名： <i>Rhododendron hybrida</i> | 别名：树型杜鹃 |
|-------------|---------------------------------|---------|

## 石楠杜鹃

**形态：**多年生常绿灌木或小乔木，株高约3米。叶互生，密集着生于枝条顶端，叶椭圆形或披针形，革质，绿色，有的品种具有金黄色色斑或镶边。总状伞形花序，花朵钟状，单瓣或重瓣，有红、粉、白、淡紫、橙红、橙黄等色。花期3 ~ 5月。

**习性：**喜温暖、凉爽及湿润的半阴环境，不耐热、不耐旱、不耐水湿。栽培基质以疏松、排水良好的微酸性土壤为宜。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**开花繁茂、花色艳丽，是春节常用的名贵花卉，多盆栽置于室内装饰厅堂，也可用于园林小景。

分布：市场上所见的石楠杜鹃均为杂交种，部分原种产于我国西南部。





科属：杜鹃花科杜鹃花属

学名： *Rhododendron pulchrum*

别名：锦绣杜鹃、鲜艳杜鹃



## 毛鹃

**形态：**半常绿灌木，株高1.5 ~ 2.5米。叶薄革质，椭圆状长圆形至椭圆状披针形或长圆状倒披针形，先端纯尖，基部楔形。伞形花序顶生，有花1 ~ 5朵。花冠玫瑰紫、粉红等色，阔漏斗形，裂片5，深裂，披针形，具深红色斑点。花期4 ~ 5月，果期9 ~ 10月。

**习性：**喜温暖、湿润的环境条件，喜光照，较耐寒。对土质要求不严，一般土壤均可良好生长。

**应用：**多用于园林绿地，可植于园路边、山石旁、水畔等地，也适合小区美化环境。还可盆栽欣赏。



花冠阔漏斗形



叶薄革质

**分布：**江苏、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东及广西，为著名栽培种，变种及品种繁多。



|             |                                |                       |
|-------------|--------------------------------|-----------------------|
| 科属：杜鹃花科杜鹃花属 | 学名： <i>Rhododendron simsii</i> | 别名：映山红、山石榴、山踯躅、山鹃、照山红 |
|-------------|--------------------------------|-----------------------|



## 杜鹃花

**形态：**小乔木或灌木，株高2 ~ 5米，分枝多。叶革质，互生，常簇生顶端，卵形、椭圆状卵形或倒卵形。花3 ~ 6朵簇生枝顶，花冠成漏斗状，玫瑰色、鲜红或暗红色，上部裂片具深红色斑点。蒴果卵球形。花期4 ~ 5月，果期6 ~ 8月。

**习性：**喜凉爽湿润的环境，忌酷暑和干燥。要求疏松、肥沃、富含腐殖质的偏酸性土壤，忌用碱性或黏性土壤。

**应用：**① 常用于园林绿化，可植于溪边、池畔、岩石旁；可盆栽观赏，也是良好的花篱材料。② 全株入药，具行气活血、补虚的功效，可治疗内伤、风湿、月经不调等症。



分布：主产于我国的中南及西南部，多生于海拔500 ~ 1200米的山地疏灌丛或松林下。

|     |         |                             |        |
|-----|---------|-----------------------------|--------|
| 科属： | 大戟科铁苋菜属 | 学名： <i>Acalypha reptans</i> | 别名：猫尾红 |
|-----|---------|-----------------------------|--------|



## 红尾铁苋

**形态：**常绿蔓性小灌木，株高20厘米左右。叶互生，卵圆形。柔荑花序，红色。花期春至秋季。

**习性：**喜光照及温暖、湿润的环境，较耐旱。对土质要求不严，以排水良好、疏松的沙质土壤为佳。

**应用：**可用于地被植物，适宜植于公园的小岛、园路及小区的路边欣赏，也可吊盆栽培悬挂于室内或阳台观赏。

分布：原产西印度群岛。我国南方引进栽培。



|            |                                |            |
|------------|--------------------------------|------------|
| 科属：大戟科铁苋菜属 | 学名： <i>Acalypha wilkesiana</i> | 别名：红叶桑、铁苋菜 |
|------------|--------------------------------|------------|

红桑

**形态：**常绿灌木，株高2米左右。叶纸质，互生，阔卵形，铜绿色，常杂有红或紫色，叶缘具不规则钝齿，顶端渐尖，基部圆钝。雌雄同株，通常雌雄花异序，排成团伞花序。花序柔软下垂。花期几乎全年。

**习性：**喜温暖、湿润、阳光充足的环境，忌水湿，耐寒性差。适于疏松肥沃、排水良好的土壤。越冬温度不宜低于10℃。

**应用：**庭院、公园中常见的绿篱和观叶灌木，可配置在灌木丛中点缀色彩；也适于花坛、花带、道路绿化及盆栽。



叶缘具不规则钝齿



分布：原产太平洋岛屿。我国栽培广泛。

|            |                                |        |
|------------|--------------------------------|--------|
| 科属：大戟科变叶木属 | 学名： <i>Codiaeum variegatum</i> | 别名：洒金榕 |
|------------|--------------------------------|--------|

变叶木

**形态：**常绿灌木或小乔木，株高1 ~ 2米。单叶互生，条形至矩圆形，厚革质，边缘全缘或者分裂，波浪状或螺旋状扭曲。叶片上常具有白、紫、黄、红色的斑块和纹路。总状花序生于上部叶腋，花小，白色，不显眼。

**习性：**喜阳光充足及温暖、湿润，不耐阴，忌干旱。喜肥沃、粘重而保水性好的土壤。

**应用：**可作盆栽观赏，陈设于厅堂、会议厅、宾馆、酒楼，也可置于卧室、书房的案头、茶几上；温暖地带也可丛植于庭院。



叶色多样

分布：原产马来西亚及太平洋诸岛屿。现广泛栽植于热带地区，我国南方各省区常见栽培。



|           |                                |             |
|-----------|--------------------------------|-------------|
| 科属：大戟科大戟属 | 学名： <i>Euphorbia marginata</i> | 别名：高山积雪、象牙白 |
|-----------|--------------------------------|-------------|

银边翠



**形态：**一年生草本，株高50 ~ 80厘米。茎直立、多分枝，全株具柔毛。叶卵形至长圆形，全缘，无柄，绿色，下部叶片互生，顶端叶片轮生；入夏后枝梢的叶片边缘或大部变为白色。顶端小花，3朵簇生，花梗细软，花小。蒴果。

**习性：**喜温暖、阳光充足，不耐寒，耐干旱，忌湿、涝。不择土壤，喜肥沃而排水良好的疏松沙质壤土。

**应用：**可用于布置花坛、花境，也可植于园路两侧或庭院一隅；可盆栽或作切花材料。

小花，3朵簇生

分布：原产北美洲。我国栽培广泛。

|           |                            |               |
|-----------|----------------------------|---------------|
| 科属：大戟科大戟属 | 学名： <i>Euphorbia milii</i> | 别名：铁海棠、虎刺、麒麟花 |
|-----------|----------------------------|---------------|

虎刺梅

**形态：**常绿亚灌木，株高可达1米。茎肉质肥大，多棱，有硬刺。叶互生，通常集中在嫩枝上，倒卵形或矩圆状匙形，黄绿色。聚伞花序，生于枝顶，总苞鲜红，阔卵形或肾形，一年四季都能开花。

**习性：**喜温暖湿润和阳光充足环境，耐高温、怕积水，不耐寒，较耐旱、耐阴，夏季忌曝晒。以疏松、排水良好的腐叶土为最好。生长适温为15℃ ~ 28℃。

**应用：**① 多供盆栽，用于室内装饰点缀窗台、案头；也常用来绑扎孔雀等动物造型，成为宾馆、商场等公共场所摆设的精品。② 全株入药，外敷可治瘀痛、骨折及恶疮等症。



总苞鲜红

叶倒卵形或矩圆状匙形



分布：原产非洲热带。现栽培广泛，我国南北均有栽培。



|           |                            |           |
|-----------|----------------------------|-----------|
| 科属：大戟科大戟属 | 学名： <i>Euphorbia obesa</i> | 别名：奥贝沙、晃玉 |
|-----------|----------------------------|-----------|

布纹球

**形态：**多浆植物，植株小球形。单生，不产生仔球，球体灰绿，有红褐色纵横交错的条纹，近顶部条纹较密；具阔棱8，上有褐色小钝齿；雌雄异株，雌株球体较扁，雄株茎圆筒形。花极小，黄绿色。

**习性：**喜温暖干燥和阳光充足的环境，不耐寒、不耐阴、忌潮湿。宜在排水良好的沙壤土中生长。生长适温为18℃ ~ 24℃。

**应用：**盆栽观赏，用于点缀书桌、案头和书桌。



分布：原产南非。我国引种栽培。

|           |                                  |                    |
|-----------|----------------------------------|--------------------|
| 科属：大戟科大戟属 | 学名： <i>Euphorbia pulcherrima</i> | 别名：猩猩木、象牙红、老来娇、圣诞花 |
|-----------|----------------------------------|--------------------|

一品红



**形态：**直立灌木，株高1 ~ 3米。茎光滑，有乳汁。单叶互生，叶片卵状椭圆形至宽披针形，全缘或具波状齿，绿色，背有柔毛。杯状花序顶生，有红、黄、白等色；花小，无花被，着生于总苞内，花期11月至翌年3月。

**习性：**为典型短日照植物，喜温暖、阳光充足。需透气性强、排水好的肥沃疏松微酸性土壤。生长适温为18℃ ~ 25℃。

**应用：**① 多用于盆栽观赏，也可于庭园中地栽，还可作切花。② 茎叶入药，具有消肿功效，可用于治疗跌打损伤。

分布：原产墨西哥及中美洲热带。我国各地均有栽培。



|            |                                      |                     |
|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 科属：大戟科土沉香属 | 学名： <i>Excoecaria cochichinensis</i> | 别名：紫背桂、青紫色、东洋桂花、红紫木 |
|------------|--------------------------------------|---------------------|



## 红背桂

- 形态：**常绿灌木或小乔木，株高1米左右。茎多分枝。单叶对生，叶片呈宽披针形至卵状披针形，先端渐尖，基部楔形，叶缘有锯齿。叶面鲜绿色至翠绿色，有光泽，叶背呈浓郁的深血红色。花为小型散穗状花序，花小，腋生，淡黄色，无花瓣，花期6～7月。蒴果球形，红色。
- 习性：**喜温暖湿润的半阴环境，不耐寒，不耐旱，极不耐碱，畏强光，忌涝。喜肥沃而排水良好的微酸性沙壤土。
- 应用：**盆栽常作室内厅堂、居室点缀，南方常用于庭院、公园和居住小区绿化。

分布：原产中印半岛。现我国栽培普遍，广西有野生，生于丘陵灌丛中。



|            |                                 |            |
|------------|---------------------------------|------------|
| 科属：大戟科麻疯树属 | 学名： <i>Jatropha integerrima</i> | 别名：琴叶樱、日日樱 |
|------------|---------------------------------|------------|

琴叶珊瑚

**形态：**常绿灌木，株高1 ~ 2米，具乳汁。叶互生，长椭圆形、倒卵状披针形。花单生，聚伞花序排成圆锥状，顶生；花小，花萼钟形，花冠红色或粉色。蒴果成熟时为黑褐色。全年均可开花、结实。

**习性：**喜光照，喜温暖、湿润的气候条件，过于荫蔽则开花减少。一般土质均可良好生长。

**应用：**可用于公园、小区等绿化，极适合庭院栽培，也可供大型盆栽欣赏。



分布：原产中美洲。我国台湾、广东、海南、云南、福建等地有栽培。

|            |                               |                  |
|------------|-------------------------------|------------------|
| 科属：大戟科麻风树属 | 学名： <i>Jatropha podagrica</i> | 别名：珊瑚树、珊瑚油桐、玉树珊瑚 |
|------------|-------------------------------|------------------|

佛肚树

**形态：**常绿肉质灌木，高0.4 ~ 1.5米。茎基部膨大呈卵圆状棒形，颇似佛肚，茎表皮灰色易脱落。叶大，近圆形，簇生分枝顶端，具长柄，盾形，3浅裂，绿色，光滑又稍具蜡质白粉。花序重复两歧分叉，花鲜红色，具长柄。一年四季都可开花。蒴果圆形，种子黑褐色。

**习性：**喜高温高湿，喜充足阳光，也较耐阴，耐旱、忌涝。宜用排水良好的沙质土壤，忌土壤粘重。生长适温为20℃ ~ 28℃。

**应用：**为室内盆栽的优良花卉，亦可庭园栽培。



分布：原产中美洲西印度群岛的热带地区。我国各地均有栽培。



|            |                          |        |
|------------|--------------------------|--------|
| 科属：龙胆科紫芳草属 | 学名： <i>Exacum affine</i> | 别名：紫星花 |
|------------|--------------------------|--------|

紫芳草

**形态：**一年生草本，株高15 ~ 20厘米。茎直立，分枝。肉质叶，对生，卵形或心形，叶色绿。花碟形或盘状，紫蓝色，雄蕊鲜黄色，芳香。花期11月至翌年5月。



**习性：**喜温暖、湿润、阳光充足的环境，忌日光直射，怕高温高湿，耐半阴。土壤以疏松、富含有机质的为佳。生长适温为20℃ ~ 30℃。

**应用：**作小型盆栽，供室内摆放观赏，也可用于布置花坛、花台及花槽。

叶对生，卵形或心形

分布：原产非洲索科得拉岛。我国引种栽培。

|             |                                 |             |
|-------------|---------------------------------|-------------|
| 科属：龙胆科草原龙胆属 | 学名： <i>Eustoma russellianum</i> | 别名：龙胆花、大花桔梗 |
|-------------|---------------------------------|-------------|

洋桔梗

**形态：**一二年生草本。茎直立，株高30 ~ 60厘米。叶对生，卵形，灰绿色。花呈钟状，花色丰富，有红、粉红、紫、淡紫、白、黄、镶边等色；有单重瓣之分。花期5 ~ 10月。

**习性：**喜温暖、湿润和阳光充足的环境，较耐寒，不耐水湿。以肥沃疏松、富含腐殖质的微酸性土壤为宜。生长适温为15℃ ~ 28℃。

**应用：**可用于园林绿地，也可布置花境或植于花坛、花台中；还是常用的切花材料。



分布：原产美国南部。现我国各地均有栽培。



|              |                                 |                   |
|--------------|---------------------------------|-------------------|
| 科属：牻牛儿苗科天竺葵属 | 学名： <i>Pelargonium hortorum</i> | 别名：洋绣球、石腊红、洋蝴蝶、洋葵 |
|--------------|---------------------------------|-------------------|

天竺葵



**形态：**多年生草本，株高20 ~ 40厘米。茎直立，肉质。单叶互生，叶掌状有长柄，叶缘多锯齿，叶面有较深的环状斑纹。伞形花序腋生，花色红、白、粉、紫等，有单瓣和重瓣品种，花期初冬至翌年夏初。蒴果。

**习性：**适应性强，喜阳光，好温暖，稍耐旱，怕积水，耐寒性较差。以富含腐殖质、排水良好的砂壤土生长最好。

生长适温为12℃ ~ 25℃。

**应用：**多盆栽室内装饰，也宜作室外地栽，可用于花坛、花境，也可植于林缘下。



分布：原产南非。现我国栽培普遍。

|              |                                      |        |
|--------------|--------------------------------------|--------|
| 科属：牻牛儿苗科天竺葵属 | 学名： <i>Pelargonium odoratissimum</i> | 别名：驱蚊草 |
|--------------|--------------------------------------|--------|

蚊净香草

**形态：**多年生常绿草本。叶互生，圆形、肾形或扇形，边缘有波形的钝锯齿，叶面光滑。气孔大而密布于叶下表面，具有较强的释放香气的功能。不育，不能结实。

**习性：**喜温和，怕严寒和酷暑湿热，忌积水久湿和雨涝。要求含腐殖质、疏松肥沃、通透性强的中性沙质培养土。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**① 庭院和室内均可栽培。② 全株香气浓烈，有强烈的驱蚊作用。



分布：本种为利用香叶天竺葵通过细胞杂交而形成的园艺品种。



|              |                                   |           |
|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 科属：苦苣苔科芒毛苣苔属 | 学名： <i>Aeschynanthus radicans</i> | 别名：大红芒毛苣苔 |
|--------------|-----------------------------------|-----------|

毛萼口红花

**形态：**多年生藤本。植株蔓生，枝条下垂，茎绿色。叶对生，长卵形，全缘，叶面浓绿色，叶背浅绿色。花序多腋生或顶生，花萼筒状，黑紫色被绒毛，花冠筒状，红色至红橙色，从花萼中伸出。花期主要在夏季。

**习性：**喜温暖潮湿和半阴的环境，喜光，但忌阳光直射，耐湿、不耐寒。要求肥沃疏松、富含腐殖质、排水良好的微酸性土壤。生长适温为18℃ ~ 25℃。



花冠红色至红橙色

花萼筒状

**应用：**观叶、观花的优良品种，适于盆栽及悬吊栽培，可装饰阳台、窗台及客厅一隅。



长卵形，全缘

分布：原产印度尼西亚至印度东部的热带地区。我国引进栽培。

|              |                                    |          |
|--------------|------------------------------------|----------|
| 科属：苦苣苔科芒毛苣苔属 | 学名： <i>Aeschynanthus speciosus</i> | 别名：翠锦口红花 |
|--------------|------------------------------------|----------|

美丽口红花

**形态：**多年生附生常绿草本。枝条匍匐下垂，肉质叶对生，卵状披针形，顶端尖，具短柄。伞形花序生于茎顶或叶腋间，小花管状，弯曲，橙黄色，花冠基部绿色，柱头和花药常伸出花冠之外。花期7 ~ 9月。

**习性：**喜温暖、潮湿的半阴环境，不耐寒，忌干燥和闷热。宜用泥炭土、腐叶土和水苔等混合配制的培养土栽种。生长适温为20℃ ~ 30℃。

**应用：**常作中型盆栽或吊盆植物，陈设于客厅、卧室、办公室等处的高几架或柜子上，也可垂吊于空中点缀装饰。



小花管状，弯曲

肉质叶对生

分布：原产东南亚的爪哇等地。我国台湾、广东有栽培。



|               |                                 |                   |
|---------------|---------------------------------|-------------------|
| 科属：苦苣苔科非洲紫罗兰属 | 学名： <i>Saintpaulia ionantha</i> | 别名：非洲堇、非洲紫苣苔、圣保罗花 |
|---------------|---------------------------------|-------------------|

非洲紫罗兰

**形态：**多年生草本，具极短的地上茎。叶片轮状平铺生长呈莲座状，叶卵圆形，全缘，先端稍尖。花梗自叶腋间抽出，花单朵顶生或交错对生，有深紫罗兰色、兰紫色、浅红色、白色、红色等，有单瓣、重瓣之分。夏秋冬季均能连续开花。

**习性：**喜温热湿润环境，忌高温，较耐阴，忌阳光直射。适宜肥沃疏松的中性或微酸性土壤。生长适温为18℃ ~ 24℃。

**应用：**非洲紫罗兰品种繁多，花色、叶色各异，观赏性强，多盆栽欣赏，可装饰客厅、案几、阳台、窗台等，也可用于会议室、办公室等地。



叶卵圆形，全缘

分布：原产非洲东部热带地区。我国栽培广泛，均为园艺种。

|             |                               |        |
|-------------|-------------------------------|--------|
| 科属：苦苣苔科大岩桐属 | 学名： <i>Sinningia speciosa</i> | 别名：落雪泥 |
|-------------|-------------------------------|--------|

大岩桐

**形态：**多年生草本，株高15 ~ 25厘米。地下块茎扁球形，茎极短，全株密被绒毛。叶对生，质厚，长椭圆形，肥厚而大，缘具钝锯齿。花顶生或腋生，花冠钟状，花色有蓝、粉红、白、红、紫等，还有白边蓝花、白边红花双色和重瓣花。花期夏季。蒴果，种子褐色。

**习性：**喜冬季温暖、夏季凉爽，湿润及半阴的环境。要求肥沃疏松、排水良好且富含腐殖质土壤。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**盆栽观赏，常用于布置窗台、案几、花架、会议室、橱窗、茶室等处。



白边红花



肥厚而大，缘具钝锯齿

分布：原产南美巴西。我国南北均有栽培。



|            |                                                    |         |
|------------|----------------------------------------------------|---------|
| 科属：金缕梅科继木属 | 学名： <i>Loropetalum chinense</i> var. <i>rubrum</i> | 别名：红花继木 |
|------------|----------------------------------------------------|---------|

红继木

**形态：**常绿灌木或小乔木，株高4 ~ 9米。叶互生，革质，暗紫色，卵形或椭圆形，先端锐尖，全缘，两面密生星状柔毛。花瓣4枚，紫红色线形，簇生于小枝端。蒴果倒卵圆形。花期4 ~ 5月，果期9 ~ 10月。

**习性：**喜温暖向阳的环境，喜光、耐半阴，耐寒、耐旱。  
在排水良好的酸性土壤生长最佳。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**① 地栽美化公园、庭院、道路的名贵观赏树种，也适合作盆景材料。② 原种继木可入药，叶用于止血，根及叶可治疗跌打损伤。



花紫红色线形



暗紫色，先端锐尖，全缘

分布：原种继木产于我国中部、南部及西南各省，多生于丘陵及山地，也常出现在马尾松林及杉林下。日本及印度也有分布。

|         |                                 |            |
|---------|---------------------------------|------------|
| 科属：金缕梅科 | 学名： <i>Rhodoleia championii</i> | 别名：红苞木、红苞荷 |
|---------|---------------------------------|------------|

红花荷

**形态：**常绿小乔木，茎干直立，株高可达12米。叶厚革质，卵形，先端钝或略尖，基部阔楔形，三出脉，上面深绿色，下面灰白色。头状花序，下垂，红色，形似吊钟，又像荷花。头状果序，蒴果卵圆形。花期3 ~ 4月。

**习性：**喜温暖湿润、不喜强光，喜光阴，较耐热，耐寒性一般。以富含腐殖质、排水良好的砂壤土为佳。

**应用：**花型奇特，观赏性极佳，适合小区，公园，旅游景点栽培观赏，也可供盆栽或庭院作庭荫树种。



叶厚革质，卵形



分布：原产我国广东和香港，主要分布于广东中部、西部山地及沿海岛屿，多生于阔叶林中。



科属：鸢尾科射干属

学名： *Belamcanda chinensis*

别名：野萱花、交剪草

## 射干

**形态：**多年生草本，根状茎为不规则的块状，株高1 ~ 1.5米。叶互生，嵌迭状排列，剑形。花序顶生，叉状分枝，每分枝上着生数朵花，花橙红色，上有紫褐色斑点。花被6片。蒴果倒卵形或长椭圆形。花期6 ~ 8月，果期7 ~ 9月。

**习性：**喜光照，喜温暖及湿润的气候条件，耐旱、耐寒、耐热。对土质要求不严，适应性强。

**应用：**① 花姿清雅，适合公园路边、水畔、山石边栽种，也适合植于小区、庭院绿化环境，还可植于花盆中置于室内观赏。② 根状茎药用，有微毒，具清热解毒、散结消炎、消肿止痛、止咳化痰等功效。



叶剑形

**分布：**原产我国，生于林缘或山坡草地，大部分生长于海拔较低的地方。朝鲜、日本、印度、越南、俄罗斯也有分布。



|            |                                    |                     |
|------------|------------------------------------|---------------------|
| 科属：鸢尾科雄黄兰属 | 学名： <i>Crocosmia crocosmiflora</i> | 别名：雄黄兰、倒挂金钩、黄大蒜、标竿花 |
|------------|------------------------------------|---------------------|



## 火星花

**形态：**多年生草本。具扁球茎，叶多基生，剑形，基部有抱茎叶鞘。花茎常2 ~ 4分枝，由多花组成疏散的穗状花序，花多数。花冠漏斗状，深橙红色。果为三棱状球状蒴果。花期7 ~ 8月，果期8 ~ 10月。

**习性：**喜充足阳光，耐寒、不耐酷暑和霜冻。适宜生长于排水良好、疏松肥沃的砂壤土中。

**应用：**北方盆栽观赏，可用于装饰阳台及窗台；南方多露地栽培，可布置花境、花坛或作切花。

花冠漏斗状，深橙红色



分布：原产非洲南部。现栽培的为园艺种，我国各地均有栽培。

|            |                             |             |
|------------|-----------------------------|-------------|
| 科属：鸢尾科香雪兰属 | 学名： <i>Freesia refracta</i> | 别名：香雪兰、洋晚香玉 |
|------------|-----------------------------|-------------|

## 小苍兰

**形态：**多年生草本，具球茎，卵形或卵圆形。叶剑形或条形，略弯曲，黄绿色。花茎直立，花直立，淡黄色或黄绿色，园艺品种颜色较多，具香味，花被管喇叭形。蒴果近卵圆形。花期4 ~ 5月，果期6 ~ 9月。

**习性：**喜冷凉、湿润及光照充足的环境，不耐寒，不耐热。土质以疏松、肥沃的沙质壤为佳。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**① 具芳香，栽培容易，可盆栽置于室内观赏；南方可露天栽培，还可用于切花栽培。② 花可提取香精。

园艺品种颜色较多

花直立，淡黄色



分布：原产非洲南部。我国栽培普遍。



|            |                                  |          |
|------------|----------------------------------|----------|
| 科属：鸢尾科唐菖蒲属 | 学名： <i>Gladiolus gandavensis</i> | 别名：菖兰、剑兰 |
|------------|----------------------------------|----------|

唐菖蒲

**形态：**多年生落叶球根类草本，株高1 ~ 1.7米。球茎扁圆形，被膜质外皮，茎粗壮而直立，无分枝或稀有分枝。基生叶剑形，排成二列，抱茎互生。穗状花序着生于花茎一侧，花冠筒漏斗状，花瓣边缘有波状或皱折，花色有白、黄、红、粉、橙、紫、蓝或复色。花期夏秋季。蒴果，种子黄褐色。



花瓣边缘有波状或皱折

花冠筒漏斗状

**习性：**喜温暖，稍耐寒、不耐高温，忌闷热、不耐涝，生长适温为15℃ ~ 25℃，但品种不同而略有差异。宜在排水良好的沙壤土中生长。

**应用：**①可盆栽观赏，也可以用来布置花坛。②可用作切花。③球茎入药，具有清热解毒的功效，用于腮腺炎、淋巴腺炎及跌打损伤的治疗。



穗状花序

分布：原产地中海沿岸及南非。现栽培的均为园艺种，在我国有些地区已逸为半野生状态。

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 科属：鸢尾科鸢尾属 | 学名： <i>Iris delavayi</i> |
|-----------|--------------------------|

长茎鸢尾

**形态：**多年生草本。叶灰绿色，剑形或条形，顶端长渐尖。花茎中空，光滑，花深紫色或蓝紫色，具暗紫色及白色斑纹。蒴果柱状长椭圆形，种子红褐色。花期5 ~ 7月，果期8 ~ 10月。



具暗紫色及白色斑纹

**习性：**喜温暖、冷凉的气候条件。在排水良好、富含腐殖质的沙质壤土中生长较佳。

**应用：**可植于路边、水畔及亭廊等地，也可植于庭院美化环境。

花深紫色或蓝紫色

分布：产于四川、云南、西藏等地，生于海拔2700 ~ 3100米的水沟旁湿地或林缘草地。



|           |                                              |        |
|-----------|----------------------------------------------|--------|
| 科属：鸢尾科鸢尾属 | 学名： <i>Iris ensata</i> var. <i>hortensis</i> | 别名：玉蝉花 |
|-----------|----------------------------------------------|--------|



## 花菖蒲

**形态：**多年生草本。叶宽条形，中脉明显。花茎高约1米，苞片近革质，脉平行，花的颜色由白色至暗紫色、斑点及花经纬度变化较大，有单瓣及重瓣。花期6 ~ 7月，果期8 ~ 9月。

**习性：**喜温暖、潮湿的环境，喜光照，耐寒性较强。以疏松、肥沃、排水良好的土质为佳。



**应用：**花大而美丽，有较强的观赏性，园林中多植于水边，也可布置花坛、花台及庭院水景等，还适合布置专类园。

叶宽条形

苞片近革质

分布：本种为园艺变种，品种极多，不同品种花型、花色有差异。

|           |                             |        |
|-----------|-----------------------------|--------|
| 科属：鸢尾科鸢尾属 | 学名： <i>Iris pseudacorus</i> | 别名：黄鸢尾 |
|-----------|-----------------------------|--------|



## 黄菖蒲

**形态：**多年生草本。根状茎粗壮，斜伸，节明显。基生叶灰绿色，宽剑形，顶端渐尖。花茎粗壮，有明显的纵棱，上部分枝，茎生叶比基生叶短而窄。花黄色，外花被裂片卵圆形或倒卵形。花期5月，果期6 ~ 8月。

**习性：**喜光照，喜温暖、潮湿的环境，也耐干燥，较耐寒。以肥沃的沙质土壤为佳。生长适温为15℃ ~ 30℃。

**应用：**① 花色艳丽，适合湿地、水岸边栽培，也可植于庭院的水池边。② 可作切花。



花黄色

分布：原产欧洲，生于河湖沿岸的湿地或沼泽地上。我国各地常见栽培。



科属：唇形科鞘蕊花属

学名： *Coleus blumei*

别名：五色草、洋紫苏、锦紫

## 彩叶草

**形态：**多年生观叶草本，株高40 ~ 90厘米。茎方形，质柔软。叶对生，宽卵形或卵状心形，边缘有粗锯齿，叶背面常有绒毛。叶在绿色衬底上有紫、粉红、红、淡黄、橙等彩色斑纹。圆锥花序，花小，淡蓝或白色，花期8 ~ 9月。

**习性：**喜高温、湿润、阳光充足、通风良好的环境，耐半阴，夏季忌强光直射，耐寒性不强，忌积水。要求疏松肥沃的土壤。

**应用：**多用于园林绿化，也可植于庭院中观赏；优良品种可供盆栽，置于矮几和窗台上观赏。



边缘有粗锯齿



具彩色斑纹



叶对生，宽卵形或卵状心形

分布：原产印度尼西亚爪哇岛。园艺品种较多，我国栽培普遍。



|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 科属：唇形科薰衣草属 | 学名： <i>Lavandula dentata</i> |
|------------|------------------------------|



## 齿叶薰衣草

**形态：**常绿灌木，株高约60厘米。丛生，全株被白色绒毛。叶对生，披针形，叶具锯齿，灰绿色。穗状花序，花小，具芳香，管状，紫蓝色。花期冬季、春季。

**习性：**喜光照，喜温暖、湿润的环境条件，较耐热，也较耐寒。土质以疏松、排水良好的沙质壤土为佳。生长适温为15℃ ~ 25℃。

叶对生，  
披针形

叶具锯齿，  
灰绿色

**应用：**香味浓郁，为有名的香草植物；盆栽可置于客厅、案几、窗台及卧室观赏，也可植于庭院栽培，或用于布置香草专类园。

分布：原产西班牙及法国。我国引种栽培。

|            |                              |        |
|------------|------------------------------|--------|
| 科属：唇形科薰衣草属 | 学名： <i>Lavandula pinnata</i> | 别名：爱情草 |
|------------|------------------------------|--------|

## 羽叶薰衣草

**形态：**常绿灌木，株高30 ~ 40厘米。叶对生，二回羽状复叶，小叶线形或披针形，灰绿色，穗状花序，花茎细高，花唇形，花蓝紫色。花期长，几乎一年四季均可开花，主要花期冬季至春季。

**习性：**为薰衣草类耐热的品种，性喜光照，夏季需适当遮光，耐寒、耐旱，耐贫瘠，抗盐碱。微碱性或中性的土质均可栽培。

**应用：**适合庭院、盆栽、切花、花坛栽培等；在花园、花店、宾馆、餐厅、百货商场等公共场所可作为时尚花卉摆放，也适合布置香草专类园。

花蓝  
紫色



花茎  
细高

分布：原产西班牙加那利岛。我国栽培普遍。



|           |                              |                |
|-----------|------------------------------|----------------|
| 科属：唇形科薄荷属 | 学名： <i>Mentha haplocalyx</i> | 别名：苏薄荷、仁丹草、水薄荷 |
|-----------|------------------------------|----------------|

薄荷

**形态：**多年生草本，株高0.3 ~ 1米。根状茎细长，有节，节上着生须根。地上茎基部四棱。叶对生，椭圆形或披针形，叶缘有锯齿。轮伞状花序，花小细密，花冠淡红或淡紫色，唇形。小坚果长圆形，褐色。花期6 ~ 10月，果期9 ~ 11月。



**习性：**喜温暖湿润和阳光充足环境，耐寒性强，耐水湿，耐高温，忌连作。宜疏松肥沃和排水良好的沙壤土。生长适温为20℃ ~ 30℃。

**应用：**① 城市家庭多盆栽观赏，也可作为香料植物栽培。② 可供食用，还可用来制作清凉饮料。③ 全株入药，可治感冒发热、头痛目赤、风疹瘙痒等症。



分布：原产北温带，多生于水旁潮湿的地方，生长的海拔上限可达2500米。

|            |                             |           |
|------------|-----------------------------|-----------|
| 科属：唇形科贝壳花属 | 学名： <i>Molucella laevis</i> | 别名：领圈花、象耳 |
|------------|-----------------------------|-----------|

贝壳花

**形态：**一二年生草本，株高0.4 ~ 1米。茎四棱，分枝力弱。心状叶对生，具钝齿。开小白花，六朵轮生，芳香。花冠唇状，花萼似贝壳。花期6 ~ 8月。

**习性：**喜温暖干燥和阳光充足的环境，耐干旱，耐半阴。对土质无特殊要求，以肥沃、疏松、排水良好的土壤为佳，忌粘重。生长适温为20℃ ~ 30℃。

**应用：**① 可地栽，多用于花坛、花境，也可盆栽观赏。② 可用作切花及干花材料。



分布：原产亚洲西部及叙利亚。现我国南北均有栽培。



|            |                             |          |
|------------|-----------------------------|----------|
| 科属：唇形科鼠尾草属 | 学名： <i>Salvia farinacea</i> | 别名：粉萼鼠尾草 |
|------------|-----------------------------|----------|

## 蓝花鼠尾草

**形态：**一二年生或多年生草本及常绿小灌木，株高30 ~ 60厘米。茎为菱柱状，多分枝；叶对生，呈长椭圆形，先端圆，全缘（或有钝锯齿）。花轮生于茎顶或叶腋，花呈紫、青色，有时白色，具有强烈芳香，略有涩味。花期8月。种子近椭圆形。

**习性：**喜阳光充足或半阴环境，较耐寒，耐旱性较强。喜肥沃、排水良好的沙质壤土。生长适温为15℃ ~ 22℃。

**应用：**多用于花坛、花境或林缘下作背景材料，也可植于小路边、草地边缘，也适合庭院栽培或盆栽观赏。



叶对生，呈长椭圆形

分布：原产地中海沿岸及南欧。我国栽培广泛。

|            |                             |                     |
|------------|-----------------------------|---------------------|
| 科属：唇形科鼠尾草属 | 学名： <i>Salvia splendens</i> | 别名：爆仗红、西洋红、墙下红、草象牙红 |
|------------|-----------------------------|---------------------|

## 一串红

**形态：**多年生草本，常作一年生栽培，株高0.8 ~ 1米。茎直立，光滑，有四棱。叶对生，卵形。总状花序顶生，遍被红色柔毛。小花2 ~ 6朵，轮生，红色，花萼钟状，与花瓣同色，花冠唇形。花期5 ~ 9月。

叶对生，卵形



花冠唇形

**习性：**喜温暖和阳光充足的环境，忌高温，不耐寒，耐半阴，怕积水和碱性土壤。适宜于肥沃疏松土壤。生长适温为18℃ ~ 25℃。

**应用：**适应性强，花期长，是我国重要的庭园花卉，适合布置大型花坛、花境及林缘下栽培；矮生种也适用于窗台、阳台美化和屋旁、阶前点缀。

分布：原产南美巴西。我国南北均广泛栽培。



科属：樟科樟属

学名： *Cinnamomum kotoense*

别名：平安树、红头屿肉桂、红头山肉桂、芳兰山肉桂、大叶肉桂、台湾肉桂

## 兰屿肉桂

**形态：**常绿小乔木，株高可达10 ~ 15米。

叶片对生或近对生，卵形或卵状长椭圆形，先端尖，厚革质。叶片硕大，表面亮绿色，未见花。果卵球形。果期8 ~ 9月。

**习性：**喜温暖湿润、阳光充足的环境，不耐干旱、忌水涝、严寒和空气干燥。

栽培宜用疏松肥沃、排水良好、富含有机质的酸性沙壤土。生长适温为20℃ ~ 30℃。

**应用：**室内盆栽养护，可置于客厅、宾馆大厅、客房及办公室或会议室装饰。

先端尖，  
厚革质



分布：原产我国台湾兰屿。现栽培广泛。



|           |                                                            |               |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 科属：豆科海红豆属 | 学名： <i>Adenanthera pavonina</i><br>var. <i>microsperma</i> | 别名：红豆、孔雀豆、相思格 |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------|



二回羽状复叶

## 海红豆

**形态：**落叶乔木，株高5 ~ 20米。二回羽状复叶，小叶4 ~ 7对，互生，长圆形或卵形。总状花序，单生于叶腋，或在枝顶排成圆锥花序。花小，白色或黄色，有淡香。花期4 ~ 7月，果期7 ~ 10月。

**习性：**喜光照，喜温暖及湿润的环境条件，有一定的抗旱性。以排水良好的壤土为佳。生长适温为22℃ ~ 30℃。

**应用：**①可用作庭院的庭荫树种，也可用于行道树。②木材质地坚硬，耐腐性好，可作船舶、建筑用材。③种子可用来作饰物，南方寺院多用来制作念珠。



分布：原产印度、马来西亚、爪哇。我国云南、贵州、广东、福建及台湾等地均有分布，多生于山沟、溪边、林中。

|          |                                 |                    |
|----------|---------------------------------|--------------------|
| 科属：豆科合欢属 | 学名： <i>Albizzia julibrissin</i> | 别名：夜合树、绒花树、扁担树、马缨花 |
|----------|---------------------------------|--------------------|

## 合欢

**形态：**落叶乔木，株高达10米。树冠扁圆形，常呈伞状，树皮褐灰色。叶互生，二回偶数羽状复叶，小叶镰刀状长圆形。花序头状，腋生或顶生；萼及花瓣黄绿色，花浅粉红色缨状，花期6 ~ 7月。荚果，果熟期9 ~ 10月。



花浅粉红色缨状

**习性：**阳性树种，喜温暖湿润的环境，耐干旱及瘠薄，稍耐寒，不耐水湿。在排水良好的肥沃土壤上生长良好。

**应用：**①多作绿荫树、行道树，或栽植于庭园、池畔等地。②木材可用于制家具。③嫩叶可食，老叶可用来洗衣服。④树皮入药，具有驱虫的功效。

分布：原产我国东北至华北。非洲、中亚至东亚均有分布，北美引种栽培。



科属：豆科落花生属

学名：*Arachis duranensis*

别名：长啄花生

蔓花生

**形态：**多年生宿根草本，株高10 ~ 15厘米。茎蔓生，匍匐生长。叶互生，倒卵形，全缘。花为腋生，蝶形，金黄色，花期春季至秋季。荚果长桃形。

**习性：**全日照及半日照下均能生长良好，有较强的耐阴性，有一定的耐旱及耐热性。对土壤要求不严，但以沙质壤土为佳。生长适温为18℃ ~ 32℃。

**应用：**可作地被植物，用于园林绿地、公路的隔离带；也适合庭院绿化观赏。



分布：原产亚洲热带及南美洲。我国南方栽培普遍。

科属：豆科羊蹄甲属

学名：*Bauhinia corymbosa*

别名：深裂叶羊蹄甲

皇冠藤

**形态：**常绿木质藤本。叶纸质，近圆形，叶深裂或几至基部。伞房花序式的总状花序顶生于侧枝上，多花，花白色，花瓣有粉红色脉纹，阔匙形或近圆形，具芳香。荚果带状长圆形，扁平。花期4月，果期11月。

**习性：**喜温暖、光照充足。一般土壤均能良好生长。

**应用：**叶片具有较强的观赏性，开花繁密，适合栅栏边、墙垣、棚架等绿化，也适合于庭院的廊架栽培观赏。



分布：原产我国广东及海南，生于山谷疏林中或山坡向阳处。现世界热带及亚热带地区均有引种栽培。



|           |                                      |            |
|-----------|--------------------------------------|------------|
| 科属：豆科朱樱花属 | 学名： <i>Calliandra haematocephala</i> | 别名：美蕊花、红绒球 |
|-----------|--------------------------------------|------------|



# 朱樱花

**形态：**落叶灌木或小乔木，株高1 ~ 3米。二回羽状复叶，小叶7 ~ 9对，斜披针形。头状花序腋生，有小花25 ~ 40朵，花萼钟状，花冠管淡紫红色。雄蕊突露于花冠之外，上部离生的花丝为深红色。花期8 ~ 9月，果期10 ~ 11月。

**习性：**喜光照充足

及温暖的环境，较耐热、耐旱，不耐寒。以疏松、排水良好的土壤为宜。

**应用：**叶及花均有较高的观赏价值，易修剪整形，是庭院、公园、街道绿化的良好材料，单植、列植或群植均可取得较好的观赏效果。

头状花序腋生



离生的花丝为深红色

分布：原产巴西及毛里求斯。我国栽培广泛。

|          |                         |                 |
|----------|-------------------------|-----------------|
| 科属：豆科决明属 | 学名： <i>Cassia alata</i> | 别名：翅荚黄槐、翅叶槐、刺荚槐 |
|----------|-------------------------|-----------------|

# 刺荚黄槐

**形态：**常绿灌木，高1.5 ~ 2米。叶互生，偶数羽状复叶，小叶6 ~ 12对，长圆形或倒卵状长圆形。总状花序腋生或顶生，花冠黄色。花期11月至翌年4月，果期12月至翌年2月。

偶数羽状复叶



**习性：**喜阳光充足、温暖及湿润的环境，光线不足则会生长不良，开花减少；不耐寒，较耐旱。以疏松、排水良好的壤土为佳。

**应用：**适宜与其他树木配植，多丛植于园路、亭旁、池畔及溪边，还可植于庭院、办公场所、校园等地。

花冠黄色



分布：原产美洲热带地区。我国引种栽培。



科属：豆科栗豆树属

学名：*Castanospermum australe*

别名：绿元宝、招财进宝、栗豆树

开心果



**形态：**常绿阔叶乔木。一回奇数羽状复叶，小叶呈长椭圆形，近对生，全缘，革质有光泽。种球自基部萌发，如鸡蛋般大小，革质肥厚，饱满圆润，富有光泽，宿存盆土表面，圆锥花序生于枝杆上，小花橙黄色，花期春夏。

**习性：**喜温暖湿润，怕干旱，要求通风良好、凉爽半阴的环境。生长适温为22℃ ~ 30℃。

**应用：**可单独盆栽，亦可数株群植，用来装饰客厅、办公室等；在原产地可用作行道树。



分布：原产澳洲。我国引种栽培。

科属：豆科紫荆属

学名：*Cercis chinensis*

别名：满条红、裸枝树

紫荆

**形态：**落叶灌木或小乔木，株高2 ~ 5米。叶纸质，互生，近圆形或三角状圆形。花紫红色或粉红色，多朵簇生于老枝或主干上；通常花先于叶开放。花期3 ~ 4月，果期8 ~ 10月。

**习性：**喜光照、温暖，耐寒，耐旱。一般土壤均可良好生长，对碱性土壤有较强的抗性。

**应用：**① 观赏性强，极适合庭院栽培观赏，可植于公园、小区、学校等地，也可用较大花盆盆栽植于客厅、阳台欣赏。② 树皮入药，具有清热解毒、活血行气、消肿止痛的功效。



分布：原产我国东南部。分布范围较广，多人工栽培，少数生于密林或石灰岩地区。



科属：豆科蝶豆属

学名： *Clitoria ternatea*

别名：蓝花豆、蓝蝴蝶、蝴蝶花豆



花呈蝶形，花形大而鲜艳

## 蝶豆

**形态：**多年生常绿蔓性草本。茎为缠绕茎左旋，细软、有毛。叶互生，奇数羽状复叶，小叶呈广椭圆形或卵形。花单朵腋生，呈蝶形，花形大而鲜艳。荚果扁平，有长喙。花期7~10月，果期8~11月。

**习性：**喜日光充足、温暖、湿润的环境，耐半阴、畏霜冻。在排水良好、疏松、肥沃土壤中生长良好。生长适温为22℃~32℃。

**应用：**①可供盆栽、吊盆或用于花坛、庭园围篱蔓爬。②全株可作绿肥。

**注意：**根、种子有毒。



茎细软、有毛

分布：原产印度。现世界各地栽培广泛。



科属：豆科凤凰木属 学名： *Delonix regia* 别名：孔雀树、金凤、红花楹、火树、凤凰花

## 凤凰木

**形态：**落叶乔木，株高可达20米。二回羽状复叶，互生，小叶密生，长椭圆形，羽片对生，15 ~ 20对。伞房状总状花序顶生或腋生，花大，红色有光泽，具黄色及白斑点。荚果带形，扁平，熟时黑褐色。花期5 ~ 7月，果期8 ~ 10月。

**习性：**喜光照，喜高温多湿气候，不耐寒。以排水良好、肥沃、富含有机质的沙质壤土为佳。生长适温为20℃ ~ 30℃。

**应用：**① 为优良的庭荫树种，可作绿荫树、行道树，适合孤植、列植；花色艳丽，极适合庭园栽培观赏。② 木材较轻，富有弹性和特殊木纹，可用于制作家具。

**注意：**种子有毒，忌食。

花大，红色有光泽，  
具黄色及白斑点



分布：原产马达加斯加。现世界各地均有栽培，我国南方城市栽培较盛。

科属：豆科刺桐属 学名： *Erythrina corallodendron* 别名：龙牙花、珊瑚树、象牙红

花冠蝶  
形，红色

## 珊瑚刺桐

**形态：**落叶小乔木。茎干有疏而粗的刺。叶互生，三出复叶，小叶有柄无刺，卵状菱形。总状花序，腋生，花冠蝶形，红色。荚果，种子深红色。花期3 ~ 10月。

**习性：**喜温暖、湿润及阳光充足的环境，在向阳的地块长势较佳，开花多。以肥沃、疏松的沙质壤土为佳。

**应用：**① 多用于行道树和景观树，也可庭院栽培或盆栽观赏。

② 树皮入药，具有麻醉、镇静作用。

小叶卵状菱形



分布：原产热带美洲。我国南方各地有栽培。



|          |                                   |        |
|----------|-----------------------------------|--------|
| 科属：豆科刺桐属 | 学名： <i>Erythrina crista-galli</i> | 别名：象牙红 |
|----------|-----------------------------------|--------|

# 鸡冠刺桐



花冠橙红色

**形态：**落叶小乔木。叶长卵形，奇数羽状复叶，小叶1 ~ 2对，卵形，羽状侧脉。总状花序，腋生，花瓣阔卵形，花冠橙红色。荚果。花期4 ~ 7月。

**习性：**喜光，喜高温湿润气候，适应性强，耐干旱，颇耐寒，抗风，抗大气污染，不耐阴。不择土壤，以疏松、排水良好的土壤为佳。

**应用：**适作行道树、园景树。也可在庭园、校园、公园、游乐区、庙宇等地单植、列植、群植美化。

花瓣阔卵形



叶长卵形

**分布：**原产巴西。我国福建、台湾、云南、广东、广西均有栽培。



科属：豆科刺桐属

学名： *Erythrina variegates*

别名：广东象牙红、海桐

## 刺桐



株高可达20米

**形态：**高大落叶乔木，株高可达20米。叶为三出羽状复叶，互生，小叶平滑，近菱形。总状花序生于嫩梢头，先叶开放，蝶形花，深红色。荚果，种子暗红色。花期3月，果期8月。

**习性：**喜高温高湿，喜强光，不耐寒冷，忌干旱，稍耐阴。适生于

肥沃、疏松、湿润的酸性土壤，忌土壤粘重。生长适温为15℃ ~ 30℃。

**应用：**①可种植于庭院、公园，也可用作行道树。②树皮或根皮入药，称“海桐皮”，具有祛风湿、舒筋通络的功效。



蝶形花，深红色

分布：原产印度至大洋洲海岸林中。东南亚也有分布，我国引种栽培，为常见栽培种。

科属：豆科山黧豆属

学名： *Lathyrus odoratus*

别名：花豌豆、麝香豌豆

## 香豌豆

**形态：**一二年生蔓性攀缘草本。全株被白色毛，茎棱状有翼。羽状复叶，仅茎部两片小叶，先端小叶变态形成卷须，叶卵圆至广椭圆形。花具总梗，腋生，花大蝶形，有紫、红、蓝、粉、白等色，并具斑点、斑纹，具芳香。荚果长圆形，种子球形、褐色。



花大蝶形

**习性：**喜温暖、凉爽气候，喜阳光充足，耐半阴，忌酷热和干热风吹袭，稍耐寒。在排水良好、土层深厚、肥沃、呈中性或微碱性土中生长较佳。

**应用：**盆栽供室内陈设欣赏，也可于室外攀缘作垂直绿化材料，或为地被植物。

**注意：**植株及种子有毒。

花具总梗

分布：原产意大利。

我国栽培广泛。



|           |                          |            |
|-----------|--------------------------|------------|
| 科属：豆科含羞草属 | 学名： <i>Mimosa pudica</i> | 别名：知羞草、呼喝草 |
|-----------|--------------------------|------------|

含羞草

**形态：**多年生草本，株高30 ~ 50厘米。全株具刚毛和皮刺。叶互生，具二回羽状复叶，小叶矩圆形。总柄很长，基部膨大成叶枕，具钩刺及倒生刺毛，叶片一被触动即闭合而下垂。头状花序，花较小、粉红色，花期3 ~ 10月。荚果椭圆形，果期5 ~ 11月。

**习性：**喜温暖湿润，喜光，但又能耐半阴。不耐寒。对土壤要求不严，但以肥沃疏松为佳。生长适温为20℃ ~ 28℃。

小叶矩圆形



**应用：**① 多作室内盆花赏玩，也可用于园林绿地或专类园中用于科普教育。② 全株入药，具有安神镇静的功效，鲜叶捣烂外敷可治带状疱疹。



叶片一被触动即闭合而下垂

分布：原产南美热带地区，多生于旷野、荒地、路边及灌丛中。现广布世界热带地区，我国的台湾、福建、广东、广西、云南等地已逸为野生，北方需盆栽。

|          |                                |                       |
|----------|--------------------------------|-----------------------|
| 科属：豆科黧豆属 | 学名： <i>Mucuna birdwoodiana</i> | 别名：白花油麻藤、大兰布麻、鸡血藤、血枫藤 |
|----------|--------------------------------|-----------------------|

禾雀花

**形态：**常绿大型木质藤本。羽状复叶具3小叶，小叶近革质，顶生小叶椭圆形、卵形或呈倒卵形，基部圆形或稍楔形，侧生小叶偏斜。总状花序自老茎上长出，下垂，花冠白色。花期春末至夏初。荚果木质，种子秋季成熟。

**习性：**喜光，在光照充足的地方开花繁茂，过于荫蔽则影响开花。喜肥沃、湿润、排水良好的沙质土壤。

**应用：**花型奇特，有极高的观赏价值，可用于庭院的棚架绿化，适合公园、小区绿化，也可植于专类园中。

**注意：**种子含淀粉，有毒，不宜食用。



花冠  
白色  
  
总状  
花序

分布：原产亚洲热带和亚热带地区，多生于海拔800 ~ 2500米的山地向阳处、路旁、溪边，常攀缘在乔、灌木上生长。



|           |                         |                  |
|-----------|-------------------------|------------------|
| 科属：豆科无忧花属 | 学名： <i>Saraca dives</i> | 别名：火焰花、无忧树、中国无忧花 |
|-----------|-------------------------|------------------|

中国无忧树

**形态：**常绿乔木，高约10米。偶数羽状复叶，小叶5 ~ 6对，革质，长椭圆形或长倒卵形，嫩叶略带紫红色，下垂。花序腋生，较大，伞房状圆锥花序，花橙黄色至深红色。花期4 ~ 5月，果期7 ~ 10月。



花橙黄色至深红色

**习性：**喜光照，喜温暖、湿润气候，不耐寒。要求排水良好、湿润肥沃的土壤。

**应用：**适宜作行道树、园景树，也适合庭院栽植作庭荫树种。



偶数羽状复叶

分布：原产我国云南、广西，生于200 ~ 1000米的密林或疏林中，常见于河流或溪谷两旁。越南及老挝也有分布。

|          |                              |             |
|----------|------------------------------|-------------|
| 科属：豆科紫藤属 | 学名： <i>Wistevia sinensis</i> | 别名：藤萝、朱藤、黄环 |
|----------|------------------------------|-------------|

紫藤

**形态：**落叶藤本，株高可达10米多。奇数羽状复叶互生，小叶卵形，长圆形至卵状披针形，幼时密生短柔毛，全缘。总状花序，花瓣蝶状，紫蓝色，成串下垂，具有香味，先花后叶；花期6月。荚果扁长形，果熟期9 ~ 10月。



奇数羽状复叶互生

花瓣蝶状，紫蓝色



**习性：**喜阳光，稍耐阴，抗寒力强，耐干旱。对土壤适应性很强，以深厚、肥沃、疏松的土壤为佳。

**应用：**① 可作为棚架材料，用于绿化门廊、花廊、花亭，缠绕假山，或剪成灌木状，丛植于草坪；亦可盆栽和制作桩景。② 花可食，还可提炼芳香油，并有解毒、止吐泻等功效；种子有小毒，可治疗筋骨疼；皮具有杀虫、止痛、祛风通络等功效。

分布：原产我国山东、河南、河北、山西等地。现我国南北栽培广泛。



|           |                         |         |
|-----------|-------------------------|---------|
| 科属：百合科芦荟属 | 学名： <i>Aloe nobilis</i> | 别名：高尚芦荟 |
|-----------|-------------------------|---------|

# 不夜城芦荟

肉质叶披针形



**形态：**多年生肉质草本，植株单生或丛生，高30 ~ 50厘米。肉质叶披针形，轮状互生，叶缘有淡黄色锯齿状肉刺。松散总状花序从叶丛上部抽出，小花筒形，橙红色，冬末至早春开放。

**习性：**喜温暖干燥和阳光充足的环境，耐干旱和半阴，不耐寒。以肥沃和排水良好的沙壤土为佳。

**应用：**适宜作中、小型盆栽，点缀窗台、几架、桌案等处，南方也可露地栽培观赏。



小花筒形，橙红色

|                 |
|-----------------|
| 分布：原产非洲。我国栽培普遍。 |
|-----------------|

|           |                      |                     |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 科属：百合科芦荟属 | 学名： <i>Aloe vera</i> | 别名：巴巴多斯芦荟、美国芦荟、翠叶芦荟 |
|-----------|----------------------|---------------------|

# 库拉索芦荟



总状花序疏散

**形态：**多年生常绿草本，形似龙舌兰。茎较短，叶簇生于茎顶，直立或近于直立，肥厚多汁，呈狭披针形，粉绿色，边缘有刺状小齿。花茎单生或稍分枝，总状花序疏散，黄色或有赤色斑点，夏、秋开花。

**习性：**喜温暖、光照充足的气候条件，怕寒冷，忌水湿。对土壤要求不高，一般沙性土壤就可很好生长。生长适温为15℃ ~ 30℃。

**应用：**① 可盆栽置于室内欣赏。② 常用于医疗保健及美容，叶片入药，具有清热、通便、杀虫的功效。

叶肥厚多汁，呈狭披针形



|                                        |
|----------------------------------------|
| 分布：原产西印度群岛和巴巴多斯岛。我国栽培广泛，以广东、福建、海南栽培为多。 |
|----------------------------------------|



科属：百合科天门冬属

学名： *Asparagus setaceus*

别名：云片竹、山草

## 文竹

**形态：**多年生草本，株高可达数米。茎光滑柔细，呈攀缘状，分枝极多。叶纤细，水平开展，叶小，真叶退化为鳞片或刺。花小，两性，白色。浆果球形，紫黑色。花期6～7月。

**习性：**喜温暖、湿润及半阴环境，不耐干旱及霜冻。要求富含腐殖质、排水良好的沙质壤土。生长适温为15℃～25℃。

**应用：**多盆栽观叶为主，可供壁饰、吊盆、室内装饰。



花小，两性，白色



茎光滑柔细

分布：原产南非。我国栽培广泛。



|             |                               |                      |
|-------------|-------------------------------|----------------------|
| 科属：百合科蜘蛛抱蛋属 | 学名： <i>Aspidistra elatior</i> | 别名：一叶兰、苞米兰、飞天蜈蚣、土里蜈蚣 |
|-------------|-------------------------------|----------------------|

白纹蜘蛛抱蛋

## 蜘蛛抱蛋

**形态：**多年生常绿草本，具根状茎。叶单生，矩圆形披针形、披针形至近椭圆形，先端渐尖，基部楔形。花单生，花钟状，紧附地面，褐紫色，花期4～5月。

**习性：**喜温暖，喜阴，不耐强光，耐贫瘠，忌严寒。对土壤要求不高，以排水良好肥沃的沙质壤土为好。生长适温为15℃～25℃。

**应用：**① 常盆栽作室内绿化，也适合园林绿地、公园、小区绿化栽培，但需植于林下或遮阴的地方。② 切叶可用于插花。③ 根茎入药，有活血通络、泄热利尿的功效。



分布：原产我国南方各省。全国各地均有栽培，常见栽培的有白纹蜘蛛抱蛋。

|           |                                 |                 |
|-----------|---------------------------------|-----------------|
| 科属：百合科吊兰属 | 学名： <i>Chlorophytum comosum</i> | 别名：桂兰、挂兰、垂盆草、钩兰 |
|-----------|---------------------------------|-----------------|

## 吊兰

**形态：**多年生常绿草本。根状茎短，具簇生的圆柱形肉质须根。叶片基生，条形至长披针形，全缘或略具波状。叶丛中抽生出走茎，花后形成匍匐茎。总状花序，花小，白色，簇生于顶端。花期春夏季。

**习性：**喜温暖、湿润、半阴环境，忌强光直射，较耐旱、不耐寒。要求肥沃、疏松、排水良好的土壤。生长适温为15℃～28℃。

**应用：**① 常见的室内盆栽观叶植物，可以作为架上观赏植物或吊挂观赏植物。② 药用，民间取全草煎服，可治声音嘶哑。



叶片条形至长披针形



分布：原产南非。现世界各地广泛栽培。



|           |                                |               |
|-----------|--------------------------------|---------------|
| 科属：百合科朱蕉属 | 学名： <i>Cordyline fruticosa</i> | 别名：红叶铁树、红竹、铁树 |
|-----------|--------------------------------|---------------|



花小，淡红至紫色

## 朱蕉

**形态：**常绿灌木或小乔木，株高可达3米。茎直立，多不分枝。叶聚生茎顶部，阔披针形至长椭圆形，绿色或带紫红色，基部抱茎。圆锥花序生顶端叶腋，花小，淡红至紫色，少有黄色者，花期11月至翌年3月。浆果球形，红色。

**习性：**喜温暖、湿润和阳光充足的环境，不耐寒，怕涝，忌烈日暴晒。以肥沃、疏松和排水良好的沙质壤土为宜，不耐盐碱和酸性土。生长适温为20℃～25℃。

**应用：**盆栽，置于客厅、案台上，用于布置会场、宾馆；可种植于路边及庭园角隅、花坛，也可作花带、花丛。



分布：原产我国热带地区。印度及太平洋热带岛屿也有分布，现栽培广泛。

|            |                             |         |
|------------|-----------------------------|---------|
| 科属：百合科龙血树属 | 学名： <i>Dracaena arborea</i> | 别名：也门铁树 |
|------------|-----------------------------|---------|



叶为宽条形

## 也门铁

**形态：**常绿小乔木，茎杆直立，株高约2米。叶为宽条形，深绿色，无柄，叶绿色有光泽。伞型花序，花小，黄绿色，无观赏性。花期6～8月。

**习性：**喜高温多湿环境，极耐阴，不耐寒，忌强光。以疏松、肥沃、排水良好的沙质壤土为佳。生长适温为20℃～28℃。

**应用：**室内外优良观叶植物，能够有效吸附室内的甲醛、苯等有害气体，现广泛用于宾馆和室内环境的美化。

花小，黄绿色



分布：原产热带雨林地区。我国南方大量盆栽生产。



|            |                                |          |
|------------|--------------------------------|----------|
| 科属：百合科龙血树属 | 学名： <i>Dracaena cambodiana</i> | 别名：海南龙血树 |
|------------|--------------------------------|----------|

## 山海带

**形态：**小乔木，茎杆直立，株高3 ~ 4米。叶色浓绿，叶呈长披针形，常聚生于茎、枝顶端，剑形，叶为薄革质。圆锥花序，长30厘米以上，花绿白色或淡黄色。浆果球形，约1厘米。花期6 ~ 8月。

叶色浓绿



**习性：**生性强健，对光线适应性强，忌强光直射。土壤以肥沃壤土或腐殖土为佳，排水需良好。生长适温为18℃ ~ 30℃。

**应用：**可用于阴生园区绿化装饰，也适宜室内盆栽观赏，还可用作布置大型会场的背景材料。



叶呈长披针形

分布：原产我国海南，生于林中或干燥的沙壤土上。越南、柬埔寨也有分布。

|            |                              |               |
|------------|------------------------------|---------------|
| 科属：百合科龙血树属 | 学名： <i>Dracaena fragrans</i> | 别名：巴西千年木、巴西铁树 |
|------------|------------------------------|---------------|

## 巴西铁

**形态：**常绿小乔木，株高可达4米。叶宽线形，绿色，聚生于茎干上部。常见栽培有金心品种，叶片中央有一金黄色宽条纹，两边绿色。

**习性：**喜高温高湿、通风良好环境，较喜光照，也耐阴，怕烈日，忌干燥干旱，不耐寒，怕积水。喜疏松、排水良好的沙质土。生长适温为20℃ ~ 25℃。

**应用：**可供室内盆栽，多用于客厅、厅堂一角装饰观赏。

花白色



叶宽线形，绿色



分布：原产非洲南部。我国南北均有栽培。



|            |                               |         |
|------------|-------------------------------|---------|
| 科属：百合科龙血树属 | 学名： <i>Dracaena marginata</i> | 别名：红边竹蕉 |
|------------|-------------------------------|---------|

# 千年木

**形态：**常绿灌木。茎直立。叶片细长，新叶向上伸长，老叶下垂，叶中间绿色，叶缘有紫红色或鲜红色条纹。常见栽培的有彩虹千年木。

**习性：**喜高温多湿，耐旱，耐阴，也耐强光。对土壤要求不严，以肥沃的沙质壤土为佳。生长适温为20℃ ~ 30℃。

**应用：**株形飘逸，色泽艳丽，是优良的观叶植物，适合盆栽置于客厅、酒店大堂、会议室等摆放，也可植于庭院观赏。



叶片细长

分布：原产马达加斯加。我国引进栽培。

|            |                             |          |
|------------|-----------------------------|----------|
| 科属：百合科龙血树属 | 学名： <i>Dracaena reflexa</i> | 别名：曲叶龙血树 |
|------------|-----------------------------|----------|

# 百合竹

**形态：**常绿灌木，株高可达9米，长高后茎干弯斜生长。叶剑状披针形，无柄，革质，全缘，有光泽。节间短，叶片密集。花序单生或分枝，小花白色。常见的栽培品种有金边百合竹、黄金百合竹等。



小花白色

**习性：**喜光照，耐阴、耐旱，也耐湿，不耐寒。以富含有机质的沙质壤土为佳。生长适温为20℃ ~ 28℃。

**应用：**耐阴性好，是室内观叶的佳品，可盆栽置于阳台、窗台及客厅观赏，也适宜用于插花。



叶剑状披针形

分布：原产马达加斯加。我国南方栽培较多。



|            |                                |                          |
|------------|--------------------------------|--------------------------|
| 科属：百合科龙血树属 | 学名： <i>Dracaena sanderiana</i> | 别名：仙龙达龙血树、绿叶仙龙血树、万年竹、万寿竹 |
|------------|--------------------------------|--------------------------|



银边富贵竹

## 富贵竹

**形态：**常绿亚灌木状，株高1米以上。植株细长，直立，上部有分枝。叶互生或近对生，纸质，长披针形。伞形花序，花生于叶腋，花冠钟状，紫色。浆果近球形，黑色。常见栽培的有银边富贵竹、黄金富贵竹等。

**习性：**喜高温多湿和阳光充足的环境，不耐寒，耐半阴，忌强光直射。以疏松的沙壤土为佳。生长适温为20℃～30℃。


**应用：**适合家庭绿化装饰，布置于窗台、阳台和案几上，也可用作切花配材。



植株细长，直立

分布：原产西班牙加那利群岛及非洲和亚洲的热带地区。我国栽培普遍。

|            |                              |       |
|------------|------------------------------|-------|
| 科属：百合科沙鱼掌属 | 学名： <i>Gasteria maculata</i> | 别名：孖宝 |
|------------|------------------------------|-------|



小花向一侧下垂，色粉红有绿尖

## 墨锋

**形态：**幼年期无茎，老株有明显的茎，坚硬的肉质叶排成两列，但叶片数很少。叶舌状，先端尖，基部厚、先端薄，叶缘角质化，表面深绿色，上有星散的白斑。总状花序，小花向一侧下垂，色粉红有绿尖。

**习性：**喜光照充足，炎夏需遮阴，耐旱。对土壤要求不严，以排水良好的沙土为宜。生长适温为18℃～28℃。

**应用：**著名小型盆栽植物，可用于装饰几案、办公桌、书桌等，也可植于专类园中。



坚硬的肉质叶排成两列

分布：原产南非。我国引进栽培。



科属：百合科萱草属

学名： *Hemerocallis fulva*

别名：黄花、忘忧草

## 萱草

**形态：**多年生宿根草本。全株光滑无毛，根茎短，有肉质的纤维根。叶自根基丛生，狭长成线形，叶脉平行，主脉明显，基部交互裹抱。花葶由叶丛抽出，上部分枝，圆锥花序，数朵花生于顶端，花大黄色；花期6 ~ 7月。蒴果，种子黑色。

**习性：**喜温暖潮湿的环境，耐寒、耐半阴、耐旱。对土壤要求不严，以富含腐殖质及排水良好的土壤为佳。生长适温为18℃ ~ 28℃。

**应用：**① 常用于园路边、水旁和草地丛植，也适合庭院及盆栽观赏。② 嫩苗入药，具有利湿热、消食的功效；根入药，具有利水、凉血的功效。



花大黄色



叶狭长成线形

分布：原产我国南部、欧洲南部及日本。我国秦岭以南各省有野生。



|            |                                  |             |
|------------|----------------------------------|-------------|
| 科属：百合科风信子属 | 学名： <i>Hyacinthus orientalis</i> | 别名：五色水仙、洋水仙 |
|------------|----------------------------------|-------------|

# 风信子

**形态：**多年生草本。鳞茎球形或扁球形。叶基生，叶片肥厚，带状披针形。花茎从叶茎中央抽出，略高于叶，总状花序，漏斗形，小花基部筒状，上部四裂、反卷。花有红、白、黄、蓝、紫等色，有重瓣品种，具芳香；花期3 ~ 4月。蒴果球形。



上部四裂、反卷

**习性：**喜凉爽、湿润、阳光充足的环境，较耐寒，不耐热。宜在排水良好的沙质壤土上栽培。生长适温为10℃ ~ 18℃。

**应用：**可布置花坛和盆栽，是切花的良好材料之一。



花色丰富



鳞茎球形或扁球形

叶片肥厚，带状披针形

分布：原产南欧及小亚细亚一带。我国南北均有栽培，均为园艺种。

|            |                             |               |
|------------|-----------------------------|---------------|
| 科属：百合科火把莲属 | 学名： <i>Kniphofia uvaria</i> | 别名：火炬花、火杖、红火棒 |
|------------|-----------------------------|---------------|

# 火把莲

**形态：**多年生草本，株高0.8 ~ 1.2米。茎直立。叶线形，基部丛生。总状花序着生数百朵筒状小花，呈火炬形，花冠橘红色，花期6 ~ 7月。

**习性：**喜温暖及充足阳光，也耐半阴，忌水涝，较耐寒。适宜于排水良好、土层深厚的轻粘土壤栽培。

**应用：**① 可作为盆花摆放或布置花境、花坛。② 可作切花。



叶线形



总状花序

分布：原产非洲南部，园艺品种较多。我国南方引种栽培。



科属：百合科百合属

学名：Lilium spp.

别名：百合蒜、中逢花

# 百合花

**形态：**茎通常圆柱形，无毛。叶呈螺旋状散生排列，少轮生，叶形有披针形、矩圆状披针形和倒披针形、椭圆形或条形，叶无柄或具短柄，叶全缘或有小乳头状突起。花大、单生、簇生或呈总状花序。花色有白、黄、粉、红等多种颜色。

**习性：**喜凉爽气候，耐寒，喜半阴环境，忌水淹。适于富含腐殖质的偏酸性土壤中生长。

**应用：**① 花色艳丽，是我国重要的切花，有的品种适合盆栽观赏，也是我国重要的年宵花卉之一。② 鳞茎含淀粉，可供食用，有的种类可入药，有的花具芳香，可提取香料。



茎通常圆柱形

叶呈螺旋状散生排列



花色多样

**分布：**原产我国、日本、北美和欧洲等温带地区。我国产39种，南北均有分布，以西南和华中最多。



|            |                               |                            |
|------------|-------------------------------|----------------------------|
| 科属：百合科蓝壶花属 | 学名： <i>Muscari botryoides</i> | 别名：葡萄百合、蓝壶花、葡萄麝香兰、蓝瓶花、葡萄水仙 |
|------------|-------------------------------|----------------------------|



### 葡萄风信子

**形态：**多年生草本，株高15 ~ 40厘米。鳞茎卵圆形，皮膜白色。叶基生，线形，稍肉质，暗绿色，边缘常内卷。花茎自叶丛中抽出，总状花序，小花多数密生而下垂，花蓝色或顶端白色，另有白色、肉色、淡蓝色和重瓣品种；花期3 ~ 5月。蒴果。

**习性：**喜温暖、凉爽气候，喜光也耐半阴，耐寒性强。要求疏松肥沃、排水良好、富含腐殖质的土壤。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**宜作林下、林缘、地被花卉，或作花坛、花境的边缘材料；也可盆栽观赏及用于切花。

分布：原产欧洲中部和南部。我国南北均有栽培。

|            |                             |        |
|------------|-----------------------------|--------|
| 科属：百合科酒瓶兰属 | 学名： <i>Nolina recurvata</i> | 别名：象腿树 |
|------------|-----------------------------|--------|

### 酒瓶兰

**形态：**常绿小乔木，高达2 ~ 3米。茎干直立，下部肥大，状似酒瓶。叶细长线形，全缘或细齿缘，软垂状。花为圆锥花序，花色乳白，花小，观赏价值不高。

**习性：**喜日照充足，喜高温，耐干燥，有一定的耐寒力。较喜沙质壤土，栽培土质以疏松、肥沃为佳。生长适温为15℃ ~ 28℃，越冬温度不能低于0℃。

**应用：**成株适合庭植，幼株适合盆栽室内观赏，可用其布置客厅、书室，装饰宾馆、会场等。



分布：原产墨西哥的干热地区。



科属：百合科虎尾兰属

学名： *Sansevieria trifasciata*

别名：千岁兰

## 虎尾兰



叶直立、剑形，具灰绿色的云状斑纹

**形态：**多年生常绿肉质草本，具匍匐的根状茎。叶直立、剑形，革质，绿色，具灰绿色的云状斑纹。总状花序，花葶高30 ~ 80厘米，花淡绿色或白色，3 ~ 8朵簇生；花期11 ~ 12月。浆果。常见的栽培变种有金边虎尾兰、短叶虎尾兰、金边短叶虎尾兰、美叶虎尾兰等。

**习性：**喜温暖和阳光充足，也耐半阴、耐旱，不耐寒。要求排水良好的砂壤土。生长适温为20℃ ~ 30℃。

**应用：**① 南方可露地栽培，可用于公园、庭院、小区绿化，也适合盆栽观赏。② 叶纤维强韧，可供编织用；切叶可用于插花的配材。



金边虎尾兰

分布：原产斯里兰卡及印度东部热带干旱地区。我国栽培广泛，在部分地区逸为半野生。

科属：百合科郁金香属

学名： *Tulipa gesneriana*

别名：洋荷花、草麝香

## 郁金香



花杯状

**形态：**多年生球根植物。鳞茎扁圆锥形。茎、叶光滑，叶带状披针形，全缘并呈波状，顶端常有少数毛。花单生茎顶，杯状，有红、黄、白、橙、紫、粉及复色变化，还有条纹和重瓣品种。花期3 ~ 5月。蒴果。

**习性：**喜冬季温和，夏季凉爽、稍干燥的环境，喜光，也耐半阴。适宜于排水良好、富含腐殖质的沙质壤土，忌低湿粘重土壤。生长适温为17℃ ~ 22℃。

**应用：**① 可盆栽或地栽，是布置花坛、花镜的优良花卉。② 根及鳞茎入药，具有清热、除烦的功效。

叶带状披针形



分布：原产地中海沿岸、中亚细亚、土耳其等地。园艺品种繁多，我国南北均有栽培。



|           |                              |                |
|-----------|------------------------------|----------------|
| 科属：马钱科灰莉属 | 学名： <i>Fagraea ceilanica</i> | 别名：华灰莉、鲤鱼胆、小黄果 |
|-----------|------------------------------|----------------|

灰莉

**形态：**攀缘灌木或小乔木，株高可达12米。叶对生，稍肉质，长圆形、椭圆形至倒卵形，顶端渐尖。花序直生，花萼钟状，花冠白色，漏斗状，有香气。花期5月，果期10 ~ 12月。

**习性：**喜温暖，好阳光，忌强光直晒，喜空气湿度高。要求疏松、肥沃排水良好的壤土。生长适温为18℃ ~ 30℃。

**应用：**多用于园林绿地栽培，或用于美化庭院环境；也适宜大型盆栽布置厅堂、门廊等绿化。

花冠白色，  
漏斗状



分布：原产我国广西、云南、海南等地。东南亚及大洋洲也有分布。

|            |                                 |                        |
|------------|---------------------------------|------------------------|
| 科属：千屈菜科紫薇属 | 学名： <i>Lagerstroemia indica</i> | 别名：痒痒树、百日红、官样花、无皮树、紫金花 |
|------------|---------------------------------|------------------------|

花圆锥状  
生于枝顶

紫薇

**形态：**落叶小乔木，高可达7米。叶对生或近于对生，椭圆形、阔矩圆形或倒卵形，顶端短尖或钝形，基部阔楔形或近圆形。花圆锥状生于枝顶，花被皱缩，鲜红、粉红或白色。花期7 ~ 9月，果熟期9 ~ 12月。

**习性：**喜温暖及阳光充足的环境，稍耐阴，耐热、耐水湿也耐旱，耐寒性较强。喜土层深厚、排水良好、肥沃的中性轻壤土。

**应用：**① 花色繁多，株形及叶色美观，是园林绿化常用的树种，可栽植于园路、山石边、庭院或小区中，也可盆栽装饰客厅及阳台摆放观赏。② 木材可作家具。③ 树皮、叶及花为强泻剂，根和树皮煎剂可治咯血、吐血、便血。

叶对生或  
近于对生

花蕾



分布：原产我国，生于肥沃湿润的土壤中。



|            |                                  |             |
|------------|----------------------------------|-------------|
| 科属：千屈菜科紫薇属 | 学名： <i>Lagerstromia speciosa</i> | 别名：大叶紫薇、百日红 |
|------------|----------------------------------|-------------|

## 大花紫薇

**形态：**常绿乔木，树高一般15 ~ 20米。叶革质，对生，短圆状椭圆形或卵状椭圆形，稀披针形，叶大。圆锥花序顶生，花大，紫红色或紫色。蒴果球形至倒卵状矩圆形，种子多数。花期5 ~ 8月，果期10 ~ 11月。

**习性：**喜高温高湿，喜阳光而稍耐阴，耐干旱瘠薄，怕涝、不耐寒。喜肥沃、湿润而排水良好的微酸性土壤。

**应用：**①可作园景树、庭荫树和行道树。②木材材质坚硬，是制作家具的上好木材。③树皮及叶可作泻药；种子具有麻醉性；根含单宁，可作收敛剂。



花大，紫红色或紫色



分布：斯里兰卡、印度、马来西亚、越南及菲律宾等地有野生分布，我国广东、广西、海南、福建等地栽培较多。

|             |                                |          |
|-------------|--------------------------------|----------|
| 科属：千屈菜科萼距花属 | 学名： <i>Cuphea hyssopifolia</i> | 别名：细叶萼距花 |
|-------------|--------------------------------|----------|

## 细叶雪茄花

**形态：**多年生常绿小灌木，株高30 ~ 60厘米。叶对生，线状披针形，甚细小；花腋生，紫红或桃红色，全年开花不断。花后结实似雪茄，形小呈绿色，不明显，以观花为主。

**习性：**喜阳光充足及温暖、湿润气候，耐热、耐湿，稍耐阴。对土壤要求不严，以疏松、肥沃、排水良好的壤土为佳。生长适温为18℃ ~ 30℃。

**应用：**路边、花境的镶边或作地被植物，也适合庭园的小路或山石边绿化装饰，还可盆栽观赏。

紫红色花



叶对生，线状披针形

分布：原产中美洲。我国南方栽培广泛。



|           |                          |              |
|-----------|--------------------------|--------------|
| 科属：木兰科含笑属 | 学名： <i>Michelia alba</i> | 别名：白缅花、白兰、缅桂 |
|-----------|--------------------------|--------------|

花被片淡黄色，  
10 ~ 12片



# 白兰花

**形态：**常绿乔木，株高可达15 ~ 20米。叶薄革质，狭椭圆形或椭圆形，先端急尖或稍钝。花腋生于近枝端，花被片淡黄色，10 ~ 12片，狭倒披针形。果为聚合果。花期5 ~ 6月，果期8 ~ 9月。

**习性：**喜光照充足、温暖、湿润及通风良好的环境，不耐寒，不耐阴，忌水湿。以排水良好、肥沃疏松的微酸性土壤为佳。

**应用：**① 著名的香花树种，花朵洁白清香，园林中应用极为广泛，也是庭院栽培的重要树种之一，也可用大盆栽置于室内欣赏。  
② 花可提取香精或用于薰茶；根皮入药，可治便秘。



株高可达  
15 ~ 20米

分布：原产我国云南、西藏等地。印度、尼泊尔、不丹也有分布，现广植于东南亚各国。



科属：木兰科含笑属

学名： *Michelia crassipes*

## 紫花含笑

**形态：**常绿小乔木或灌木，株高2 ~ 5米。芽、嫩枝、叶柄、花梗均密被红褐色毛。叶革质，狭长圆形、倒卵形或狭卵形。花极芳香，花被片6，紫红色或深紫红色。果为聚合果。花期4 ~ 5月，果期8 ~ 9月。

**习性：**喜光照及温暖的环境，较耐寒。以疏松、肥沃、排水良好的微酸性土壤为佳。生长适温为22℃ ~ 30℃。

**应用：**花香浓郁，花色紫红，极具观赏性，适合庭院及公园、小区种植欣赏，也适于室内外盆栽。



紫红色或深紫红色



花被片6

分布：原产我国广东北部、湖南南部、广西东北部，生于海拔300 ~ 1000米的山谷密林中。

科属：木兰科含笑属

学名： *Michelia figo*

别名：含笑梅、香蕉花、烧酒花

## 含笑

**形态：**常绿灌木，高3 ~ 5米。树皮灰褐色，分枝很密，小枝有褐色绒毛。单叶互生，叶椭圆形至倒卵形，革质，叶面光滑。花单生于叶腋，直立状，乳黄色或乳白色，边缘常带紫晕色，花期4 ~ 6月，果熟期9月。

叶椭圆形  
至倒卵形



**习性：**喜温暖、湿润的气候及酸性土壤，不耐干旱和寒冷。一般微酸性土壤均可良好生长。生长适温为22℃ ~ 30℃。

乳黄色或乳白色

**应用：**①可植于树下、疏林旁，或盆栽室内观赏，也是优良的庭院香花树种。  
②花瓣可用于薰茶，也可提取芳香油。

边缘常带  
紫晕色

分布：原产我国南方地区，生于阴坡杂木林中。现全国各地均有栽培。



|           |                                 |            |
|-----------|---------------------------------|------------|
| 科属：木兰科木兰属 | 学名： <i>Magnolia grandiflora</i> | 别名：广玉兰、洋玉兰 |
|-----------|---------------------------------|------------|

荷花玉兰

**形态：**常绿乔木，株高达30米。叶厚革质，椭圆形、长圆状椭圆形或倒卵状椭圆形。叶面深绿色，具光泽。花大，白色，具芳香，花被片9 ~ 12，厚肉质，倒卵形。花期5 ~ 7月，果熟期9 ~ 10月。



**习性：**喜温暖湿润气候，喜阳光，但幼树较耐阴，不耐强阳光或西晒，要求深厚肥沃、排水良好的酸性土壤。生长适温为18℃ ~ 25℃。

**应用：**① 花大洁白，香气浓郁，并具有较强的抗烟尘的能力，对有害气体有较强的抗性，适宜植于公园、小区、学校、工矿区等地；也可栽种于庭院观赏。② 叶、幼枝和花可提取芳香油；叶入药治疗高血压。

分布：原产北美东南部。现我国长江流域以南各地有栽培。

|           |                               |             |
|-----------|-------------------------------|-------------|
| 科属：木兰科木兰属 | 学名： <i>Magnolia liliflora</i> | 别名：木兰、木笔、辛夷 |
|-----------|-------------------------------|-------------|

紫玉兰

**形态：**落叶大灌木或小乔木，株高达3 ~ 5米。小枝紫褐色，具白色皮孔。叶椭圆形，先端渐尖，基部楔形，全缘，叶背沿叶脉有毛。花单生于枝顶，钟状，大型，外面紫色或紫红色，内面白色；花期3 ~ 4月。聚合果矩圆形，淡褐色。

花单生于枝顶



**习性：**适应性较强，喜温暖气候，喜阳，较耐寒，怕水涝。喜疏松、肥沃、富含腐殖质的沙质土壤。

**应用：**① 宜配植于建筑物前庭、园路两侧，也可孤植、丛植，作为行道树。② 树皮、叶、花蕾均可入药，花具有祛风、通窍的功效。

分布：原产我国中部，生于海拔300 ~ 1600米的山坡林缘。



|           |                              |                    |
|-----------|------------------------------|--------------------|
| 科属：锦葵科苘麻属 | 学名： <i>Abutilon striatum</i> | 别名：纹瓣悬铃花、风铃扶桑、网花苘麻 |
|-----------|------------------------------|--------------------|

## 金铃花

**形态：**常绿灌木，株高2 ~ 3米。单叶互生，卵形，缘具粗齿，具长柄，掌状五裂，绿色。单花腋生，下垂生长，有长而细的花柄，钟形，橙红色，具红色纹脉。花期春、夏两季。

**习性：**喜光，稍耐阴，喜温暖湿润气候，不耐寒，耐瘠薄。要求肥沃、排水良好的微酸性土壤。

**应用：**花型奇特，极富观赏性，适合于公园、小区、校园及绿地栽培，也适合庭院栽培或作大、中型盆栽，用于布置客厅、阳台等处。



分布：原产南美洲。我国引种栽培。

|           |                          |                           |
|-----------|--------------------------|---------------------------|
| 科属：锦葵科蜀葵属 | 学名： <i>Althaea rosea</i> | 别名：大蜀葵、戎葵、棋盘花、一丈红、端午锦、熟季花 |
|-----------|--------------------------|---------------------------|

## 蜀葵

**形态：**多年生宿根草本，株高2 ~ 3米。茎直立挺拔，丛生，不分枝。叶片近圆心形或长圆形，基生叶片较大，两面均被星状毛。花单生或近簇生于叶腋，总状花序，花色有粉红、红、紫、墨紫、白、黄、水红、乳黄、复色等，单瓣或重瓣；花期5 ~ 9月。果实为蒴果，种子扁圆形。

**习性：**喜阳光充足，不耐阴，地下部耐寒。但以疏松肥沃的土壤为好。生长适温为15℃ ~ 30℃。



**应用：**① 多栽植于墙边、路旁、坡脚、水边、花坛和庭园角隅处用作点缀。② 全草入药，具有清热止血、消肿解毒的功效。



分布：原产我国及亚洲各地。现全国各地均有栽培。



|           |                                |        |
|-----------|--------------------------------|--------|
| 科属：锦葵科木槿属 | 学名： <i>Hibiscus moscheutos</i> | 别名：草芙蓉 |
|-----------|--------------------------------|--------|

芙蓉葵

叶先端尾状渐尖，边缘具锯齿



花大型

**形态：**多年生草本，株高1 ~ 2米。叶卵形至卵状披针形，基部楔形至近圆形，先端尾状渐尖，边缘具锯齿。花单生于枝端叶腋间，花大型，白色、淡红和红色等，内面基部深红色。花期7 ~ 9月。

**习性：**喜光照，较耐阴，喜温暖、湿润气候，忌干旱、耐水湿、较耐寒。以肥沃、富含有机质的沙质壤土生长为佳。生长适温为15℃ ~ 30℃。

**应用：**适合庭院栽培观赏，也多用于园林绿化，适合公园、小区、路边栽植，也可盆栽置于室内的窗台、阳台观赏。



内面基部深红色

分布：原产美国东部。现我国引种栽培。

|           |                               |             |
|-----------|-------------------------------|-------------|
| 科属：锦葵科木槿属 | 学名： <i>Hibiscus mutabilis</i> | 别名：芙蓉花、酒醉芙蓉 |
|-----------|-------------------------------|-------------|

木芙蓉

**形态：**落叶小乔木或灌木，株高2 ~ 5米。茎具星状毛及短柔毛。叶互生，广卵形，掌状3裂至5裂，基部心形，缘有浅钝齿，两面具星状毛。花大，单生枝端叶腋。花冠白色或淡红色，后变深红色，单瓣或重瓣；花期9 ~ 10月。蒴果圆球形，果熟期10 ~ 11月。

花冠白色或淡红色



**习性：**喜温暖湿润气候，喜光，也略耐阴，耐寒性略差，忌干旱，耐水湿。以肥沃、排水良好的沙质壤土最佳。

**应用：**①可植于庭院、坡地、路边、林缘及建筑前，或用作花篱，也可盆栽观赏。②花叶可入药，具有清肺、凉血、散热的功效。

叶缘有浅钝齿，两面具星状毛

分布：原产我国长江流域以南。日本及东南亚各国也有栽培，现园艺品种繁多。



科属：锦葵科木槿属

学名：*Hibiscus rosa-sinensis*

别名：朱槿、佛桑、木牡丹、大红花

花大，单生于  
上部叶腋间



## 扶桑

**形态：**落叶或常绿灌木，一般盆栽高约1米。茎直立而多分枝。叶互生，阔卵形，边缘有粗齿，基部全缘，形似桑叶。花大，单生于上部叶腋间，有单瓣、重瓣之分，花色为黄、橙、粉、白等。花期全年，夏秋最盛。

**习性：**喜阳光充足、温暖湿润及通风的环境，不耐寒霜，不耐阴。对土壤要求不严，但在肥沃、疏松的微酸性土壤中生长最好。生长适温为15℃ ~ 28℃。

**应用：**暖地可植于露地花坛或作花篱，是南方重要的园林树种之一；也是盆栽的优良花卉，可置于阳台、室内摆放。

叶阔卵形，  
边缘有粗齿



分布：原产我国南部。现世界各地栽培广泛。



|           |                              |                |
|-----------|------------------------------|----------------|
| 科属：锦葵科木槿属 | 学名： <i>Hibiscus syriacus</i> | 别名：朝开暮落花、朱槿、赤槿 |
|-----------|------------------------------|----------------|



## 木槿

**形态：**落叶灌木或小乔木，株高2 ~ 5米。小枝灰褐色，幼时密披绒毛。叶卵形或菱状卵形，先端通常三裂，有明显的三主脉，叶缘有圆钝或尖锐锯齿。花单生于叶腋，钟状，单瓣或重瓣，有白、红、紫等色，花期6 ~ 9月。蒴果卵圆形，果熟期10 ~ 11月。

**习性：**喜温暖湿润气候，宜阳光充足，也稍耐阴，耐干旱，耐湿，耐瘠薄土壤，抗寒性较强。



**应用：**① 适用于公共场所花篱、绿篱及庭院布置，也可盆栽观赏。② 茎皮富含纤维，可用作造纸原料。③ 根、花、皮、叶均可入药：花能祛热凉血，根可清热解毒，皮有清热利湿、杀虫止痒的功效，叶具清热止痢、解毒疗疮之功效。

分布：原产我国和印度。现全国各地均有栽培。



|           |                           |               |
|-----------|---------------------------|---------------|
| 科属：锦葵科锦葵属 | 学名： <i>Malva sinensis</i> | 别名：钱葵、欧锦葵、棋盘花 |
|-----------|---------------------------|---------------|

锦葵

**形态：**多年生宿根草本，株高0.6 ~ 1米。茎直立多分枝，被粗毛。叶互生，掌状裂。花簇生于叶腋，花冠紫红色，亦有白色。果实扁球形，种子黄褐色。花期6 ~ 10月，果期8 ~ 11月。



**习性：**喜阳光，抗寒、耐旱。不择土壤，以沙质土壤最为适宜。

**应用：**① 用于花坛、花境，或作为背景材料，也是常见的庭院花卉。  
② 白色花可入药。



分布：原产亚洲、欧洲及北美洲。印度也有分布，现全国各地栽培广泛，有些地区偶有野生。

|            |                              |          |
|------------|------------------------------|----------|
| 科属：竹芋科肖竹芋属 | 学名： <i>Calathea makoyana</i> | 别名：孔雀肖竹芋 |
|------------|------------------------------|----------|

孔雀竹芋

**形态：**多年生常绿草本，株高30 ~ 60厘米。叶卵状椭圆形，叶薄，革质，叶柄紫红色，叶上有深浅不同的绿色斑纹，具金属光泽，叶背部多呈褐红色。穗状花序，小花紫红色、粉白色，多于夏季开花，观赏价值不高。

**习性：**喜温暖湿润，耐半阴，忌阳光直射，不耐寒、不耐旱。要求疏松、肥沃、排水良好的微酸性土壤。

**应用：**盆栽观赏，用于装饰布置书房、卧室、客厅等。



分布：原产巴西。我国南方栽培较多。



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 科属：竹芋科肖竹芋属                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 学名： <i>Calathea rotundifolia</i> cv. <i>Fasciata</i> | 别名：圆叶竹芋、青苹果竹芋 |
| <div>苹果竹芋</div> <div><div><p><b>形态：</b>多年常绿草本，株高40～60厘米，具根状茎。根出叶，丛生状，叶鞘抱茎。叶片大，薄革质，卵圆形，叶缘呈波状，先端钝圆。新叶翠绿色，老叶青绿色，有隐约的金属光泽，沿侧脉有排列整齐的银灰色宽条纹。花序穗状。</p><p><b>习性：</b>喜高温、多湿的半阴环境，畏寒冷，忌强光；要求空气相对湿度较高，忌盆土和环境干燥。栽培宜用疏松肥沃、排水良好、富含有机质的酸性腐叶土或泥炭土。</p><p><b>应用：</b>盆栽观赏，用于布置商场、宾馆、会议室、会客厅等大型公共场所，也可用于居家客厅、书房、卧室摆设。</p></div><div><p>叶缘呈波状</p></div></div> |                                                      |               |
| 分布：原产热带美洲巴西等国。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 科属：竹芋科肖竹芋属                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 学名： <i>Calathea rufibara</i> cv. <i>Wavestar</i> | 别名：浪星竹芋、剑叶竹芋 |
| <div>波浪竹芋</div> <div><div><p>叶缘波状，具光泽</p></div><div><p><b>形态：</b>多年生常绿草本，株高20～50厘米。叶丛生，叶基稍歪斜，叶缘波状，具光泽。叶背、叶柄为紫色。花黄色。</p><p><b>习性：</b>喜温暖、湿润及通风良好的半阴环境，不耐寒，喜充足的散射光，忌强光。土质以肥沃、排水良好的腐叶土或泥炭为佳。</p><p><b>应用：</b>盆栽室内观赏，也可用于园林绿化。</p></div><div></div></div> |                                                  |              |
| 分布：原产巴西。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |              |



|             |                                 |             |
|-------------|---------------------------------|-------------|
| 科属：竹芋科卧花竹芋属 | 学名： <i>Stromanthe sanguinea</i> | 别名：红裹蕉、红背竹芋 |
|-------------|---------------------------------|-------------|

## 紫背竹芋

**形态：**多年生常绿草本，株高0.3 ~ 1米，有时可达1.5米。叶基生，叶柄短，叶长椭圆形至宽披针形，叶正面绿色，背面紫红色。圆锥花序，苞片及萼片红色，花白色。花期春末夏初。

**习性：**喜温暖、湿润及阴暗的环境，忌强光直射。土质以富含腐殖质、排水良好的沙质壤土为宜。

**应用：**盆栽观赏，适合居室、办公室、会议室等装饰欣赏，也适合庭院、公园、小区栽培观赏。



苞片及萼片红色



分布：原产巴西。我国南方栽培普遍。

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 科属：竹芋科水竹芋属 | 学名： <i>Thalia dealbata</i> | 别名：再力花、水莲蕉 |
|------------|----------------------------|------------|

## 水竹芋

**形态：**多年生常绿草本，株高1 ~ 2米。根出叶，茎直立，不分枝。叶灰绿色，长卵形或披针形，全缘；叶柄极长，近叶基部暗红色。穗状圆锥花序，小花多数，花紫红色。花期夏季。

**习性：**喜温暖、湿润及高温的环境，较耐寒。

**应用：**株形美观，叶色靓丽，适于水池湿地种植美化，为常见的水生花卉；也可用于布置庭院的水景或盆栽观赏。



小花多数

花紫红色



分布：原产墨西哥及美国东南部地区。我国南方应用广泛。



|             |                                |                        |
|-------------|--------------------------------|------------------------|
| 科属：野牡丹科酸脚杆属 | 学名： <i>Medinilla magnifica</i> | 别名：珍珠宝莲、宝石莲灯、粉苞酸脚杆、美丁花 |
|-------------|--------------------------------|------------------------|



## 宝莲花



**形态：**常绿小灌木，株高30 ~ 60厘米。茎四棱，分枝扁平。单叶对生，叶片卵形至椭圆形，全缘无柄。穗状花序下垂，花外苞片为粉红色，花冠钟形。浆果球形。花期4 ~ 5月。

**习性：**喜温暖、湿润的环境，不耐寒和干旱，稍耐阴，忌暴晒。要求在疏松肥沃、排水良好的微酸性土壤中生长。

**应用：**居室盆栽观赏，宾馆、厅堂装饰及商场橱窗中摆设。



分布：原产热带非洲和东南亚热带雨林。现我国引进栽培。



科属：楝科米仔兰属

学名： *Aglaia odorata*

别名：米仔兰、碎米兰



# 米兰

**形态：**常绿灌木或小乔木，株高4 ~ 7米。茎直立，分枝多而稠密。奇数羽状复叶，互生，倒卵形，全缘，具光泽。小型圆锥花序腋生，花小，黄色，浓郁清香，全年有花。果实卵形或近球形，一般较少结果。

**习性：**喜温暖、湿润、阳光充足的环境。耐半阴，不耐寒。宜肥沃、排水良好的沙质土壤。

**应用：**著名的香花树种，适合公园、小区、校园及办公场所栽培绿化，也适宜盆栽及庭院栽培观赏。



果实卵形或近球形



分布：原产东南亚及我国南部各省区，常生于低海拔山地的疏林或灌木林中。



|            |                                |        |
|------------|--------------------------------|--------|
| 科属：防己科千金藤属 | 学名： <i>Stephania dielsiana</i> | 别名：血散薯 |
|------------|--------------------------------|--------|

## 金线吊乌龟

**形态：**多年生落叶草藤本。茎细长，块根肥厚，扁圆形。叶纸质，三角状近圆形，基部微圆至近截平。花单性，雌雄异株，雄花序为聚伞花序，花黄绿色。果球形，成熟后紫红色。花期6 ~ 7月，果期8 ~ 9月。

**习性：**喜冷凉气候和阴湿环境，耐寒。茎细长，要求肥沃、疏松的土壤。

**应用：**① 适宜作垂直绿化材料，用于公园、庭院、阳台绿篱，也可盆栽作室内装饰。② 块根含有多种生物碱，入药，具有消肿解毒、健胃止痛的功效。



叶三角状近圆形



块根肥厚，扁圆形

分布：原产我国广东、广西、贵州南部和湖南南部，生于林中、林缘或溪边多石砾的地方。

|         |                           |                  |
|---------|---------------------------|------------------|
| 科属：桑科榕属 | 学名： <i>Ficus elastica</i> | 别名：印度橡皮树、印度榕、橡胶榕 |
|---------|---------------------------|------------------|

## 橡皮树

**形态：**常绿灌木或乔木，株高可达30米以上。全株光滑，皮层内有乳汁，茎上生气根。叶互生，革质，长圆形至椭圆形，叶面暗绿色，叶背淡黄绿色，托叶红色。花单生，雌雄同株。常见栽培的有黑叶橡皮树、花叶橡皮树等。

**习性：**喜温暖湿润和阳光充足环境，不耐寒，耐修剪，耐阴。土壤以肥沃的腐叶土或沙质培养土最佳。

**应用：**庭园树或盆栽观叶植物，盆栽可点缀宾馆大堂和家庭居室，南方常配置于建筑物前、花坛中心和道路两侧等处。



叶长圆形至椭圆形

分布：原产印度、马来西亚、尼泊尔、缅甸、印度尼西亚等地，我国云南有野生。



|         |                         |          |
|---------|-------------------------|----------|
| 科属：桑科榕属 | 学名： <i>Ficus lyrata</i> | 别名：琴叶橡皮树 |
|---------|-------------------------|----------|

## 琴叶榕

**形态：**多年生常绿乔木，株高12米左右。茎干直立，分枝少。叶互生，纸质，叶片宽阔，呈提琴状，深绿色，表面具光泽，叶全缘，波浪状起伏，叶脉凹陷，先端膨大。苞片茶褐色。



**习性：**喜高温湿润，喜阳也耐阴。对土壤要求不严，喜微酸性，不耐瘠薄和碱性土壤。生长适温为22℃ ~ 32℃。

**应用：**适于布置大厅或客厅，是较好的观叶植物，也适合栽植于庭院、小区、公园等地，群植、单植、列植效果均佳。



叶片宽阔，呈提琴状

茎干直立，分枝少

分布：原产美洲热带地区。我国各地均有栽培。

|         |                             |               |
|---------|-----------------------------|---------------|
| 科属：桑科榕属 | 学名： <i>Ficus microcarpa</i> | 别名：正榕、小叶榕、细叶榕 |
|---------|-----------------------------|---------------|

## 榕树

**形态：**常绿阔叶大乔木，株高可达30米以上。老干黑褐色，枝条节部常发生气生根，垂到地面状似支柱。叶互生，椭圆形，厚革质，先端渐尖，全缘。隐头花序，对生于叶腋间，无花梗。果实球形，黄褐色。花期5月，果实球形，果熟期9 ~ 10月。



黄褐色

**习性：**喜阳光充足、温暖湿润气候，不耐旱，怕烈日暴晒，不耐寒。在微酸和微碱性土中均能生长。

**应用：**庭园、公园、游乐区中均可单植、列植、群植，热带和亚热带地区可用作行道树，也可作成小型盆景。



叶椭圆形，厚革质

分布：原产我国、印度、马来西亚等热带地区，分布广泛。



|         |                         |                |
|---------|-------------------------|----------------|
| 科属：桑科榕属 | 学名： <i>Ficus pumila</i> | 别名：凉粉子、木馒头、凉粉果 |
|---------|-------------------------|----------------|


薜荔

**形态：**常绿攀缘或匍匐灌木，枝条较软。叶两型，不结果枝上叶卵状心形，薄革质。结果枝上的叶革质，卵状椭圆形。果

单生于叶腋，瘦花果梨形，雌花果球形，果熟黄绿色或微红。花果期5 ~ 8月。

**习性：**喜温暖，有一定的耐寒性，对光照的要求有较大的弹性，全光照或阴暗均能生长，但以明亮的散射光为宜。喜土壤湿润，忌干燥。

**应用：**① 宜作地被植物，也极宜于室内吊盆栽植。② 藤叶可入药。



不结果枝上  
叶卵状心形

分布：原产我国、日本和越南等地，多生于背阴潮湿之地。

|         |                            |                |
|---------|----------------------------|----------------|
| 科属：桑科榕属 | 学名： <i>Ficus religiosa</i> | 别名：毕波罗树、觉树、思维树 |
|---------|----------------------------|----------------|

菩提树

**形态：**常绿大乔木，株高15米。树皮黄白色，树干凹凸不平。叶互生，三角状卵形；深绿色，有光泽。花生于叶腋，为隐头花序；花期全年。隐花果，扁平圆形，冬季成熟，紫黑色。

**习性：**要求阳光充足的高温高湿环境。以湿润透气的沙质壤土为佳。

**应用：**适于寺院、街道、公园作行道树，也可用于作庭荫树种。



隐花果，  
扁平圆形



叶三角  
状卵形



树皮黄  
白色

分布：原产印度，现喜马拉雅山区有野生。我国广东、日本、马来西亚、泰国、越南、尼泊尔等多为栽培。



科属：桑科桑属

学名： *Morus alba*

别名：家桑、桑树

桑

**形态：**落叶灌木或小乔木，株高达16米。单叶互生，卵形或宽卵形，先端尖或渐短尖，基部圆或心形，锯齿粗钝，幼树之叶常有浅裂、深裂，上面无毛，下面沿叶脉疏生毛，脉腋簇生毛。穗状花序，花绿色，单性，雌雄异株。聚花果紫黑色、淡红或白色。花期4月，果熟期5~7月。

**习性：**喜光，对气候、土壤适应性都很强，耐寒，耐旱，不耐水湿，抗风，耐烟尘。喜深厚、疏松肥沃的土壤，能耐轻度盐碱。

**应用：**① 宜孤植作庭荫树，也宜用大型花盆或木桶盆栽置于阳台、天台栽培。② 树皮可造纸，叶用于养蚕，桑果可酿酒及制作饮料。③ 根皮、果实、枝条及叶均可入药。



基部圆或心形



聚花果紫黑色、淡红或白色

先端尖或渐短尖

**分布：**原产我国中部。现全国各地均有栽培，朝鲜、日本、蒙古、俄罗斯、欧洲等国引种栽培。



|            |                                      |               |
|------------|--------------------------------------|---------------|
| 科属：芭蕉科旅人蕉属 | 学名： <i>Ravenala madagascariensis</i> | 别名：扇芭蕉、旅人木、水木 |
|------------|--------------------------------------|---------------|

旅人蕉

**形态：**多年生乔木状常绿大型草本，株高可达15米。茎干直立，不分枝。叶片长椭圆形，大如芭蕉，具长柄，呈两列整齐着生于茎顶。蝎尾状聚伞花序腋生，总苞船形，白色。蒴果木质，长圆形。

**习性：**喜光，喜高温多湿气候，忌低洼积涝。要求疏松、肥沃、排水良好的土壤。

**应用：**多用于庭院、小区、公园绿化，幼株可盆栽观叶，用于装饰宾馆、饭店大厅或走廊。



分布：原产马达加斯加。我国广东、海南、福建、台湾栽培较多。

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 科属：芭蕉科蝎尾蕉属 | 学名： <i>Heliconia caribaea</i> H. bihai cv. Richmond Red |
|------------|---------------------------------------------------------|

富红蝎尾蕉



**形态：**多年生常绿丛生草本，株高2 ~ 4米。叶狭长圆形，具长柄。花序顶生，直立，花序轴红色，苞片红色，底部紫红色，边缘至顶端有黄色狭带，尖端绿色。花期4 ~ 12月。

**习性：**喜高温、高湿、半阴环境，稍耐寒，不耐干旱。喜肥沃疏松、排水良好的中性或微酸性土壤。

**应用：**① 南方可露地栽培，用于公园、小区、办公场所及庭院绿化观赏，也适宜作大型盆栽，布置厅堂。  
② 可作切花材料。



分布：本种为园艺品种。



科属：紫金牛科紫金牛属

学名：*Ardisia mamillata*

别名：佛光红、红毛毡、老虎脰、乳毛紫金牛、毛凉伞、山猪怕

## 虎舌红

**形态：**多年生常绿亚灌木，株高15 ~ 25厘米。叶互生，倒卵形或椭圆形，边缘有不清晰圆齿轮，两面有紫红色粗毛和黑色小腺体。伞形花序顶生或腋生，花瓣粉红色或近白色。核果球形，成熟时鲜红色。花期7 ~ 9月，果期8 ~ 9月。

**习性：**喜阴凉湿润，忌阳光直射，忌干旱、怕水涝。喜肥沃疏松、排水良好的微酸性土壤。生长适温为12℃ ~ 30℃。

**应用：**① 优良的盆栽观果植物，也可在园林中群植于林下或山石两旁。② 全草入药，具有清热利湿、活血止血、去腐生肌的功效。



核果球形，成熟时鲜红色



叶互生，倒卵形或椭圆形

分布：原产我国，多生于海拔500 ~ 1200米的山谷密林下较阴湿的地方。越南也有分布。



|             |                            |                    |
|-------------|----------------------------|--------------------|
| 科属：紫金牛科紫金牛属 | 学名： <i>Ardisia crenata</i> | 别名：富贵籽、红铜盘、大罗伞、雨伞朱 |
|-------------|----------------------------|--------------------|

朱砂根

**形态：**常绿灌木，株高0.3 ~ 1.5米。匍匐茎肥壮，直立无毛。单叶互生，革质或纸质，椭圆状披针形至倒披针形，边缘具波纹或锯齿。花序伞形或聚伞状，花小，白色或淡红色。核果球形，具斑点。花期5 ~ 7月，果期9 ~ 12月。

**习性：**喜温暖湿润气候，忌干旱，较耐阴。土壤以肥沃、疏松，富含腐殖质的沙质壤土为佳。

**应用：**① 优良盆栽室内观果花卉，也可植于阔叶林下或溪边灌丛中作观果地被。② 种子可榨油。③ 根、叶入药，具有祛风除湿、散瘀止痛、通经活络的功效。



分布：原产我国、日本、琉球及爪哇，生于90 ~ 2400米林下阴湿的灌丛中。

|             |                             |                 |
|-------------|-----------------------------|-----------------|
| 科属：桃金娘科番樱桃属 | 学名： <i>Eugenia uniflora</i> | 别名：番樱桃、扁樱桃、稜果蒲桃 |
|-------------|-----------------------------|-----------------|

红果仔

**形态：**灌木或小乔木，高可达6米。叶近无柄，纸质，卵形至卵状披针形，先端渐尖，基部圆形或微心形，有透明腺点。花白色，稍芳香，单生或数朵聚生于叶腋。浆果扁圆形，熟时深红色。花期春季。

**习性：**喜光照，喜温暖、湿润的环境，较耐旱，不耐寒。以疏松、排水良好的沙质壤土为佳。

**应用：**① 重要的观赏花卉，尤其是果实成熟时，观赏性极佳，可用于公园、小区等绿化栽培，也适合庭园美化或盆栽置于阳台、天台观赏。② 果可食用，也可用于制作糖果及饮料。



分布：原产巴西。我国引种栽培，云南、海南、广东、台湾栽培较多。



|         |                                   |             |
|---------|-----------------------------------|-------------|
| 科属：桃金娘科 | 学名： <i>Leptospermum scoparium</i> | 别名：澳洲茶树、鱼柳梅 |
|---------|-----------------------------------|-------------|

松红梅

**形态：**常绿小灌木。枝条赤褐色，纤细。叶互生，丛生状，线形或线状披针形。花有单瓣及重瓣之分，花色有红、桃红、粉红或深红，花心多为深褐色。果实蒴果。花期2 ~ 9月。

**习性：**喜温暖，忌高温多湿，忌积水。对土壤要求不严，但以排水良好、富含腐殖质的沙质壤土为佳。

**应用：**适宜盆栽，可用于居室、会议室、厅堂等装饰，也可植于公园、庭院、小区等绿化环境。



叶互生，丛生状



花色多样

花心多为深褐色

分布：原产澳大利亚、新西兰等地。我国引种栽培。

|            |                                  |            |
|------------|----------------------------------|------------|
| 科属：桃金娘科蒲桃属 | 学名： <i>Syzygium samarangense</i> | 别名：莲雾、爪哇蒲桃 |
|------------|----------------------------------|------------|

洋蒲桃



**形态：**乔木。叶片薄革质，椭圆形至长圆形，先端钝尖，基部变狭，圆形或微心形。聚伞花序顶生或腋生，着花数朵，花白色。果实梨形或圆锥形，肉质，红色，顶部凹陷。花期3 ~ 4月，果熟期5 ~ 6月。

**习性：**喜阳光，喜温暖、湿润的环境条件，耐热，不耐寒。对土壤要求不严，一般的土壤均可良好生长。

**应用：**多作为水果栽培，也适合公园、小区、校园及专类园栽培观赏；也可植于庭院之中，即可观赏，又可食用。



果实肉质，红色，顶部凹陷

分布：原产马来西亚及印度。现我国台湾、广东、广西栽培较多。



|             |                                |        |
|-------------|--------------------------------|--------|
| 科属：猪笼草科猪笼草属 | 学名： <i>Nepenthes mirabilis</i> | 别名：猪仔笼 |
|-------------|--------------------------------|--------|



# 猪笼草

**形态：**多年生半木质常绿藤本，株高约1.5米。叶互生，长椭圆形，全缘。中脉延长为卷须，末端有一小叶笼，瓶状，瓶口边缘厚，上有盖，绿色为主，有褐色或红色的斑点和条纹。雌雄异株，叶腋抽生总状花序，小花单性，无花瓣。萼片红色或紫红色。

**习性：**喜高温多湿的半阴环境，忌强光直射。土壤以疏松、肥沃和透气的腐叶土或泥炭土为好。生长适温为25℃ ~ 30℃。

**应用：**可用于点缀客厅花架、阳台和窗台，或悬挂于庭园树上和走廊旁观赏。

分布：原产东南亚和澳大利亚的热带地区，多生于海拔50 ~ 400米的沼地、路边、山腰的灌丛、草地或林下。我国广东也有分布。

|             |                                      |                                |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 科属：紫茉莉科叶子花属 | 学名： <i>Bougainvillea spectabilis</i> | 别名：九重葛、三角梅、毛宝巾、肋杜鹃、簕杜鹃、三角花、贺春红 |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------------|



# 叶子花

**形态：**常绿攀缘灌木，株高1 ~ 2米。老枝褐色，小枝青绿，长有针状枝刺。单叶互生，卵状或卵圆形，全缘。花顶生，花小，淡红色或黄色，常三朵簇生于三枚较大的苞片内，苞片有紫、红、橙、白等色；花期11月到翌年6月。瘦果五棱形，很少结果。

**习性：**喜温暖湿润、阳光充足的环境，属短日照植物，不耐寒，不耐阴，耐碱、耐旱。对土壤要求不严，但以排水良好的粘质壤土最为适宜。

**应用：**可用作围墙的攀缘花卉栽培，也可盆栽，置于门廊、庭院和厅堂入口处观赏。



分布：原产巴西。我国南方栽培普遍。



|             |                             |                |
|-------------|-----------------------------|----------------|
| 科属：紫茉莉科紫茉莉属 | 学名： <i>Mirabilis jalapa</i> | 别名：草茉莉、胭脂花、地雷花 |
|-------------|-----------------------------|----------------|

# 紫茉莉

**形态：**多年生草本，株高约0.6 ~ 1米。主茎直立，侧枝散生。单叶对生，三角状卵形。花数朵顶生，花冠漏斗形，边缘有波状浅裂，不分瓣。花有白、黄、红、粉、紫等色，并有条纹或斑点状复色；花期7 ~ 10月。坚果卵圆形，黑色。

**习性：**喜温和湿润的气候条件，稍耐阴，不耐寒。要求土层深厚、疏松肥沃的壤土。

**应用：**① 适合花坛、花境种植，也多植于公园、小区、庭院美化环境；有些品种适合盆栽观赏。  
② 根叶可供药用，具有清热解毒、活血调经的功效。



边缘有波状浅裂



有条纹或斑点状复色



紫红色花

分布：原产南美热带地区。我国各地栽培广泛，已逸为野生。



|          |                             |                  |
|----------|-----------------------------|------------------|
| 科属：睡莲科莲属 | 学名： <i>Nelumbo nucifera</i> | 别名：莲花、莲、芙蕖、芙蓉、菡萏 |
|----------|-----------------------------|------------------|

# 荷花

**形态：**多年生水生草本，根状茎横生于水底泥中，肥厚。叶圆形，盾状，全缘稍呈波状，具白粉。花大，芳香，花瓣红色、粉色或白色。坚果，果皮革质，坚硬，成熟时为墨褐色。花期6 ~ 8月，果期8 ~ 10月。

**习性：**喜光照，不耐阴，过分荫蔽开花不良。对土壤适应范围广，以微酸性、富含有机质的粘壤土为佳。


**应用：**① 园林应用广泛，常广植于佛门净地，也可植于庭院作水面绿化，还可缸植观赏。② 根状茎可作蔬菜或提取淀粉，种子可食用，叶可作茶的代用品。③ 全株可入药。



重瓣花



粉色花



叶圆形，盾状



莲蓬

分布：原产我国南北各省。俄罗斯、朝鲜、日本、印度及亚洲南部和大洋洲均有分布，野生或栽培于池塘或水田中。

|            |                           |            |
|------------|---------------------------|------------|
| 科属：睡莲科萍蓬草属 | 学名： <i>Nuphar pumilum</i> | 别名：黄金莲、萍蓬莲 |
|------------|---------------------------|------------|

# 萍蓬草

**形态：**多年生水生草本。根茎粗壮，叶二型，浮水叶，圆形至卵形，全缘。沉水叶薄而柔软。花单生于花梗顶端，花茎伸出水面，萼片黄色，花瓣状。浆果卵形，种子矩圆形。花期7 ~ 8月，果期7 ~ 8月。

**习性：**喜温暖、湿润、阳光充足的环境，耐低温。对土壤要求不严，以土质肥沃略带粘性为好。

**应用：**① 多用于池塘水景布置，又可盆栽于庭院、建筑物、假山石前，或在居室前向阳处摆放。② 根状茎可食用，又可入药，具有强壮、净血作用。



叶浮水叶，圆形至卵形，全缘



萼片黄色，花瓣状

分布：原产我国东北、华北、江浙及广东一带，多生于沼泽地带。欧洲和日本也有分布。



|           |                               |                |
|-----------|-------------------------------|----------------|
| 科属：睡莲科睡莲属 | 学名： <i>Nymphaea tetragona</i> | 别名：子午莲、水浮莲、水芹花 |
|-----------|-------------------------------|----------------|

## 睡莲

花瓣多数



**形态：**多年生水生花卉。根状茎短粗，直立。叶纸质，漂浮水面，心脏形或宽椭圆形。花单生漂浮水面，花瓣多数，呈白、粉、红、黄等色。浆果为宿存萼片所包裹。花期6～9月，果期8～10月。

**习性：**有耐寒和不耐寒两类。喜阳光充足，通风良好。以在富含腐殖质的粘土，水质清洁及温暖的静水中生长为佳。

**应用：**① 常用于点缀水面，水缸栽培点缀平台、阳台也可；盆养睡莲可布置庭院。② 根状茎含有淀粉，供食用或酿酒；全草可作绿肥。



分布：原产北非及东南亚热带地区，生于池沼中。我国分布广泛。

|           |                                |               |
|-----------|--------------------------------|---------------|
| 科属：木犀科素馨属 | 学名： <i>Jasminum nudiflorum</i> | 别名：金腰带、金梅、小黄花 |
|-----------|--------------------------------|---------------|

## 迎春

**形态：**落叶丛生灌木，株高40～50厘米。枝条细长，小枝有角棱。叶对生，3小叶卵形或长椭圆形，先端急尖，灰绿色。花单生，着生于枝的叶腋，色黄外染红晕，高脚碟状，先叶开放，具清香；花期2～4月。浆果黑紫色。

**习性：**适应性强，喜温暖湿润环境，喜光、稍耐荫，抗旱、怕涝，耐寒力强，也耐空气干燥。对土壤要求不严，在肥沃、湿润而排水良好的中性土壤上生长最好。



花黄色

3小叶卵形或长椭圆形



**应用：**我国重要的春季观花植物，多用于公园、小区、庭院及空中绿化，也可盆栽观花赏叶，还可制作盆景。

分布：原产我国北部和西南高山，生于海拔800～2000米的山坡灌丛中。



|           |                            |           |
|-----------|----------------------------|-----------|
| 科属：木犀科素馨属 | 学名： <i>Jasminum sambac</i> | 别名：茉莉、末利花 |
|-----------|----------------------------|-----------|

# 茉莉花

**形态：**常绿小灌木或藤本，株高约1米。枝干黄褐色，嫩枝细，绿色，略呈藤本状。单叶对生，卵圆形至椭圆形，表面有光泽，全缘。花单生或聚伞花序，生于枝顶或叶腋，花白色，单瓣至重瓣，具浓香，花期6 ~ 10月，少有结实。

**习性：**喜温暖湿润、光照充足环境。适生于疏松肥沃、排水良好的微酸性沙壤土，在碱性土壤上生长不良。生长适温为22℃ ~ 35℃。

**应用：**① 著名的香花植物，适合小区、公园及庭院栽培，也是盆栽的优良品种，也常用于切花。② 花可提取香精，也是薰制花茶的重要原料。③ 花、叶入药可治目赤肿痛，并有止咳化痰的功效。



**分布：**原产印度、巴基斯坦、伊朗等国。现我国各地广泛栽培。



|           |                               |                 |
|-----------|-------------------------------|-----------------|
| 科属：木犀科木犀属 | 学名： <i>Osmanthus fragrans</i> | 别名：木犀、岩桂、九里香、金粟 |
|-----------|-------------------------------|-----------------|


# 桂花

**形态：**常绿灌木或乔木，高可达10米。树干粗糙、灰白色。叶革质，对生，椭圆形或长椭圆形，幼叶边缘有锯齿。花簇生于叶腋，花小，有乳白、黄、橙红等色，香气极浓。花期9 ~ 10月。

**习性：**喜温暖湿润的气候，耐高温而不耐寒。适生于土层深厚、排水良好，富含腐殖质的偏酸性砂壤土，忌碱性土和积水。生长适温为20℃ ~ 28℃。

**应用：**① 名贵的香花植物，常将桂花种植于道路两侧，假山、草坪、院落等地，也适合盆栽欣赏。② 花是名贵香料，也可食用。

分布：原产我国西南和中部。现栽培广泛。



|           |                           |               |
|-----------|---------------------------|---------------|
| 科属：木犀科丁香属 | 学名： <i>Syringa oblata</i> | 别名：百结、情客、华北丁香 |
|-----------|---------------------------|---------------|

# 紫丁香

**形态：**落叶灌木或小乔木，株高1 ~ 3米，圆球形树冠。叶片纸质，单叶对生，卵圆形至卵状披针形，或椭圆形至近圆形或倒卵形。花两性，圆锥花序顶生或腋生，花萼钟状，花冠紫色，芳香。蒴果，长椭圆形到披针形。花期4 ~ 5月，果期7 ~ 9月。

**习性：**为温带及寒带树种，阳性，适应性强，较耐旱，忌积水，抗寒性强，稍耐阴。适于肥沃湿润土壤。

**应用：**① 对二氧化硫有较强的吸收能力，可净化空气，是北方重要的园林树种，常植于公园、小区及路边，也适合庭院栽培。② 可用于切花。③ 花香浓郁，可提取芳香油。

蒴果，长椭圆形到披针形



分布：原产我国的东北、华北及西北至四川西北部。我国长江以北栽培普遍。



科属：柳叶菜科倒挂金钟属    学名：*Fuchsia hybrida*    别名：吊钟海棠、灯笼海棠、灯笼花

# 倒挂金钟

**形态：**灌木状草本，株高0.3 ~ 1.5米。叶对生或轮生，卵形至卵状披针形，叶缘具疏齿。花生于枝上部叶腋，具长梗而下垂，有单瓣、重瓣，有白、粉红、橘黄、玫瑰等色。花期1 ~ 2月。

**习性：**喜冷凉、湿润气候，不耐炎热高温，忌酷暑和日晒雨淋。适宜富含腐殖质、排水良好的肥沃沙质壤土。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**适于作盆栽观赏，多用于装饰阳台及窗台，也可用于布置花坛。



叶缘具疏齿



花色多样

分布：原产秘鲁、智利、阿根廷、玻利维亚、墨西哥等地。现栽培的均为园艺种。

科属：柳叶菜科山桃草属    学名：*Gaura lindheimeri*    别名：千鸟花、白桃花、白蝶花

# 山桃草

**形态：**多年生宿根草本，株高1 ~ 1.5米，全株具短毛。多分枝。叶对生，披针形，先端尖，叶缘具波状齿，外卷。穗状花序或圆锥花序顶生，花小，白色或粉红色。花期5 ~ 9月。

**习性：**喜凉爽、湿润和阳光充足环境，较耐寒。以疏松、肥沃、排水良好的沙质壤土为佳。

**应用：**园林绿地，多成片群植，也可用于庭院绿化，还可用作插花。



白色花

分布：原产北美洲温带。我国华东地区栽培较多。



科属：柳叶菜科月见草属

学名：*Oenothera speciosa*

别名：红月见草

## 美丽月见草

花白色至  
水粉色

**形态：**多年生草本，多作一二年生栽培，株高50 ~ 80厘米。植株直立，枝条较软，分枝力差。叶对生，线形至线状披针形，基生叶羽裂。花白色至水粉色，具芳香。果为蒴果。花期6 ~ 9月。

**习性：**喜日照充足，耐半阴，不耐寒，风大易倒伏。对土质要求不严，以排水良好、肥沃的沙质壤土为佳。

**应用：**开花繁茂，栽培容易，是一种优良的草本花卉，可用于公园、绿地等绿化，也可植于庭院或盆栽欣赏。

叶线形  
至线状  
披针形

分布：原产美国南部地区，适应性强，可自播。现我国江浙一带引种栽培。

科属：兰科卡特兰属

学名：*Cattleya* spp.

别名：嘉德丽亚兰、卡特利亚兰

## 卡特兰

**形态：**多年生附生草本。假鳞茎呈棍棒状或圆柱状，顶部生有叶1 ~ 3枚，叶长圆形，质厚，革质。花单朵或数朵，着生于假鳞茎顶端，萼片披针形，花瓣卵圆形，边波状。花期因品种不同而异。

**习性：**喜温暖、潮湿，要求半阴环境。通常用蕨根、苔藓、树皮块等作为栽培基质。生长适温为15℃ ~ 30℃。

**应用：**良好的室内观花品种，常在喜庆、宴会上用于插花观赏。

花瓣卵圆形，  
边波状

叶长圆  
形，质厚



分布：原产西印度群岛。现栽培的均为园艺种，品种繁多。



|         |                             |               |
|---------|-----------------------------|---------------|
| 科属：兰科兰属 | 学名： <i>Cymbidium hybrid</i> | 别名：杂种虎头兰、喜姆比兰 |
|---------|-----------------------------|---------------|

## 大花蕙兰

**形态：**多年常绿草本，株高0.3 ~ 1.5米。假球茎硕大。叶丛生，带状，革质。花梗由假球茎抽出，每梗着花8 ~ 16朵，花有红、黄、翠绿、白、复色等色。花期2 ~ 3月。

**习性：**喜温暖、湿润环境，要求光照充足，但夏季花芽分化期需冷凉环境。要求疏松、肥沃、富含腐殖质的微酸性土壤。生长适温为10℃ ~ 25℃。

**应用：**盆栽于室内花架、阳台、窗台观赏，也适合办公室、会议室、宾馆的厅堂装饰观赏。



花色多样



叶丛生，带状

分布：原产我国西南等地。现栽培的均为杂交种。

|         |                           |          |
|---------|---------------------------|----------|
| 科属：兰科兰属 | 学名： <i>Cymbidium spp.</i> | 别名：兰蕙、兰草 |
|---------|---------------------------|----------|

## 中国兰花

叶带状



**形态：**多年生常绿草本，多为地生兰，少数为附生兰，罕有腐生。通常具假鳞茎，叶带状，稀有倒披针形至狭椭圆形。花葶侧生或发自假鳞茎基部，直立、外弯或下垂。总状花序，具数花或多花，少数种为单花。花期依品种而定。

**习性：**喜温暖、冷凉，忌酷热，喜阴，忌强光。以疏松、排水良好的微酸性土壤为佳。

**应用：**清秀多姿，花香清幽，是室内栽培的优良品种，可用于卧室、几案及办公桌等的装饰。

总状花序



分布：我国广泛分布于秦岭山脉以南地区，新几内亚及澳大利亚也有分布。



|          |                            |              |
|----------|----------------------------|--------------|
| 科属：兰科石斛属 | 学名： <i>Dendrobium</i> spp. | 别名：石斛、吊兰花、石兰 |
|----------|----------------------------|--------------|

石斛兰

**形态：**多年生附生草本，株高50 ~ 80厘米。茎多为丛生，直立或下垂，少分枝，具节。叶近革质，互生。总状花序或伞形花序，直立、斜出或下垂，花色及大小因品种而异。

**习性：**喜温暖。湿润和半阴环境，不耐寒。忌干燥，宜通风良好的环境。宜用排水好、透气的碎蕨根、水苔、木炭屑、碎瓦片、珍珠岩等作为栽培基质，以碎蕨根和水苔为主。

**应用：**① 常作为盆栽供室内观赏，用于桌饰、吊挂。② 良好的切花材料。



秋石斛



春石斛

分布：原产亚洲热带及亚热带地区至大洋洲。我国主产秦岭以南各省，以云南南部为多；我国有74种2变种，现园艺品种较多。

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 科属：兰科树兰属 | 学名： <i>Epidendrum</i> spp. |
|----------|----------------------------|

树兰

**形态：**多为附生兰类，稀地生。茎细长圆柱形，多分枝，着生多数灰色气生根。叶片狭长，总状花序，着生于长花葶之顶，花鲜红色，花期春夏至晚秋。

**习性：**喜阳光，忌强光直射，干燥季节宜喷水保湿。栽培基质常用树皮、石块、木炭等附生基质。

**应用：**可附于木柱、树干上栽培，也可用树皮、木炭等盆栽观赏，用于装饰客厅、卧室及案几。



叶片狭长



花鲜红色

分布：美洲的佛罗里达至阿根廷北部以及墨西哥有分布，现我国引种栽培。



科属：兰科文心兰属

学名： *Oncidium hybrid*

别名：跳舞兰、瘤瓣兰、舞女兰

## 文心兰

**形态：**多年生常绿丛生草本，株高20 ~ 30厘米，假鳞茎扁卵圆形，绿色，顶生1 ~ 3枚叶，椭圆状披针形。总状花序，腋生于假鳞茎基部，花朵唇瓣为黄色、白色或褐红色。花期依品种而定，部分品种花期全年。

**习性：**喜湿润和半阴环境，厚叶型品种耐干旱能力强，厚叶型文心兰喜温热环境，而薄叶型和剑叶型文心兰喜凉爽气候。生长适温为12℃ ~ 25℃，不同品种略有差异。

**应用：**① 常作盆栽摆放居室、窗台、阳台，也可装饰办公室、会议室及宾馆酒店等。② 高级切花花材。

总状花序

叶椭圆状披针形

分布：原产美国、墨西哥、圭亚那和秘鲁。



|          |                               |        |
|----------|-------------------------------|--------|
| 科属：兰科兜兰属 | 学名： <i>Paphiopedilum</i> spp. | 别名：拖鞋兰 |
|----------|-------------------------------|--------|

兜兰

**形态：**多年生草本，地生、半附生或附生。茎极短。叶基生，革质，数枚或多枚，带形、狭长圆形或狭椭圆形，绿色或带有红褐色斑纹。花葶从叶丛中抽出，花形奇特，唇瓣呈口袋形，花瓣较厚，花色有赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫、白及复色。花期秋冬季。

**习性：**喜温暖、湿润和半阴的环境，怕强光暴晒。要求肥沃和排水透气良好的栽培基质。

**应用：**盆栽观赏，适于客厅、案几、酒店等场所装饰观赏，也适宜布置专类园。



分布：原产热带及亚热带地区的树林下。我国主要分布于西南至华南诸省。

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 科属：兰科鹤顶兰属 | 学名： <i>Phaius tankervilleae</i> |
|-----------|---------------------------------|

叶卵状披针形  
或阔披针形

鹤顶兰

**形态：**多年生丛生草本，植株较高大，高70 ~ 80厘米。假鳞茎圆锥形。叶互生，卵状披针形或阔披针形，全缘。总状花序腋生于假鳞茎基部，花被背面白色，内面暗红色。花期3 ~ 6月。

**习性：**喜温暖湿润、半荫蔽的气候环境，忌阳光直射，不耐寒，忌涝、忌干旱、忌瘠薄。宜排水良好、富含腐殖质的微酸性沙质壤土。

**应用：**① 适宜林下阴湿处成片种植和盆花栽培。② 可作切花。



分布：原产亚洲热带、亚热带及大洋洲，生于海拔700 ~ 1800米的林缘、沟谷或溪边的阴湿之地。我国主要分布于台湾、福建、广东、广西、海南、香港及西藏等地。




|           |                                |       |
|-----------|--------------------------------|-------|
| 科属：兰科蝴蝶兰属 | 学名： <i>Phalaenopsis hybrid</i> | 别名：蝶兰 |
|-----------|--------------------------------|-------|

蝴蝶兰

**形态：**多年生附生草本，株高50 ~ 80厘米。根丛生，扁平带状，具气生根。茎不明显。叶丛生，倒卵状长圆形。总状花序至圆锥花序；花葶上伸，呈弓状，着花3至多朵，花大，花色有白、黄、粉红、红、紫红及各种复色。自然花期春季。

**习性：**喜高温、湿润、半荫蔽的气候环境，忌阳光直射、忌闷热、忌积水，畏寒冷。栽培基质宜选择保水、透气的植料，如水苔、苔藓、蕨根、树皮块、椰子壳块等，目前栽培主要使用水苔。

**应用：**多用于盆栽观赏，也可用于切花、贵宾胸花、新娘捧花、花篮插花的高档素材，也可用于布置兰花专类园。



分布：原产热带亚洲至澳大利亚，生于低海拔的热带及亚热带的丛林树干之上。

|            |                               |          |
|------------|-------------------------------|----------|
| 科属：兰科拟蝶唇兰属 | 学名： <i>Psychopsis papilio</i> | 别名：蛾形文心兰 |
|------------|-------------------------------|----------|

拟蝶唇兰

**形态：**多年生常绿附生草本。叶厚革质，形似兔耳，暗绿色，具红色或紫色斑点或花纹。花茎直立，花着生于花序顶端。花似蝴蝶，褐色，具黄色斑纹或饰边，唇瓣较大，中间有一黄色大斑点。

**习性：**喜充足的散射光，忌强光，夏季应保持空气及基质湿润，但忌积水。

**应用：**花型奇特，为室内盆栽佳品，也是近年来流行的新品种，可用来装饰书桌、餐桌及茶几，或用于办公场所的美化。



叶形似兔耳，暗绿色



分布：特立尼达、多巴哥、委内瑞拉、哥伦比亚、厄瓜多尔及秘鲁等地。



|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 科属：兰科万代兰属 | 学名： <i>Vanda</i> spp. |
|-----------|-----------------------|

万代兰

**形态：**多年生常绿附生草本。茎直立或斜立，具发达气根。叶扁平，常狭带状，二列。总状花序从叶腋间抽出，斜立或近直立，疏生少数至多数花，花大或中等大，有白、黄、粉红、紫红、茶褐和天蓝等色。花期依种类而定。

**习性：**喜高温、高湿和较强的阳光。要求透水透气好的砖块、树蕨块作为栽培基质。

**应用：**花大而美，是著名的观赏花卉，多供盆栽观赏，也可布置专类园，还可用于切花。



叶扁平，常狭带状

总状花序

分布：原产亚洲热带、澳大利亚及新几内亚等地。我国有9个栽培品种。

|             |                                                    |                  |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------|
| 科属：酢浆草科酢浆草属 | 学名： <i>Oxalis triangularis</i> cv. <i>Purpurea</i> | 别名：紫叶山酢浆草、浅紫花酢浆草 |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------|

紫叶酢浆草

**形态：**多年生宿根草本，株高约15 ~ 30厘米，根肉质。叶簇生于地下鳞茎上，有长柄，为三出掌状复叶，小叶呈三角形，叶片初生时为玫瑰红色，成熟时紫红色。伞形花序，花白色至浅粉色。花期4 ~ 12月。

**习性：**喜温暖湿润环境，耐旱，不耐寒，喜光，不宜烈日暴晒。喜肥沃疏松、湿润、排水良好、富含有机质的土壤。生长适温为15℃ ~ 28℃。

**应用：**盆栽用于居室、阳台和窗台点缀，还可在花坛、花境、花带中作地被植物，也适用于花坛边缘栽植，或进行大面积的盆栽陈设。



叶片成熟时紫红色

分布：原产美洲热带地区。我国南方栽培较多。



|            |                               |                 |
|------------|-------------------------------|-----------------|
| 科属：酢浆草科阳桃属 | 学名： <i>Averrhoa carambola</i> | 别名：杨桃、王棱果、五稔、洋桃 |
|------------|-------------------------------|-----------------|

# 阳桃

花淡紫红色



**形态：**乔木，株高可达12米。奇数羽状复叶，互生，全缘，卵形或椭圆形。花小，具微香，数朵至多朵组成聚伞花序或圆锥花序，花淡紫红色。肉质浆果，多5棱。花期4 ~ 12月，果期7 ~ 12月。

**习性：**喜光照，喜温暖、湿润的气候条件，不耐寒、较耐旱。对土质如特殊要求，一般土壤均可良好生长。

**应用：**① 多用作果树栽培。近年来，常在园林绿地中应用，也适合庭院栽培欣赏，还可用大型花盆盆栽于阳台、天台绿化美化环境。② 果可食，也可入药，具有生津止渴的功效；根、皮、叶入药，可止痛止血。

叶卵形或椭圆形



分布：原产马来西亚、印度尼西亚，生于路旁、疏林或庭园中。现广东、广西、福建、台湾、云南等地栽培较多。



科属：棕榈科槟榔属

学名： *Areca triandra*

别名：丛立椰子

## 三药槟榔

**形态：**常绿小乔木，植株高大，株高4 ~ 7米。茎干青绿色，光滑，叶痕环状如节。叶为羽状复叶，侧生羽叶有时与顶生叶合生。

肉穗花序，多分枝，雌雄同株，基部为雌花。果实橄榄形，熟时橙色或赭色。

**习性：**喜高温、湿润的环境，耐阴性很强，成株有一定抗寒性。要求肥沃疏松而排水良好的土壤。

**应用：**在园林绿化中应用较广，可地植于公园、庭院、小区、山石及水滨等处，也可盆栽。

肉穗花序，  
多分枝

羽状复叶



果实橄榄形



茎干青绿色，光滑

**分布：**原产印度、马来西亚等热带地区。我国台湾、海南、广东、云南省区有栽培。



科属：棕榈科鱼尾葵属

学名：*Caryota mitis*

别名：小鱼尾葵、丛生鱼尾葵、酒椰子



小叶先端呈现不规则鱼尾状

## 短穗鱼尾葵

**形态：**常绿丛生小乔木，株高5 ~ 8米。茎秆竹节状，具环状叶痕。叶片大型，二回羽状复叶。小叶先端呈现不规则鱼尾状。肉穗花序稠密而短，佛焰苞可多达11枚。果球形，熟时蓝黑色。花期7月。

**习性：**喜温暖通风的环境，喜光、耐半阴。但以土质疏松、肥沃的酸性壤土为佳。

**应用：**① 优美的庭园树种，丛植、行植或墙边种植均可，常以

中小盆种植，摆放于大堂、门厅、会议室等场所。② 茎的髓心含淀粉，可食用；花序液汁含糖分，可制糖或酿酒。



果球形

分布：原产我国的海南、广西等省区，生于山谷林中或植于庭园中。

科属：棕榈科袖珍椰子属

学名：*Chamaedorea elegans*

别名：矮生椰子、矮棕

## 袖珍椰子

叶羽状开裂  
丛生于枝顶



小叶披针形



**形态：**常绿矮小灌木，株高1 ~ 3米。单干直立，茎细长，青绿色有环纹。叶羽状开裂丛生于枝顶，小叶披针形，深绿色而有光泽。肉穗花序腋生，花黄色小球形；花期3 ~ 4月。果实卵圆形，熟时橙红色。

**习性：**喜温暖、湿润半阴环境，耐干旱，忌高温、怕寒冷，最忌阳光直射。要求排水良好的肥沃沙质土壤。

**应用：**中小型盆栽，置于客厅茶几、卧室角落、宾馆内庭等，也适宜于办公室、会议室装饰。

分布：原产墨西哥。我国南部以及台湾均有栽培。



|           |                           |            |
|-----------|---------------------------|------------|
| 科属：棕榈科棕竹属 | 学名： <i>Rhapis excelsa</i> | 别名：筋头竹、观音竹 |
|-----------|---------------------------|------------|

棕竹

**形态：**常绿丛生灌木。茎圆柱形有节。叶片深裂，裂片线状披针形，顶端阔。肉穗花序，多分枝，佛焰苞管状，花期夏季，果球形。常见栽培的有金叶棕竹。



**习性：**喜温暖阴湿及通风良好的环境，不耐寒，较耐旱。对土质无特殊要求，以排水良好、富含腐殖质的砂壤土为佳。

**应用：**① 适宜丛植、列植于路旁及花坛边缘，也可盆栽和制作盆景。② 根及叶鞘纤维入药。

分布：原产我国南方地区。日本也有分布，我国南方栽培普遍。

|             |                                 |             |
|-------------|---------------------------------|-------------|
| 科属：罂粟科荷包牡丹属 | 学名： <i>Dicentra spectabilis</i> | 别名：铃儿草、兔儿牡丹 |
|-------------|---------------------------------|-------------|

荷包牡丹

**形态：**多年生草本。具根状茎，茎高30 ~ 60厘米。叶对生，叶片轮廓为三角形，二回羽状复叶，第一回裂片具长柄。总状花序顶生下垂，形似荷包，紫红色至粉红色，稀白色。花期4 ~ 6月。

**习性：**喜半阴和湿润环境，耐寒、忌高温、忌日光直射。要求土层深厚、富含腐殖质和排水良好的壤土。生长适温为10℃ ~ 20℃。

**应用：**① 盆栽布置于庭院、会场及居家阳台、窗台观赏，也可丛植于园路、墙隅观赏，还可用于花境栽培。  
② 全草入药，具有镇痛、利尿、调经、和血、除风、消疮毒的功效。

总状花序顶生下垂，形似荷包



分布：原产我国北部及日本、朝鲜、俄罗斯等地，生于中海拔的湿润草地及山坡上。



|            |                                      |            |
|------------|--------------------------------------|------------|
| 科属：罂粟科花菱草属 | 学名： <i>Eschscholtzia californica</i> | 别名：金英花、人参花 |
|------------|--------------------------------------|------------|

花菱草

**形态：**多年生草本，常作一二年生栽培，株高30 ~ 60厘米。全株被白粉。叶基生为主，茎上叶互生，多回三出羽状深裂，裂片线形至长圆形。单花顶生，具长梗，外缘波皱，有乳白、淡黄、橙、桂红、猩红、玫红、浅粉、紫褐等色；花期5月。蒴果，种子球形。



单花顶生



外缘波皱

**习性：**喜冷凉干燥气候，喜光，耐寒也耐半阴，不耐湿热，忌涝。宜深厚疏松的土壤，要求排水良好。生长适温为10℃ ~ 25℃。

**应用：**可作花带、花径和盆栽材料，也可用于草坪丛植。

分布：原产北美。我国栽培广泛。

|           |                           |                         |
|-----------|---------------------------|-------------------------|
| 科属：罂粟科罂粟属 | 学名： <i>Papaver rhoeas</i> | 别名：包米罂粟、丽春花、赛牡丹、锦被花、百般娇 |
|-----------|---------------------------|-------------------------|

虞美人

**形态：**一二年生草本，株高30 ~ 90厘米。全株被糙毛。叶互生，羽状深裂、裂片披针形，边缘具粗锯齿。花单生长梗上，有红、紫、粉、白等色，并有复色、镶边和斑点。花期5 ~ 6月。

**习性：**喜光照充足和通风良好的环境，较耐寒，不耐湿热。对土壤要求不严，宜栽植在排水良好的地方。



**应用：**① 布置花坛、花境，也可盆栽或作切花用。② 全株入药，具有镇咳、止泻、镇痛、镇静等功效，种子含油。

全株被糙毛



花单生长梗上

分布：原产欧洲和亚洲北部。我国各地常见栽培。



科属：松科雪松属

学名：*Cedrus deodara*

别名：喜马拉雅松、香柏、喜马拉雅杉



叶针状，  
灰绿色

雪松

**形态：**常绿乔木。高约50米，树冠圆锥形。主干直立。叶针状，灰绿色。雌雄同株异花，雄球花椭圆状卵形，雌球花卵圆形；花期10～11月。球果椭圆状卵形，成熟时红褐色；果期次年9～10月。

**习性：**阳性树种，对气候适应范围较广，喜凉爽湿润的气候，抗寒性较强，耐旱力较强，忌水湿，抗风力较弱。喜深厚肥沃、排水良好的微酸性土壤。

**应用：**① 宜孤植作中心树，如草坪中央、广场中心或主要建筑物的两旁及园门的入口等处；也适合庭院栽培。② 木材可用于建筑、桥梁、家具等；木材还含有树脂，具香气。



分布：原产喜马拉雅山地区，为现代孑遗植物之一，分布于1300～3300米的山地中。我国栽培广泛。

科属：胡椒科草胡椒属

学名：*Peperomia argyreia*

别名：西瓜皮豆瓣绿

西瓜皮椒草

**形态：**多年常绿草本，株高约15～20厘米。茎短丛生，具暗红色的叶柄。叶密集，肉质，盾形或宽卵形，叶面绿色，叶背为红色。叶脉绿色，叶面具银白色的规则色带，似西瓜皮。穗状花序，花小，白色。

**习性：**喜高温、多湿及半阴的环境，忌阳光暴晒，耐寒性较差。喜疏松、透气、排水良好的轻质培养土。生长适温为20℃～28℃。

**应用：**宜作盆栽摆设或吊挂观赏，可用于装饰阳台、窗台、案几，以及宾馆客房、会议室和办公室。

叶面具银白色的  
规则色带，  
似西瓜皮



分布：原产南美洲和热带地区。我国南北均有栽培。



科属：胡椒科草胡椒属

学名：*Peperomia caperata* cv. Autumn Leaf

红皱椒草



**形态：**多年生常绿草本，植株簇生。茎短。叶丛生，圆心形，叶面有皱褶，暗红色，主脉及侧脉向下凹陷。花穗较长，高于植株之上，花梗红褐色。常见栽培的还有绿皱椒草。



**习性：**喜充足的散射光，喜高温、多湿的环境，忌强光，不耐寒。喜疏松、透气、排水良好的轻质培养土。生长适温为20℃ ~ 28℃。

**应用：**盆栽植于室内观赏，可置于书桌、茶几、窗台及电脑边欣赏，也适合办公室应用。

分布：原产巴西。我国南方引进栽培。

科属：胡椒科草胡椒属

学名：*Peperomia obtusifolia*

圆叶椒草

**形态：**多年生常绿草本，株高20 ~ 40厘米。茎多分枝，肉质，平滑无毛。叶倒卵形，先端尖，具有光泽。穗状花序，密生小花，绿白色。

**习性：**喜温暖、湿润和半阴的环境，喜明亮的散射光，也有较强的耐阴能力，忌强光直射。生长适温为18℃ ~ 28℃。

**应用：**盆栽可用于装饰案几、客厅、阳台等，是优秀的观叶小盆栽。



分布：原产巴西。我国广东、台湾等引进栽培。



|            |                                  |        |
|------------|----------------------------------|--------|
| 科属：胡椒科草胡椒属 | 学名： <i>Peperomia tetraphylla</i> | 别名：豆瓣菜 |
|------------|----------------------------------|--------|

豆瓣绿



叶阔椭圆形或近圆形

**形态：**多年生丛生草本。茎叶肥厚多肉，植株低矮，3 ~ 4片轮生，阔椭圆形或近圆形。穗状花序单生、顶生和腋生。花期2 ~ 4月或9 ~ 12月。

**习性：**喜高温多湿，忌强光直射，耐阴、耐旱，不耐寒。要求通气、排水良好的土壤。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**①盆栽、吊篮，常用于布置窗台、书案、茶几等处，也是地被和岩石园观赏植物。②全草药用，内服治风湿性关节炎、支气管炎，外敷治扭伤、骨折、痈疮疖肿。

分布：原产我国南方各省，生于潮湿的石上或枯树上。美洲、大洋洲、非洲及亚洲也有分布。

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 科属：胡椒科草胡椒属 | 学名： <i>Peperomia polybotrya</i> |
|------------|---------------------------------|

荷叶椒草

**形态：**多年生常绿草本，株高15 ~ 20厘米。叶肉质，簇生，叶倒卵形。穗状花序，灰白色。

**习性：**喜充足的散射光及高温高湿的环境，忌强光，不耐旱，不耐寒。土质以肥沃、排水良好的沙质壤土为佳。

**应用：**叶色靓丽，观赏性强，为优良的观叶植物，多盆栽观赏，可装饰居室、办公室、宾馆客房等。



叶倒卵形

分布：原产热带及亚热带地区。我国南方引种栽培。



|            |                                                    |         |
|------------|----------------------------------------------------|---------|
| 科属：胡椒科草胡椒属 | 学名： <i>Peperomia scandens</i> cv. <i>Variegata</i> | 别名：蔓性椒草 |
|------------|----------------------------------------------------|---------|

斑叶垂枝椒草

**形态：**多年生蔓性草本多肉植物。枝条柔软下垂，匍匐状。叶互生，心形或倒卵形，先端尖，叶具乳黄色斑块。

**习性：**喜充足的散射光，耐旱，耐高温、高湿，忌强光直射，不耐寒。对土质无特殊要求，以肥沃、排水良好的沙质壤土为佳。

**应用：**可吊盆或于普通花盆内栽培欣赏，多用于室内。



先端尖，叶具乳黄色斑块

分布：热带及亚热带地区有野生分布，我国栽培普遍。

|           |                               |                |
|-----------|-------------------------------|----------------|
| 科属：海桐科海桐属 | 学名： <i>Pittosporum tobira</i> | 别名：山攀花、七里香、海桐花 |
|-----------|-------------------------------|----------------|

海桐



蒴果球形，有棱角

**形态：**常绿灌木或小乔木，株高可达5米。单叶互生，有时在枝顶呈轮生状，厚革质倒卵形，全缘。顶生伞房花序，花白色或淡黄色，稍带绿色，有芳香。蒴果球形，有棱角，种子红色，有粘液。花期3 ~ 5月，果熟期9 ~ 10月。

**习性：**喜温暖湿润的海洋性气候，喜光，亦较耐阴，耐盐碱，能抗风、防潮。粘土、沙土、偏碱性土及中性土均能适应。生长适温为15℃ ~ 30℃。

**应用：**在庭院中可植于门旁、窗前，多修剪成圆球形，也可作路边绿篱栽植；盆栽可装饰房间或客厅。



叶在枝顶呈轮生状



花白色或淡黄色，稍带绿色

分布：原产长江以南沿海各省。日本及朝鲜也有分布，现我国栽培广泛。



|             |                                |                |
|-------------|--------------------------------|----------------|
| 科属：白花丹科白花丹属 | 学名： <i>Plumbago auriculata</i> | 别名：蓝花丹、蓝茉莉、花绣球 |
|-------------|--------------------------------|----------------|

蓝雪花

**形态：**常绿小灌木，株高1米左右，上端蔓状或开散。叶互生，较薄，矩圆形或矩圆状卵形，先端骤尖。穗状花序顶生或腋生，花冠高脚碟状，浅蓝色。同属常见种类有白雪花，又名白花丹，花冠白色。



叶互生，  
较薄

花冠高脚碟状，浅蓝色



**习性：**喜温暖和光照充足，不耐寒，较耐阴，忌烈日曝晒，喜高湿，过于干燥对生长不利。生长适温为20℃ ~ 25℃。

**应用：**适于林缘、草地边缘、花坛、花台及庭院一隅栽培；也可盆栽置于厅堂、阳台观赏。

分布：原产南部非洲。现我国栽培广泛。

|             |                             |                    |
|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 科属：花荵科天蓝绣球属 | 学名： <i>Phlox drummondii</i> | 别名：小天蓝绣球、草夹竹桃、桔梗石竹 |
|-------------|-----------------------------|--------------------|

福禄考

**形态：**一年生草本，高30 ~ 60厘米。茎粗壮直立。基生叶有柄，对生，茎上部叶常呈3枚轮生，长椭圆状披针形至卵状披针形。聚伞形花序着生茎顶，花萼筒状，花冠高脚碟状，花冠粉紫色至白色。蒴果卵形。花期6 ~ 10月，果熟期6月。

**习性：**喜冷凉气候，喜阴，不耐寒，忌积水、过热、过干。但在排水良好、疏松肥沃的中性土壤中生长最佳。生长适温为10℃ ~ 25℃。

**应用：**①庭园中常见观赏植物，宜作花坛、花境或其他花卉配植。②可作切花。

聚伞形花序着生茎顶

白色花



分布：原产北美。我国南北均有栽培。



|           |                                |                   |
|-----------|--------------------------------|-------------------|
| 科属：蓼科何首乌属 | 学名： <i>Fallopia multiflora</i> | 别名：多花蓼、紫乌藤、夜交藤、首乌 |
|-----------|--------------------------------|-------------------|

## 何首乌

**形态：**多年生草本。块根肥厚，长椭圆形，黑褐色。茎缠绕，多分枝。叶卵形或长卵形，基部心形或近心形。花序圆锥状，顶生或腋生，苞片三角状卵形，花被5深裂，白色或淡绿色。瘦果卵形。花期8～9月，果期9～10月。

**习性：**喜温暖、湿润的气候条件，耐阴、耐热、耐干旱。对土质要求不严，在富含腐殖质的沙质壤土中生长良好。生长适温为20℃～30℃。

**应用：**①枝叶繁茂，宜作垂直绿化及地面覆盖材料，也适合盆栽室内观赏。②块根入药，具有安神、养血、活络的功效。



分布：原产我国，生于山谷灌丛、山坡林下、沟边石隙中。日本也有分布。

|             |                               |        |
|-------------|-------------------------------|--------|
| 科属：雨久花科梭鱼草属 | 学名： <i>Pontederia cordata</i> | 别名：海寿花 |
|-------------|-------------------------------|--------|

## 梭鱼草



**形态：**多年生挺水植物。地下茎粗壮，黄褐色，地上茎丛生。叶光滑，倒卵形或披针形，叶基心形。穗状花序顶生，小花多数，蓝紫色或紫色，带黄色斑点。种子椭圆形。花果期6～9月。

**习性：**喜温暖、湿润、光照充足的环境。适用性强，对土质无特殊要求，以肥沃、疏松

的土壤为佳。生长适温为22℃～30℃。

**应用：**常栽种在浅水池或塘边，也适合庭院的水面绿化，还可以盆栽于室内观赏。



分布：原产北美。我国引种栽培，以江浙一带栽培为多。



|             |                                  |                   |
|-------------|----------------------------------|-------------------|
| 科属：马齿苋科马齿苋属 | 学名： <i>Portulaca grandiflora</i> | 别名：半支莲、松叶牡丹、大花马齿苋 |
|-------------|----------------------------------|-------------------|

## 太阳花

**形态：**一年生肉质草本，株高10 ~ 15厘米。茎细而圆，节上有丛毛。叶散生或互生，圆柱形。花顶生，基部有叶状苞片，单瓣、半重瓣、重瓣，有白、深、黄、红、紫等色；花期6 ~ 7月。蒴果，棕黑色。

**习性：**喜温暖、阳光充足而干燥的环境。极耐瘠薄，一般土壤都能适应，以排水良好的沙质土最佳。生长适温为20℃ ~ 30℃。

**应用：**庭园中常用的草花，可用于花坛外周装饰，或植于园路两旁及山石边观赏，也可植于花槽、花盆置于窗台、阳台美化居室。



分布：原产南美巴西。我国南北栽培广泛。

|             |                              |                 |
|-------------|------------------------------|-----------------|
| 科属：报春花科仙客来属 | 学名： <i>Cyclamen persicum</i> | 别名：兔耳花、兔子花、萝卜海棠 |
|-------------|------------------------------|-----------------|

## 仙客来

**形态：**多年生球根花卉，株高约30厘米。具扁圆形或球形球茎，叶自茎顶生出，呈丛生状，有长柄呈紫红色，心脏形或卵圆形，叶片有明显的白色斑纹。花梗直立，花蕾下垂，花开时花瓣向上反卷似兔耳，有白、桃红、洋红、玫瑰红、紫红等色；花期12月至翌年4月。蒴果，暗褐色。

**习性：**喜阳光充足、凉爽、湿润环境，不耐高温、半耐寒。以富含有机质、排水良好的疏松壤土为佳。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**① 盆栽装点室内、客厅和案头的佳品。② 可用于生产切花。



分布：原产希腊、叙利亚沿地中海一带。我国南北均有栽培，园艺品种繁多。



|             |                             |                   |
|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 科属：报春花科报春花属 | 学名： <i>Primula vulgaris</i> | 别名：德国报春、西洋樱草、欧洲樱草 |
|-------------|-----------------------------|-------------------|

## 欧洲报春

**形态：**一二年生草本，植株丛生，株高约20厘米。叶基生，长椭圆形，叶脉深凹；叶绿色。伞状花序，花有大红、粉红、紫色、蓝色、黄、橙、白等色，一般花心为黄色。花期1 ~ 2月。

**习性：**喜凉爽、湿润的环境，耐潮湿，怕暴晒，也不耐严寒。不耐高温和强光直射，要求肥沃、排水良好的微酸性土壤。生长适温为10℃ ~ 20℃。

**应用：**可盆栽，放置于茶几、书桌等处，是良好的室内观赏植物。



分布：原产欧洲至西伯利亚。现我国栽培广泛。

|             |                                                   |         |
|-------------|---------------------------------------------------|---------|
| 科属：凤尾蕨科凤尾蕨属 | 学名： <i>Pteris ensiformis</i> cv. <i>Victoriae</i> | 别名：白凤尾蕨 |
|-------------|---------------------------------------------------|---------|

## 银脉凤尾蕨

**形态：**中小型陆生蕨类，株高20 ~ 40厘米，丛生。根状茎匍匐生长，叶二型，一为孢子叶，直立，具叶轴，羽片狭长；另一种为裸叶，较矮，羽状展开，质薄。叶脉部分为明显的银白色。



**习性：**喜温暖湿润的半阴环境，忌强光直射，较耐寒，稍耐旱，忌积水。在湿润、肥沃、排水良好的土壤中生长良好。生长适温为15℃ ~ 26℃。

**应用：**① 盆栽观赏，适宜装点室内案几、窗台、阳台及办公室，也可布置阴湿之处的水景。  
② 切叶可用于插花。

分布：亚洲、大洋洲等地有分布。我国引种栽培。



科属：石榴科石榴属

学名： *Punica granatum*

别名：安石榴、海石榴、若榴、丹若、金罌、金庞、涂林

浆果球形，  
黄红色

## 石榴



**形态：**落叶灌木或小乔木，株高2 ~ 5米。树干灰褐色，嫩枝黄绿光滑，常呈四棱形。单叶对生或簇生，矩圆形或倒卵形，全缘，叶面光滑，短柄，新叶嫩绿或古铜色。花1朵至数朵生于枝顶或叶腋，花瓣红色或白色，单瓣或重瓣。浆果球形，黄红色。果熟期9 ~ 10月。

**习性：**喜向阳、温暖的气候，能耐短期低温。对土壤的适应性极强，在粘土、沙土、砾质土及盐碱土，甚至岩缝中均能生长，尤以沙壤土或壤土为宜。生长适温为20℃ ~ 30℃。

**应用：**既可观花又可观果，宜在庭院、阶前、墙隅、山坡及草地一隅种植；小型盆栽的花石榴可用来装饰居室、阳台等。



红色花

叶全缘，  
叶面光滑

分布：原产伊朗和地中海沿岸国家。现广植于全球的温带和热带地区。



|            |                               |              |
|------------|-------------------------------|--------------|
| 科属：毛茛科耧斗菜属 | 学名： <i>Aquilegia vulgaris</i> | 别名：耧斗花、西洋耧斗菜 |
|------------|-------------------------------|--------------|

## 耧斗菜

**形态：**多年生草本，株高40 ~ 80厘米。叶基生及茎生，叶卵状三角形。聚伞花序生于枝顶，花有蓝、紫或白色等，花瓣5片，各有一弯曲的距。花期5 ~ 7月。

**习性：**性强健，喜凉爽湿润和半阴环境，耐寒，怕高温和强光直射。宜疏松肥沃及排水良好的沙壤土。生长适温为15℃ ~ 20℃。

**应用：**适宜布置花坛，花境和林缘，也是盆栽、切花的好材料。



花瓣5片



叶卵状三角形



分布：原产欧洲、西伯利亚。我国引种栽培。

|           |                              |          |
|-----------|------------------------------|----------|
| 科属：毛茛科莲花属 | 学名： <i>Anemone coronaria</i> | 别名：冠状银莲花 |
|-----------|------------------------------|----------|

## 欧洲银莲花

**形态：**多年生草本，株高25 ~ 40厘米。具地下块根，叶为根出叶，3裂，成掌状深裂。花单生于茎顶，有大红、紫红、粉、蓝、橙、白及复色。花期3 ~ 5月。



花色多样

**习性：**喜凉爽、湿润，要求阳光充足，较耐寒，忌高温多湿，在半阴或阴地环境下生长良好。以疏松、排水良好、中性偏碱的沙性壤土为好，忌过于黏重。生长适温为10℃ ~ 18℃。

**应用：**适宜花坛、花径布置，也可供盆栽与切花。



分布：原产地中海地区。我国引种栽培。



科属：毛茛科翠雀花属

学名：*Delphinium grandiflorum*

别名：翠雀花

# 大花翠雀

**形态：**一二年生草本。茎直立，株高30 ~ 60厘米。叶互生，呈掌状深裂至全裂，裂片线形。基部叶片有长柄，上部叶片无柄。顶生总状花序或穗状花序，花有蓝、紫、红、粉白等色。花期5~6月。



花色多样

**习性：**喜阳光充足、通风良好的凉爽环境，较耐寒，怕暑热，忌水涝。宜在深厚肥沃的沙质酸性土壤上生长。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**可用于园林绿地绿化观赏，多植于花境及林缘下；也可用于背景材料，是高级切花的材料。



呈掌状深裂至全裂

分布：原种产于亚洲东部，此种为园艺杂交种。我国南北方均有栽培。

科属：芍药科芍药属

学名：*Paeonia lactiflora*

别名：将离、婪尾春、余容、犁食

# 芍药

**形态：**多年生宿根草本，株高1米左右。具纺锤形的块根。叶互生，下部叶为二回三出复叶，小叶狭卵形、披针形或椭圆形，边缘有小齿。花大，单生枝顶，有芳香，花瓣白、粉、红、紫或红色。蓇葖果，倒卵形。花期4 ~ 5月，果熟期8 ~ 9月。



花大，单生枝顶



**习性：**喜冷凉、干燥的气候，耐寒、耐旱、耐阴，忌积水。喜土层深厚、排水良好、疏松肥沃的沙质土壤。

**应用：**① 园林中应用广泛，可植于园路边、山石旁、水畔及林下，也是布置庭院的良好材料，还可盆栽及用于切花。② 种子含油，可制肥皂和涂料。③ 根入药，具有镇痛、镇痉、祛瘀、通经的功效。

分布：原产我国北部、西伯利亚、朝鲜及日本，生于山坡草地及林下。



|           |                                 |                |
|-----------|---------------------------------|----------------|
| 科属：毛茛科芍药属 | 学名： <i>Paeonia suffruticosa</i> | 别名：木芍药、富贵花、洛阳王 |
|-----------|---------------------------------|----------------|

牡丹

**形态：**落叶灌木，高1 ~ 2米。老茎灰褐色，当年生枝黄褐色。叶互生，二回三出复叶，顶生小叶3裂，无毛。花单生枝顶，花大，花色有白、黄、粉、红、紫及复色，有单瓣、重瓣。蓇葖果，密生褐黄色毛。花期4 ~ 5月。

**习性：**喜凉爽，忌暑热，喜干燥怕水湿，极耐低温，喜光，亦稍耐阴。要求疏松、肥沃、排水良好的中性壤土或沙壤土，忌粘重土壤或低洼处栽植。

**应用：**① 我国北方重要的观花灌木，也是近年来南方年宵花市的主打花卉之一，园林中常用于布置花境、花坛、花带等，也可盆栽观赏。② 根皮入药，具清热凉血、活血化瘀的功效。



分布：原产我国。园艺种极多，现国内外栽培普遍。

|           |                                 |                 |
|-----------|---------------------------------|-----------------|
| 科属：毛茛科毛茛属 | 学名： <i>Ranunculus asiaticus</i> | 别名：波斯毛茛、芹菜花、陆莲花 |
|-----------|---------------------------------|-----------------|

花毛茛

**形态：**多年生宿根草本，株高20 ~ 40厘米。地下有纺锤状小块根。茎单生或少数分枝。叶基生，阔卵形，具长柄，茎生叶无柄，2 ~ 3出羽状复叶。花单生或数朵顶生，分重瓣和半重瓣，有白、橙、黄、红、紫、褐等多种颜色。花期5 ~ 6月。

**习性：**要求阳光充足、凉爽及半阴的环境，但忌阳光直射、曝晒，较耐寒。喜肥沃疏松、排水良好的沙质土壤。生长适温为10℃ ~ 22℃。

**应用：**布置花坛、花境或用于林下地被花卉，也可盆栽室内观赏。



分布：原产亚洲西南部至欧洲东南部。我国南北均有栽培。



科属：蔷薇科桃属

学名： *Amygdalus persica*

别名：花桃、碧桃、观赏桃



花多粉红色



核果

## 桃花

**形态：**落叶小乔木，株高约8米。叶椭圆状披针形，边缘有粗锯齿。花单生、无柄、先叶开放，多粉红色，变种有深红、纯白及红白混色等变化，也多为重瓣种。果为核果。花期3 ~ 4月，果熟期5 ~ 9月。

**习性：**喜光，耐寒、耐旱，怕涝。以排水良好的沙壤土为佳，不耐碱土，也不宜栽植于重粘土上。生长适温为18℃ ~ 25℃。

**应用：**① 早春重要观花树种，既可盆栽也可地植，是公园、庭院常用的绿化树种。  
② 桃树分泌的桃胶，可入药，具有破血、活血、益气的功效。



**分布：**原产我国西北和中部地区。现世界各地广为栽培。



|          |                           |           |
|----------|---------------------------|-----------|
| 科属：蔷薇科杏属 | 学名： <i>Armeniaca mume</i> | 别名：干枝梅、春梅 |
|----------|---------------------------|-----------|

梅花



**形态：**落叶乔木，株高可达10米。叶互生，卵形，先端长渐尖。先花后叶，花着生于一年生枝的叶腋、单生，也有2朵簇生，花色有白、红、粉红等，有芳香，单瓣至重瓣。核果近球形。花期1月至翌年3月，因各地气候有所差异。

**习性：**喜温暖而稍湿润的气候，喜光照、通风良好的环境，耐寒，耐旱畏涝。喜排水良好的土壤，中性至微酸性为佳。生长适温为15℃ ~ 28℃

**应用：**① 园林中多丛植、群植、单植于园路边、坡地及溪边池畔等地，也可应用于梅花专类园中，还可制作盆景及盆栽欣赏。② 东方式插花的常用花材。③ 果实可食，可制成果脯，或熏制成乌梅入药。④ 花可提取香精，花、叶、根和种仁入药。



分布：原产我国，主要以长江流域及西南地区栽培为盛。日本及朝鲜也有分布。

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 科属：蔷薇科棣棠花属 | 学名： <i>Kerria japonica</i> | 别名：地棠花、地团花、黄度梅 |
|------------|----------------------------|----------------|

棣棠



**形态：**落叶灌木，株高100 ~ 160厘米。叶互生，长椭圆状卵形。花单生于侧枝顶端，黄色，5瓣。瘦果。花期4 ~ 5月，果熟期8 ~ 9月。常见栽培变种有重瓣棣棠。

**习性：**喜温暖、湿润的环境，耐湿、耐寒、稍耐阴。对土壤要求不严，一般土壤均可种植。

**应用：**① 棣棠开花繁茂，满树金黄，树姿优美，适宜公园、庭院、路边等栽培欣赏。② 花及枝叶入药，茎髓作为通草代用品入药，具有催乳利尿的功效。



分布：原产我国和日本，生于海拔200 ~ 3000米的山坡灌丛中。



|           |                                  |            |
|-----------|----------------------------------|------------|
| 科属：蔷薇科火棘属 | 学名： <i>Pyracantha fortuneana</i> | 别名：火把果、救军粮 |
|-----------|----------------------------------|------------|

火棘

**形态：**常绿灌木或小乔木。单叶互生，倒卵状长椭圆形。花白色，集成复伞房花序。梨果近圆形，熟时红色。花期4 ~ 5月，果熟期10月。栽培种还有黄果火棘。

**习性：**喜光照，较耐阴，有一定的耐寒性。耐瘠薄，对土壤要求不严。生长适温为20℃ ~ 30℃。

**应用：**① 花白如雪，果红艳俏丽，适宜于草坪边缘、庭院、林缘、山坡、水边孤植或丛植。  
② 果可酿酒及磨粉食用。



梨果近圆形，熟时红色



分布：原产我国东部、中部及西南部，生于山地、丘陵的阳坡灌丛及河沟路旁。

|           |                         |                      |
|-----------|-------------------------|----------------------|
| 科属：蔷薇科蔷薇属 | 学名： <i>Rosa hybrida</i> | 别名：长春花、月月红、斗雪红、瘦客、胜春 |
|-----------|-------------------------|----------------------|

月季

**形态：**常绿或半常绿灌木，或呈蔓状与攀缘状。具钩状皮刺。叶互生，羽状小叶3 ~ 5枚，卵形或长圆形。花单生或成伞房花序、圆锥花序，有白、黄、红、粉、紫及复色等，大多具香气。果实为假果，球形或壶形，成熟后呈红色或棕红色。花期4 ~ 9月，果期6 ~ 11月。



**习性：**喜日照充足、通风的环境，较耐寒，忌高温干旱。要求排水良好、富含有机质、肥沃、疏松的微酸性沙质土壤。生长适温为15℃ ~ 25℃，品种不同，适温有差异。

**应用：**① 可植于花坛、花境、草坪角隅等处，也可布置成月季专类园；可盆栽观赏，也是我国重要的切花花材。② 花、根、叶均入药，用于月经不调、痛经、痈疽肿毒、跌打损伤等症。

分布：原产北半球，我国也是原产地之一。现栽培的均为园艺种。



|           |                                |        |
|-----------|--------------------------------|--------|
| 科属：蔷薇科鸡麻属 | 学名： <i>Rhodotypos scandens</i> | 别名：白棣棠 |
|-----------|--------------------------------|--------|

鸡麻

**形态：**落叶灌木，株高2 ~ 3米。叶对生，卵形至椭圆状卵形。花白色，花瓣及花萼均为4片。果黑色。花期4月，果期6 ~ 7月。

**习性：**喜温暖阴湿环境，耐寒，忌涝。对土质无特殊要求，以疏松的沙质壤土中生长为佳。

**应用：**① 花洁白素雅，适合于草坪、庭院一隅栽培；假山石旁及水边栽植效果良好，可与黄色、红色的花灌木相配。② 根及果入药，可治血虚肾亏。



分布：原产我国，生于山坡疏林中及山谷林下荫蔽处。分布于辽宁、山东、山西、河南、江苏、浙江、安徽、湖北、陕西、甘肃等地；日本也有。

|           |                           |           |
|-----------|---------------------------|-----------|
| 科属：蔷薇科蔷薇属 | 学名： <i>Rosa bracteata</i> | 别名：野毛栗、糖钵 |
|-----------|---------------------------|-----------|

硕苞蔷薇

**形态：**常绿灌木，株高2 ~ 5米。小叶5 ~ 9，叶革质，椭圆形至倒卵形。花单生或2 ~ 3朵集生，花梗较短，花瓣白色。果球形，密被黄褐色柔毛。花期5 ~ 7月，果期8 ~ 11月。

**习性：**习性强健，喜光照，喜温暖，不耐寒。对土质要求不严，一般土壤均可良好生长。

**应用：**① 适合植于公园、小区里的山石、篱垣等地，或植于水边；也适合庭院栽培欣赏，还可用于绿篱。② 果实和根入药，具有收敛、补脾、益肾的功效，花入药具有止咳功效，叶外敷可治疗毒。



分布：我国江苏、浙江、台湾、福建、江西、湖南、贵州、云南及日本等地均有分布，生于溪边、路旁及灌丛中。



|           |                          |        |
|-----------|--------------------------|--------|
| 科属：蔷薇科蔷薇属 | 学名： <i>Rosa xanthina</i> | 别名：黄刺莓 |
|-----------|--------------------------|--------|

叶边缘有  
圆钝锯齿



花黄色

# 黄刺玫

**形态：**落叶灌木。小枝具散生皮刺。奇数羽状复叶，小叶常7 ~ 13枚，宽卵形或近圆形，边缘有圆钝锯齿。花单生于叶腋，黄色，单瓣或半重瓣。果近球形或倒卵形，紫褐色或黑褐色。花期4 ~ 6月，果期7 ~ 8月。

**习性：**喜光照，较耐阴、耐寒、耐旱、耐瘠薄。对土壤要求不严，一般土质均可良好生长，并能在轻碱土中生长。

**应用：**花色鲜艳，是早春重要的观花树种，可用于公园、办公楼、小区等绿化，也适合庭院栽培。



小枝具散生皮刺

分布：原产我国东北、华北及西北，生于向阳山坡或灌丛中。现栽培广泛。



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| 科属：蔷薇科绣线菊属                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 学名： <i>Spiraea japonica</i> | 别名：粉花绣线菊 |
| <div><div><div>日本绣线菊</div><div><p><b>形态：</b>落叶小灌木，丛生。枝开展。单叶互生，卵状披针形至披针形，边缘具缺刻状重锯齿，叶面散生细毛，叶背略带白粉。复伞房花序，生于枝端，花粉红色或胭脂红。蓇葖果，卵状椭圆形。花期6月，果期8 ~ 9月。</p><p><b>习性：</b>喜光，略耐阴，适应性强，耐寒、耐旱、耐瘠薄。对土壤要求不严，在湿润、肥沃土壤生长旺盛。</p><p><b>应用：</b>常作花篱，或成片配植于草坪、路边、花径，或丛植庭院一隅。</p></div></div><div><p>边缘具缺刻状重锯齿</p></div><div><p>分布：原产日本和朝鲜。我国栽培广泛，本种易变异。</p></div></div> |                             |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 科属：茜草科栀子花属                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 学名： <i>Gardenia jasminoides</i> | 别名：山栀子、黄栀、水横枝 |
| <div><div><div>果实卵形</div><div><div>栀子</div><div><p><b>形态：</b>常绿灌木或小乔木，株高1 ~ 2米。枝丛生，叶对生或3叶轮生，倒卵状长椭圆形，革质而有光泽，全缘。花单生枝顶或叶腋，白色、浓香，花谢前变为黄色，花冠高脚碟状，花期6 ~ 8月。果实卵形，橙黄色，果熟期10月。</p><p><b>习性：</b>喜温暖、湿润气候，不耐寒，喜光亦耐阴。喜排水良好、疏松、肥沃的酸性土壤。生长适温为20℃ ~ 25℃。</p><p><b>应用：</b>① 对二氧化硫有抗性，适于庭园池畔、阶前、路旁栽植，或群植、孤植，或列植，也是点缀花坛的好材料。② 成熟的果实可提取栀子黄色素，用作染料；花可提取芳香浸膏，用于化妆品行业。③ 果实、花、叶、根均入药。</p></div></div><div><p>花白色</p></div><div></div><div><p>分布：原产我国长江流域及其以南各省区，生于旷野、丘陵、山地、溪畔的灌丛或林中。</p></div></div></div> |                                 |               |



|            |                                                        |              |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 科属：茜草科 梔子属 | 学名： <i>Gardenia jasminoides</i> var. <i>fortuniana</i> | 别名：重瓣梔子花、水梔花 |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------|

白蟾

**形态：**常绿灌木。叶对生或两叶轮生，倒卵形，全缘，顶端圆，叶面暗绿色而有光泽。花大、白色，腋生或顶生，重瓣极香，春夏之间盛开，一般不结实。



**习性：**喜温暖湿润的环境，忌强烈阳光直晒，耐寒性差。适宜于疏松肥沃、排水良好的酸性土壤中生长。

**应用：**盆栽观赏，也可地植用于布置庭院的花丛及花坛，地栽丛植或孤植都可修剪成圆球形，而带状种植，可修剪成绿篱。

分布：原产我国长江流域以南各省区。日本也有分布，我国栽培广泛。


|             |                            |               |
|-------------|----------------------------|---------------|
| 科属：茜草科 龙船花属 | 学名： <i>Ixora chinensis</i> | 别名：英丹、英丹花、木绣球 |
|-------------|----------------------------|---------------|

龙船花

**形态：**常绿小灌木，株高1 ~ 2米，全株无毛。叶对生，薄革质，披针形，有极短的柄。聚伞花序顶生，花朵密集，花细长高脚碟状，花冠红色或橙黄色；花期5 ~ 11月。浆果近球形，熟时红黑色。

**习性：**喜温暖高湿环境，宜半阴，不耐寒，忌干旱干燥，不耐水湿和强光。适宜肥沃疏松、排水良好的酸性土壤。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**庭院、宾馆、风景区布置，也可盆栽，摆设于窗台、阳台和客室观赏。



分布：原产我国南部地区和马来西亚等地，生于海拔200 ~ 800米山地灌丛中及疏林下。



|            |                             |                 |
|------------|-----------------------------|-----------------|
| 科属：茜草科六月雪属 | 学名： <i>Serissa japonica</i> | 别名：满天星、碎叶冬青、白马骨 |
|------------|-----------------------------|-----------------|

# 六月雪

**形态：**常绿或半常绿丛生灌木，株高不到1米。叶对生或成簇生状，卵形或狭椭圆形，全缘。花单生或多朵聚生，花冠漏斗状，花白色。花期5 ~ 6月，果期8 ~ 9月。常见栽培的有金边六月雪和银边六月雪。

**习性：**喜温湿，耐阴、耐寒，怕积水，畏烈日。对土壤要求不严，微酸性或中性土壤均能适应。



**应用：**宜作花坛、花篱，还可作花境配植；也可作盆栽观赏，或作盆景材料。

花白色



银边六月雪

分布：原产我国长江流域以南各省，生于河溪边或丘陵的杂木林内。日本也有分布。

|           |                                                |         |
|-----------|------------------------------------------------|---------|
| 科属：芸香科茵芋属 | 学名： <i>Skimmia japonica</i> cv. <i>Rubella</i> | 别名：金红茵芋 |
|-----------|------------------------------------------------|---------|

# 鲁贝拉茵芋

**形态：**常绿灌木，株高约30 ~ 60厘米。叶互生，聚生于枝条顶端，椭圆形或长椭圆形披针状，叶端锐，叶基渐狭，全缘。聚伞状圆锥花序，顶生；花白色，具芳香。浆果状核果，矩圆形至卵状矩圆形，红色。

**习性：**喜温暖湿润气候。要求疏松、肥沃、排水良好的壤土。

**应用：**多用于窗前、坡地及路旁栽植，也可配置于林地或草坪边缘，还可作盆景和插花花材。



叶端锐

分布：原产我国、日本等地，多生于高山林下。本种为园艺种。



科属：芸香科橘桔属

学名： *Citrus medica* var. *sarcodactylis*

别名：佛手柑、五指柑、佛手香椽

佛手

**形态：**常绿小乔木或灌木，株高可达2米。老干灰褐色，幼枝绿色带刺。叶互生，椭圆形，呈薄革质，先端钝圆，边缘有波纹状锯齿。花为总状花序，花单生或簇生于叶腋，白色，边缘具紫晕，具芳香。果实卵状或长圆形，外形不整齐，淡黄至黄褐色，老熟后呈古铜色，果肉坚硬而木质化。果熟10 ~ 11月。凡握指合拳者称“拳佛手”，而伸指展开者称“开佛手”。

**习性：**喜温暖而湿润的气候，喜光照充足、通风良好，不耐寒。喜肥沃、疏松、富含有机质的酸性沙质壤土。生长适温为20℃ ~ 28℃。

**应用：**① 名贵的室内观果植物，可盆栽置于室内的窗台、案几以装饰点缀，果熟期时盆栽置于室内，可长久散发出幽香。② 佛手入药，有理气、化痰的功效。

分布：原产我国华南、东南热带地区。长江以南地区常见栽培。



科属：芸香科九里香属

学名： *Murraya paniculata*

别名：千里香、月橘、木万年青

九里香

**形态：**常绿灌木或小乔木，盆栽株高1 ~ 2米。多分枝，直立向上生长。奇数羽状复叶，互生，小叶卵形、倒卵形至近菱形，全缘。聚散花序，顶生或生于枝条上部的叶腋内，有花数朵，白色极芳香。浆果近球形，肉质红色。花期5 ~ 8月。

**习性：**喜气候温热，不耐寒，阳光充足，也耐半阴，稍耐干旱，忌积涝。以疏松、肥沃、含大量腐殖质、通透性能强的酸性土为佳。生长适温为20℃ ~ 32℃。

**应用：**① 园林应用广泛，多植于园路边、山石旁或庭院中；可盆栽观赏，也是作盆景优良材料。② 根、叶入药，具有行气、活血、散瘀、止痛、解毒等作用。

浆果红色



奇数羽状复叶

花白色极芳香



分布：原产亚洲热带及亚热带地区，生于低丘陵或海拔高的山地疏林或密林中。



|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| 科属：瓶子草科瓶子草属 | 学名： <i>Sarracenia purpurea</i> |
|-------------|--------------------------------|

瓶子草



叶丛莲座状

圆筒状，叶中具倒向毛



**形态：**多年生食虫草本，具根茎。叶丛莲座状，叶常绿，粗糙，圆筒状，叶中具倒向毛，使昆虫能进不能出。花葶直立，花单生，下垂，紫或绿紫色；花期4 ~ 5月。

**习性：**喜温暖，半耐寒，要求较高的湿度，适宜在半阴、避风的环境中生长。以保水、排水良好的泥炭土为佳。生长适温为20℃ ~ 32℃。

**应用：**适合盆栽观赏或垂吊观赏。

分布：原产西欧、北美和墨西哥等地。我国南方有栽培。

|            |                               |               |
|------------|-------------------------------|---------------|
| 科属：三白草科蕺菜属 | 学名： <i>Houttuynia cordata</i> | 别名：蕺菜、狗贴耳、侧耳根 |
|------------|-------------------------------|---------------|

鱼腥草

**形态：**多年生草本，株高约30 ~ 60厘米。叶薄纸质，具腺点，卵形或阔卵形，顶端短渐尖，基部心形。穗状花序在枝顶端与叶互生，总苞片4枚，白色，花期5 ~ 7月。蒴果卵圆形，顶端开裂，果期7 ~ 10月。

**习性：**喜温暖、潮湿环境，半阴环境较佳，忌强光。较耐寒，忌干旱，以肥沃的沙质壤土或富含腐殖质壤土生长最佳。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**① 适合庭院栽植，也可布置药用植物园，民间常作蔬菜食用或用于调味。② 全株入药，具有清热、解毒、利水的功效。



基部心形



顶端短渐尖

总苞片4枚，白色

分布：原产我国，分布广泛，亚洲东部和东南部广布，生于沟边、溪边、林下湿地及荫蔽的草丛中。



科属：虎耳草科虎耳草属

学名： *Saxifraga stolonifera*

别名：金丝荷叶、吊金钱

## 虎耳草

**形态：**常绿草本。有细长的匍匐茎，株高10 ~ 50厘米。全株被毛。单叶，基部丛生，具长柄，圆形或肾形，表面深绿色，沿脉具白色斑纹，叶缘具疏生锐齿，叶背紫红色，密生小球形细点。花白色，具黄斑或紫斑；花期5 ~ 6月。蒴果卵圆形。

**习性：**喜阴湿凉爽环境，较耐寒。以疏松而排水良好的土壤中生长为佳。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**①盆栽观叶，或栽培于园林荫蔽的阴湿之地，也可用于布置山水盆景。②全草入药，具有祛风清热、凉血解毒的功效。



具黄斑或紫斑

花白色

叶缘具疏生锐齿

分布：原产我国及日本，生于林下、灌丛、草甸及阴湿的岩隙间。我国栽培普遍。

科属：虎耳草科绣球属

学名： *Hydrangea macrophylla*

别名：绣球、草绣球、紫阳花

## 八仙花

**形态：**落叶灌木。小枝粗壮，皮孔明显。叶大而稍厚，对生，倒卵形，边缘有粗锯齿，叶面鲜绿色，叶背黄绿色，叶柄粗壮。伞房花序，花全部不孕，整朵花呈球状。花色多变，初时白色，渐转蓝色或粉红色。花期4 ~ 8月。

**习性：**喜温暖湿润环境，不耐旱、不耐寒，忌烈日暴晒，不耐盐碱、不耐水涝。喜肥沃而排水良好的疏松土壤，花色因土壤的酸碱度而不同：土壤酸性开蓝色花，碱性则为红色。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**①盆栽室内装饰，点缀窗台、阳台和客室；也可配置于稀疏的树荫下及林荫道旁。②花及叶含有八仙花甙，水解后产生八仙花醇，具有清热抗疟的功效。



边缘有粗锯齿

分布：原产我国和日本，生于海拔380 ~ 1700米山谷溪边及山顶疏林中。



|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 科属：玄参科假面花属 | 学名： <i>Alonsoa warscewiczii</i> |
|------------|---------------------------------|

花红色



茎细长，红色

# 心叶假面花

**形态：**多年生草本，一般作一年生栽培，株高30 ~ 60厘米。茎细长，具分枝，红色。叶卵形，具锯齿，绿色。花红色，花期夏秋。

**习性：**喜光照，喜温暖、凉爽的气候条件，较耐寒，可忍受近0℃的低温。对土质要求不严，以排水良好、肥沃的壤土为佳。



**应用：**花色艳丽，小巧可爱，适宜植于花坛、花台、花境或作背景材料，还可植于林缘下，也是庭院绿化美化及盆栽欣赏的佳品。

分布：原产秘鲁。我国引种栽培。

|            |                              |                |
|------------|------------------------------|----------------|
| 科属：玄参科金鱼草属 | 学名： <i>Antirrhinum majus</i> | 别名：龙口花、龙头花、洋彩雀 |
|------------|------------------------------|----------------|

# 金鱼草



**形态：**多年生草本，株高20 ~ 70厘米。茎挺拔直立，下部叶片对生，上部互生，叶片长圆状披针形。总状花序顶生，花冠二唇瓣，基部膨大，有火红、金黄、艳粉、纯白和复色等色。花期5 ~ 9月。

**习性：**喜阳光充足，也耐半阴，喜凉爽气候，较耐寒，不耐热。要求排水良好的肥沃土壤，较耐

总状花序顶生



碱性。生长适温为10℃ ~ 22℃。

**应用：**盆栽观赏，也可作为花坛和花境材料，高型品种可作切花和背景材料，北方庭园中常见栽培。

花冠二唇瓣



分布：原产地中海一带。我国南北广泛栽培。



科属：玄参科蒲包花属

学名： *Calceolaria crenatiflora*

别名：荷包花



叶卵形，有皱纹

## 蒲包花

**形态：**一年生草本，株高约50厘米。茎叶被细茸毛。叶丛生，卵形，有皱纹。花伞形着生，花具二唇花冠，下唇发达，形似荷包，有淡黄、深黄、淡红、鲜红、橙红等色，常嵌有褐色或红色斑点。

**习性：**长日性植物，喜凉爽、空气湿润、通风良好的环境，不耐严寒，畏高温。以肥沃、疏松和排水良好的微酸性沙质壤土为好。生长适温为15℃ ~ 20℃。

**应用：**盆栽摆放窗台、阳台或客室，也可地栽布置花坛。

分布：原产南美智利。我国栽培广泛。



|            |                                  |        |
|------------|----------------------------------|--------|
| 科属：玄参科吊钟柳属 | 学名： <i>Penstemon campanulatu</i> | 别名：钓钟柳 |
|------------|----------------------------------|--------|



呈圆锥花序



花冠管状

## 吊钟柳

**形态：**株高约60厘米。叶披针形。花单生或簇生于总梗或叶腋，呈圆锥花序，花有紫、玫瑰红、紫红或白等色。

**习性：**喜阳光充足、湿润、通风良好的环境，不耐寒，忌干燥。要求疏松、肥沃、排水良好的弱碱性土壤。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**盆栽观赏，也可用于配置花坛、花境。

分布：原产墨西哥及危地马拉。我国引进栽培。

|            |                                    |                |
|------------|------------------------------------|----------------|
| 科属：玄参科炮仗竹属 | 学名： <i>Russelia equisetiformis</i> | 别名：爆竹花、爆仗花、吉祥草 |
|------------|------------------------------------|----------------|

## 炮仗竹



花小，筒状，红色

**形态：**常绿亚灌木，株高1米左右。叶对生或轮生，狭披针形或线形。总状花序，花小，筒状，长约3厘米，红色。花期6 ~ 10月。



**习性：**喜高温高湿及阳光充足的环境，较耐荫蔽，不耐寒、忌干旱。喜疏松肥沃的土壤。生长适合温15℃ ~ 22℃。

**应用：**花形似爆竹，是花台、花坛及居家阳台理想的绿化植物，也适合盆栽观赏。

分布：原产墨西哥及中美洲。我国各地均有栽培。



|            |                                 |             |
|------------|---------------------------------|-------------|
| 科属：茄科鸳鸯茉莉属 | 学名： <i>Brunfelsia acuminata</i> | 别名：番茉莉、双色茉莉 |
|------------|---------------------------------|-------------|

鸳鸯茉莉

**形态：**多年生常绿灌木，植株高0.7 ~ 1.5米，多分枝。单叶互生，长披针形，全缘，纸质，叶缘略波皱。花单生或2 ~ 3朵簇生于枝顶，高脚碟状花，初开时蓝色，后转为白色；芳香。花期5 ~ 11月。



**习性：**喜温暖、湿润、光照充足的环境，耐半阴，耐干旱，耐瘠薄，忌涝，畏寒冷。喜疏松肥沃、排水良好的微酸性砂壤土。生长适温为18℃ ~ 30℃。

**应用：**适用于小区、庭院、公园等点缀或作花篱，亦可盆栽观赏。



|         |                |
|---------|----------------|
| 分布：原产美洲 | 热带地区。我国南北栽培广泛。 |
|---------|----------------|

|          |                                                 |                        |
|----------|-------------------------------------------------|------------------------|
| 科属：茄科辣椒属 | 学名： <i>Capsicum annuum</i> var. <i>conoides</i> | 别名：指天椒、彩色椒、朝天椒、佛手椒、五色椒 |
|----------|-------------------------------------------------|------------------------|

观赏辣椒

**形态：**多年生草本，常作一年生栽培，株高30 ~ 60厘米。茎半木质化，分枝多。单叶互生，卵状或卵状披针形。花单生叶腋或簇生枝梢顶端，花小、色白。浆果直立，小而尖，指形、圆锥形或球形，成熟时有白、黄、橙、红、紫等色，有光泽。花期7月至霜降，果熟期8 ~ 10月。

**习性：**喜温热、光照充足的干燥环境，不耐寒。在潮湿肥沃、疏松、富含腐殖质的土壤中生长良好。生长适温为15℃ ~ 30℃。

**应用：**多用于中小型盆栽，作为观果植物陈设于客厅、卧室或厨房，也可植于花坛。



|                     |
|---------------------|
| 分布：原产美洲热带。我国南北栽培广泛。 |
|---------------------|



|           |                                |          |
|-----------|--------------------------------|----------|
| 科属：茄科夜香树属 | 学名： <i>Cestrum aurantiacum</i> | 别名：黄花夜香树 |
|-----------|--------------------------------|----------|

# 黄瓶子花

**形态：**灌木。叶卵形或阔楔形，全缘。总状聚伞花序顶生或腋生，花近无梗，花萼钟状，花冠筒状漏斗形，开展或向外反折，具芳香。浆果梨状。花期春季至秋季。



**习性：**喜光照及温暖、湿润的环境条件，较耐阴，不耐寒。不择土壤，以疏松、排水良好、肥沃的沙质土壤为宜。

**应用：**可用于公园、庭园、小区绿化，也可植于庭院或盆栽观赏。



分布：原产南美洲。我国广东、台湾、海南等地引进栽培。

|           |                              |             |
|-----------|------------------------------|-------------|
| 科属：茄科夜香树属 | 学名： <i>Cestrum purpureum</i> | 别名：瓶子花、紫夜香花 |
|-----------|------------------------------|-------------|

# 紫瓶儿花

**形态：**绿灌木。叶互生，卵状披针形。花紫红色，腋生或顶生，花冠长瓶形。花期夏秋，南方秋冬也可见花。

**习性：**喜温暖，喜光照，不耐寒。对土壤要求不严，以疏松、肥沃的沙质壤土为佳。

**应用：**香气浓郁，花形优美，观赏性强，可植于公园、庭院及池畔、溪边、亭台一隅；也可盆栽观赏。



分布：原产热带美洲。我国广东、云南、台湾等地有栽培。



|           |                            |            |
|-----------|----------------------------|------------|
| 科属：茄科矮牵牛属 | 学名： <i>Petunia hybrida</i> | 别名：碧冬茄、番薯花 |
|-----------|----------------------------|------------|

矮牵牛

**形态：**多年生草本，植株高15 ~ 40厘米。茎直立或横走，多分枝。上部叶对生，中下部互生，椭圆形，先端尖，深绿色，全缘。花单生于叶腋或枝顶，花冠漏斗状，有白色、红色、紫红色、蓝色和杂色，杂交种还具有香味；花期5 ~ 11月。蒴果卵形。



**习性：**喜阳光充足、温暖、湿润的气候条件，不耐高温，不耐寒，怕荫蔽，忌干旱也忌涝，忌瘠薄。喜疏松肥沃的微酸性土壤。生长适温为13℃ ~ 25℃。

**应用：**适宜花坛、花境栽培，亦可用于盆栽或悬吊栽培观赏。

分布：原产南美洲。我国栽培广泛，现栽培的均为园艺种。

|           |                            |        |
|-----------|----------------------------|--------|
| 科属：茄科金杯藤属 | 学名： <i>Solandra nitida</i> | 别名：金杯花 |
|-----------|----------------------------|--------|

金杯藤

**形态：**常绿藤本灌木。叶互生，长椭圆形，浓绿色。单花顶生，花冠大型，杯状，淡黄色。花期春、夏季。

**习性：**喜光照及温暖的环境，耐半阴，不耐寒。对土质要求不严，以富含腐殖质、疏松、排水良好的沙质壤土为佳。生长适温为18℃ ~ 25℃。

**应用：**优良的棚架植物，适合大型绿廊、阴棚及庭院栽植，也可盆栽。



叶长椭圆形

花淡黄色

分布：原产中美洲。我国台湾、广东有引种栽培。



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                              |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|----------------|
| 科属：梧桐科苹婆属                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 学名： <i>Sterculia nobilis</i> | 别名：富贵子、七姐果、凤眼果 |
| <div><div><div>叶倒卵状椭圆形</div><div></div></div><div><div>形态：落叶乔木，树干通直，高达20米，树皮褐色。单叶互生，倒卵状椭圆形。腋生圆锥花序、下垂，花杂性，无花瓣，花萼微带红晕，花期4 ~ 5月，8 ~ 9月可二次开花。蓇葖果卵形，果期9 ~ 10月。</div><div><div>习性：喜光，喜温暖湿润气候。在肥沃、排水良好的酸性、中性或钙质土壤均可生长，也较耐瘠薄。生长适温为22℃ ~ 30℃。</div><div><div>应用：① 多用做庭荫树或行道树。② 种子可食，味如栗子。</div></div></div></div></div> |  |                              |                |
| <div><div>分布：原产我国南部。印度、越南、印度尼西亚等地也有栽培。</div><div></div><div></div></div>                                                                                                                                                 |  |                              |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                              |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|-------------------|
| 科属：山茶科山茶属                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 学名： <i>Camellia japonica</i> | 别名：茶花、曼陀罗树、晚山茶、耐冬 |
| <div><div><div>山茶</div><div></div></div><div><div>形态：常绿灌木或小乔木，高10 ~ 15米。嫩枝无毛。叶互生，革质，卵形或椭圆形，边缘有锯齿，深绿色。花单生或2 ~ 3朵着生于枝梢顶端或叶腋间，花冠有红、粉红、白、玫瑰红、杂色等颜色及重瓣等品种；花期3 ~ 4月。</div><div><div>习性：喜温暖湿润环境，喜光，略耐半阴，忌强光，略耐寒。喜肥沃、湿润、排水良好的中性和微酸性土，不耐碱土。生长适温为18℃ ~ 25℃。</div><div><div>应用：① 盆栽观赏，用于装饰客厅、阳台等，也可丛植、散植于庭院、草坪边缘。② 花入药，具有止血功效。③ 种子可榨油，用于工业。</div></div></div></div></div> |  |                              |                   |
| <div><div><div>分布：原产我国东部和日本。现四川、台湾、山东、江西等地有野生种，国内栽培广泛。</div><div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                              |                   |



科属：山茶科山茶属

学名： *Camellia nitidissima*

# 金花茶

**形态：**灌木，株高2 ~ 3米。叶革质，互生，长圆形或披针形，或倒披针形。叶先端尾状渐尖，基部楔形。花黄色，腋生，花瓣8 ~ 12片，近圆形。蒴果扁三角球形或四棱状扁球形。花期11 ~ 12月。

**习性：**喜温暖、湿润及半阴的环境条件，忌强光，不耐寒。以疏松、排水良好、肥沃的微酸性土壤为佳。生长适温为20℃ ~ 25℃。

**应用：**花色金黄，为茶族中的珍品，具有较高的观赏价值，常栽培于公园、专类园，也可盆栽观赏。



分布：原产我国广西。越南也有分布，我国南方公园中有种植。



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 科属：瑞香科瑞香属                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 学名： <i>Daphne odora</i> f. <i>marginata</i> | 别名：瑞兰、睡香、奇香花、蓬莱花、风流树 |
| <div><div><p>花紫红色</p></div><div><p>开放后筒内乳白色</p></div><div><h3>金边瑞香</h3><p><b>形态：</b>多年生常绿灌木，株高60 ~ 90厘米。单叶互生，边缘有金黄色镶边，长椭圆形至倒披针形，先端钝，全缘，叶面光滑而厚、深绿革质，两面均无毛，叶柄粗短。顶生头状花序，花被筒状，花紫红色，开放后筒内乳白色。</p><p><b>习性：</b>喜阴凉通风环境，不耐严寒，忌强光，怕积水。要求排水良好，富含腐殖质的微酸性土壤。生长适温为15℃ ~ 25℃。</p><p><b>应用：</b>① 我国的传统名花，株型优美，具芳香，为室内优良盆花，可植于庭院或置于室内观赏。② 根入药，茎皮纤维用作造纸原料。</p></div><div></div><div>分布：原产我国长江流域南部。现我国栽培广泛。</div></div> |                                             |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 科属：旱金莲科旱金莲属                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 学名： <i>Tropaeolum majus</i> | 别名：金莲花、旱荷、旱莲花 |
| <div><div><h3>旱金莲</h3><p><b>形态：</b>多年生蔓性草本。茎肉质中空，单叶互生，具长叶柄，盾状圆形，全缘波状。花梗细长，自叶腋抽生，单花顶生，有黄、红、橙、紫、乳白及复色，还有花叶种。花期7 ~ 9月。</p><p><b>习性：</b>喜温暖、湿润、阳光充足的环境，忌高温酷热，不耐涝、不耐寒。需疏松、肥沃、通透性强的土壤。生长适温为18℃ ~ 24℃。</p><p><b>应用：</b>盆栽可供室内观赏或装饰阳台、窗台，也可植于林缘，篱边、墙隅灌丛边，也适合用于花境。</p></div><div><p>盾状圆形</p><p>黄色花</p></div><div></div><div>分布：原产中、南美洲。我国栽培普遍，在有些地区逸为野生。</div></div> |                             |               |



|            |                                 |        |
|------------|---------------------------------|--------|
| 科属：伞形科天胡荽属 | 学名： <i>Hydrocotyle vulgaris</i> | 别名：铜钱草 |
|------------|---------------------------------|--------|

香菇草

**形态：**多年生水草，茎细长，节处生根。叶圆形或肾形，具长柄，全缘。花冠钟状黄色。蒴果近球形。花期4月，果期7月。



**习性：**适应性强，性喜光照，喜温暖，耐阴、耐湿，稍耐旱，栽培以半日照为佳。对土质要求不严，以保水性良好的壤土为佳。生长适温为22℃ ~ 30℃。

**应用：**适作水池或湿地浅水处栽培，也可植于花盆观赏，还可用于水族箱。

分布：原产南美洲。我国引进栽培。

|            |                           |            |
|------------|---------------------------|------------|
| 科属：蕁麻科冷水花属 | 学名： <i>Pilea cadierei</i> | 别名：白雪草、透白草 |
|------------|---------------------------|------------|

冷水花

**形态：**多年生常绿草本，株高15 ~ 40厘米。茎多汁，绿色。叶对生，卵状椭圆形，叶缘上部具疏钝锯齿。叶脉间有4条大小不同的银白色纵向宽条纹，叶背浅绿色，叶缘有浅齿。花序自叶腋间抽生，顶生聚伞花序，小花白色。

**习性：**喜温暖、湿润和半阴的环境，避免阳光直射，有较强的耐阴性，不耐旱，有一定的耐寒能力。喜疏松肥沃、富含有机质的壤土。

**应用：**盆栽和吊盆栽培，可供窗台、几桌和案头陈设，也可用来装饰会议桌和餐桌；也可用作地被植物。

叶脉间有4条大小不同的银白色纵向宽条纹



叶缘上部具疏钝锯齿

分布：原产印度。我国栽培广泛。



|            |                                  |          |
|------------|----------------------------------|----------|
| 科属：荨麻科冷水花属 | 学名： <i>Pilea nummulariifolia</i> | 别名：泡叶冷水花 |
|------------|----------------------------------|----------|

## 圆叶冷水花

**形态：**多年生常绿草本，匍匐蔓生。分枝细而多，全株被短而细的绒毛。叶对生，圆形，质薄，叶缘具半圆形锯齿，脉间叶肉凸起。

**习性：**喜温暖、湿润、半阴的环境，忌直射光，具有一定的耐旱力，耐寒性不强。以富含腐殖质的壤土最好。生长适温为20℃～28℃。

**应用：**盆栽，适合案几、办公桌摆放观赏，也适宜庭院或园林中应用，宜片植。



分布：原产哥斯达黎加、哥伦比亚。我国南方引进栽培。

|            |                                 |            |
|------------|---------------------------------|------------|
| 科属：马鞭草科紫珠属 | 学名： <i>Callicarpa formosana</i> | 别名：粗糠仔、老蟹眼 |
|------------|---------------------------------|------------|

## 杜虹花



**形态：**灌木，株高1～3米，枝条被茸毛。叶卵状椭圆形或椭圆形，对生，叶柄短，边缘有细锯齿，先端尖。聚伞花序腋生，花多数，小，紫色，被绒毛。果紫色，圆形。花期5～7月，果期8～11月。

**习性：**喜光，较耐寒，耐阴。对土质要求不严，以肥沃湿润、疏松土壤为佳。生长适温为20℃～30℃。

**应用：**① 园林绿化，适合群植、单植，也可用于庭园绿化及盆栽观赏。② 可作切花。③ 叶入药，具有散瘀消肿、止血镇痛的功效；根可治风湿痛、扭挫伤、喉炎等症。



分布：原产我国南方部分省市，生于海拔1590米以下的平地、山坡及溪边的林中或灌丛中。



科属：马鞭草科赧桐属

学名：*Clerodendrum thomsonae*

别名：白萼赧桐、珍珠宝莲

## 龙吐珠

**形态：**多年生常绿藤本，株高2 ~ 5米。叶对生，卵形，先端尖，全缘。聚伞形花序腋生，萼片白色较大、花冠上部深红色，雄蕊与花柱同时伸出花冠外。核果球形，外果皮棕黑色。花期3 ~ 5月。

**习性：**喜温暖湿润、阳光充足的环境，不耐寒。要求肥沃、排水良好的中性土壤。生长适温为18℃ ~ 24℃。

**应用：**盆栽观赏，也可用于长廊、棚架及花坛、花台、花境等，极适合庭院栽培观赏。



萼片白色较大

花冠上部深红色



叶卵形，先端尖

核果球形，外果皮棕黑色

分布：原产热带非洲西部。我国南方栽培普遍。



|            |                                   |              |
|------------|-----------------------------------|--------------|
| 科属：马鞭草科赧桐属 | 学名： <i>Clerodendrum japonicum</i> | 别名：状元红、贞桐、朱桐 |
|------------|-----------------------------------|--------------|

赧桐

**形态：**落叶灌木，高1 ~ 4米。叶大型，心形或圆卵形，顶端尖或渐尖，基部心形，具锯齿。二歧聚伞花序组成顶生、大而开展的圆锥花序，花冠红色，稀白色。果实椭圆状球形，绿色或蓝黑色。花果期5 ~ 11月。

**习性：**喜温暖湿润，喜半阴，较耐阴，耐湿也耐旱。一般土壤均可良好生长。生长适温为22℃ ~ 30℃。

**应用：**❶ 花艳如火，观赏性强，可植于假山石旁、林缘下，或与其他植物配植，也适合庭院、办公场所栽培。❷ 全株入药，具有祛风湿、消肿散瘀的功效。



分布：原产印度，生于低海拔林缘或灌木丛中。我国南部各省及日本均有分布。

|             |                                            |        |
|-------------|--------------------------------------------|--------|
| 科属：马鞭草科假连翘属 | 学名： <i>Duranta repens</i> cv. Dwarf Yellow | 别名：黄金叶 |
|-------------|--------------------------------------------|--------|

金叶假连翘

**形态：**常绿灌木，株高20 ~ 60厘米，枝下垂或平展。叶对生，叶长卵圆形，中部以上有粗齿，叶色金黄至黄绿。花蓝色或淡蓝紫色，总状花序呈圆锥状；花期5 ~ 10月。核果橙黄色，有光泽。

**习性：**喜高温全日照，喜好强光，能耐半阴，也耐旱。以排水良好的肥沃壤土或沙质壤土为宜。生长适温为22℃ ~ 30℃。

**应用：**园林中常用作绿篱，也可用于花廊，或攀附于花架之上，还可盆栽观赏。



分布：原产墨西哥至巴西。我国南方园林应用普遍。



科属：马鞭草科马缨丹属

学名： *Lantana camara*

别名：马缨丹

## 五色梅

**形态：**落叶灌木，株高1 ~ 2米。茎枝呈四方形。单叶对生，卵形或卵状长圆形，叶缘有钝齿。头状花序腋生于枝梢上部，花冠筒状细长，有黄色、橙黄色、粉红色和深红色。核果圆球形，成熟时紫黑色。花期6 ~ 10月。

**习性：**喜高温高湿，喜光，耐干旱，抗寒力差。对土壤要求不严，一般土壤均可良好生长。生长适温为20℃ ~ 30℃。

**应用：**盆栽可置于门前、厅堂、居室等处观赏，也可组成花坛。



分布：原产美洲热带地区，在华南等地已逸为野生。



|             |                            |                        |
|-------------|----------------------------|------------------------|
| 科属：马鞭草科马鞭草属 | 学名： <i>Verbena hybrida</i> | 别名：草五色梅、铺地马鞭草、四季绣球、美人樱 |
|-------------|----------------------------|------------------------|

## 美女樱



穗状花序

**形态：**多年生草本，常作一年生栽培。叶对生，长圆形，边缘有明显的锯齿。穗状花序顶生，小花多数密集，呈伞房状，花冠筒状，花色有蓝、紫、粉红、大红、白、玫瑰红等。花期4 ~ 11月。小坚果，短棒状。常见栽培的有细叶美女樱。

**习性：**喜温暖湿润气候，喜阳，不耐干旱。以在疏松肥沃、较湿润的中性土壤生长较好。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**盆栽和吊盆栽培，常用来装饰窗台、阳台和走廊，也可用于花坛、花台、园路和花镜布置。



分布：原产巴西、秘鲁、乌拉圭等地。我国栽培广泛。

|           |                           |                    |
|-----------|---------------------------|--------------------|
| 科属：堇菜科堇菜属 | 学名： <i>Viola tricolor</i> | 别名：蝴蝶花、蝴蝶梅、鬼脸花、猫儿脸 |
|-----------|---------------------------|--------------------|

## 三色堇

花大，花瓣近圆形



**形态：**一二年生草本，株高约30厘米，多分枝。基生叶有长柄，叶片近圆心形；茎生叶卵状长圆形或宽披针形，边缘有圆钝锯齿；托叶大，基部羽状深裂。单花生于花梗顶端，花大，花瓣近圆形，假面状，花色有紫、蓝、黄、白等色。蒴果椭圆形，种子倒卵形。花期4 ~ 7月，果期5 ~ 8月。



叶边缘有圆钝锯齿

**习性：**喜凉爽湿润的气候，喜阳光充足、通风的环境，较耐寒、略耐半阴，忌积水，怕暑热。喜肥沃、疏松、透气、排水良好的壤土。生长适温为15℃ ~ 25℃。

**应用：**布置春季花坛的主要花卉之一，也适合丛植、片植或用于花镜，也可盆植作为室内装饰。

分布：原产欧洲北部。我国南北栽培普遍。



|            |                                        |            |
|------------|----------------------------------------|------------|
| 科属：葡萄科爬山虎属 | 学名： <i>Parthenocissus tricuspidata</i> | 别名：爬墙虎、爬山虎 |
|------------|----------------------------------------|------------|

地锦

**形态：**落叶大藤本。茎长达30米以上。茎卷须短而多分枝，枝端有吸盘。单叶，叶广卵形，在短枝上对生，长枝上互生，叶缘疏生锯齿。花小，聚伞花序，位于短枝上的两叶之间。浆果，小球形，蓝色。花期6～7月，果熟期9月。

**习性：**适应性强，喜阴湿，耐寒，耐阴，耐干旱瘠薄，在水分充足的向阳处也能生长良好。对土壤适应性很强。生长适温为16℃～28℃。

**应用：**①常作为攀缘植物用于墙面绿化和建筑物美化装饰，尤其适宜于高层建筑物。  
②根入药，具祛瘀消肿的功效。



叶广卵形

叶缘疏生锯齿

分布：原产我国，生于海拔150～1200米的山坡崖壁或灌丛中。朝鲜、日本也有分布。

|          |                            |            |
|----------|----------------------------|------------|
| 科属：姜科山姜属 | 学名： <i>Alpinia galanga</i> | 别名：大高良姜、暹姜 |
|----------|----------------------------|------------|

红豆蔻

**形态：**多年生草本，株高可达2米。具块状根茎，稍具香气。叶长圆形或披针形，顶端渐尖或短尖，基部渐狭。圆锥花序密生多花，花绿白色。蒴果长圆形，熟时棕色。花期5～8月，果期9～11月。

**习性：**喜温暖光照充足的半阴环境，耐阴湿。以疏松、排水良好的土壤为宜。

**应用：**①适合公园、小区、校园等地栽植，也适合庭院栽培观赏。  
②果实入药，具有去湿、散寒、消食的功效；根茎也入药，具有散寒、暖胃、止痛的功效。



圆锥花序

花绿白色



分布：原产我国台湾、广东、广西及云南等省区，生于海拔100～1300米的山野沟谷阴湿林下或灌丛、草丛中。



|          |                              |        |
|----------|------------------------------|--------|
| 科属：姜科山姜属 | 学名： <i>Alpinia oxyphylla</i> | 别名：益智子 |
|----------|------------------------------|--------|

益智



蒴果

叶披针形，顶端渐狭

**形态：**多年生常绿草本，株高1 ~ 3米。叶披针形，顶端渐狭，具尾尖，基部近圆形。总状花序，蕾期花序包于帽状总苞片中，花时脱落。花冠白色，唇瓣倒卵形，粉白色具红色脉纹。蒴果。花期3 ~ 5月，果期4 ~ 9月。

**习性：**喜温暖、湿润的环境，喜光照，但夏季应适当遮阴。对土质无特殊要求，以疏松、肥沃、排水良好的沙质壤土为佳。

**应用：**① 适合公园、小区、校园等地栽植，也适合植于山石边、水边等地欣赏，也是庭院栽培优良观花观叶植物。② 果实入药，具有益脾胃、理元气、补肾虚的功效。



帽状总苞片

唇瓣倒卵形，粉白色具红色脉纹

分布：广东、海南及广西等地，生于林下阴湿处或栽培。

|           |                              |              |
|-----------|------------------------------|--------------|
| 科属：姜科火炬姜属 | 学名： <i>Etlingera elatior</i> | 别名：火炬姜、菲律宾蜡花 |
|-----------|------------------------------|--------------|

瓷玫瑰

**形态：**多年生宿根草本，株高3 ~ 6米，根状茎。叶互生，两行排列，叶片绿色，线形至椭圆形或椭圆状披针形。基生头状花序，圆锥形球果状，似火炬，花有深红、大红和粉红等。花期5 ~ 10月。

**习性：**喜阳光充足、高温多湿的环境，需要充足的阳光，也耐半阴。适合在微酸性且腐殖质丰富的沙质土中生长。生长适温为20℃ ~ 30℃。



头状花序，圆锥形球果状

**应用：**① 多用于公园或专类园中栽培，也适合盆栽及庭院栽培观赏。② 可作切花。



叶互生，两行排列

分布：原产地为热带非洲。我国海南、云南有栽培。



|          |                                 |            |
|----------|---------------------------------|------------|
| 科属：姜科姜花属 | 学名： <i>Hedychium coronarium</i> | 别名：蝴蝶花、蝴蝶姜 |
|----------|---------------------------------|------------|

姜花

**形态：**多年生草本，株高1 ~ 2米。地下有肥大的根茎。茎直立，叶无柄，叶片矩圆状或披针形，先端渐尖，绿色。穗状花序，花序由绿色苞片组成，花白色，蝴蝶形，芳香；花期夏季。



**习性：**喜高温多湿，耐半阴，不耐寒，忌干旱。以富含有机质的沙质壤土为佳。生长适温为22℃ ~ 30℃。

**应用：**①盆栽和切花的好材料，也可配植于公园、小区及庭院内。②花可提制浸膏，用于香精制作。③根茎入药，具有解表、散风寒的功效。



花白色，蝴蝶形

叶片矩圆状或披针形

分布：原产我国南部、西南部，生于林中或栽培。印度、马来西亚也有分布。

|          |                                   |         |
|----------|-----------------------------------|---------|
| 科属：姜科姜花属 | 学名： <i>Hedychium gardnerianum</i> | 别名：美丽姜花 |
|----------|-----------------------------------|---------|

金姜花

**形态：**多年生草本，株高1.5米左右。地下根茎发达，粗壮。叶片绿色，全缘，光滑，长椭圆状披针形，叶柄短，叶鞘绿色。穗状花序顶生，苞片绿色，卵形或倒卵形，先端圆形或渐尖，小花密生，边缘浅黄色，心部金黄色；花期6 ~ 10月。

**习性：**喜半阳环境，稍遮阴对生长有利，耐高温，耐寒。栽培土质以肥沃疏松、排水良好的壤土或沙质壤土最为适宜。生长适温为22℃ ~ 30℃。

**应用：**多用作切花，也可成片种植，条植、丛植于路边、庭院、溪边、假山石边。



分布：原产亚洲热带。印度和马来西亚的热带地区均有分布，我国有引进栽培。



笔画索引

一画

一丈红 137  
一叶兰 121  
一串红 108  
一品红 93

二画

丁香柿 87  
七里香 176  
七姐果 202  
九华 70  
九里香 159  
九里香 193  
九重葛 154  
二色藤 62  
人参花 172  
八月春 47  
八仙花 195  
八角金盘 38  
十八学士 18  
十字架 49

三画

万代兰 167  
万年竹 126  
万寿竹 126  
万寿菊 78  
三色堇 210  
三角花 154  
三角梅 154  
三药槟榔 169  
三裂蟛蜞菊 79  
也门铁 123  
也门铁树 123  
千日红 16  
千日粉火球花 16  
千日莲 70  
千日菊 77  
千叶莲 70  
千叶蓍 66  
千鸟花 160  
千岁兰 131  
千年木 125  
千年红 16  
千里香 193  
叉叶木 49  
土三七 74  
土里蜈蚣 122

夕颜 80  
大丁草 74  
大邓伯花 13  
大兰布麻 118  
大叶白掌 35  
大叶石蒜 17  
大叶红草 15  
大叶肉桂 109  
大叶紫薇 133  
大红芒毛苣苔 98  
大红花 139  
大丽花 72  
大花马齿苋 179  
大花老鸦嘴 13  
大花君子兰 17  
大花美人蕉 61  
大花桔梗 96  
大花紫薇 133  
大花翠雀 183  
大花蕙兰 162  
大还魂 82  
大岩桐 99  
大果木棉 54  
大罗伞 152  
大高良姜 211  
大理花 72  
大萍 33  
大蜀葵 137  
大藻 33  
女华 70  
女蕨 48  
子午莲 157  
小万寿菊 78  
小天蓝绣球 177  
小叶榕 147  
小苍兰 102  
小波斯菊 71  
小鱼尾葵 170  
小桃红 45  
小蚌花 66  
小黄花 157  
小黄果 132  
山石榴 90  
山苏花 43  
山矾花 23  
山梔子 190  
山牵牛 13  
山茶 202  
山草 121  
山桃草 160

山海带 124  
山猪怕 151  
山棕蕨 84  
山鹃 90  
山踯躅 90  
山攀花 176  
干枝梅 186  
广东狼毒 29  
广东象牙红 117  
广玉兰 136  
飞天蜈蚣 121  
马利筋 40  
马拉巴栗 54  
马缨丹 209  
马缨花 110  
马蹄香 25

四画

不夜城芦荟 120  
中华常春藤 39  
中国无忧花 119  
中国无忧树 119  
中国水仙 20  
中国兰花 162  
中国石竹 63  
中国凌霄 48  
中逢花 129  
丹若 181  
乌柿 87  
云片竹 121  
五色水仙 128  
五色草 105  
五色梅 209  
五色椒 199  
五指柑 193  
五稔 168  
五瓣梅 23  
仁丹草 107  
六月雪 192  
六出花 17  
六角荷 61  
凤仙花 45  
凤尾蕉 85  
凤凰木 115  
凤凰花 115  
凤眼果 202  
双飞蝴蝶 81  
双色茉莉 199  
双喜藤 25  
天竺牡丹 72

天竺葵 97  
天蒜 20  
太阳花 179  
太阳菊 68  
夫妻花 47  
孔雀竹芋 141  
孔雀肖竹芋 141  
孔雀豆 110  
孔雀树 115  
孔雀草 78  
巴巴多斯芦荟 120  
巴西千年木 124  
巴西铁 124  
巴西铁树 124  
开心果 113  
心叶假面花 196  
心叶蔓 41  
心叶蔓绿绒 32  
手树 38  
文心兰 164  
文竹 121  
文殊兰 18  
文殊兰 18  
文藤 25  
斗雪红 187  
无皮树 132  
无忧树 119  
日日春 23  
日日新 23  
日日樱 95  
日本绣线菊 190  
月下美人 56  
月月红 187  
月光花 80  
月兔耳 83  
月季 187  
月橘 193  
木万年青 193  
木兰 136  
木芍药 184  
木牡丹 139  
木芙蓉 138  
木笔 136  
木绣球 191  
木棉 53  
木犀 159  
木馒头 148  
木槿 140  
比利时杜鹃 88  
毛宝巾 154



毛凉伞 151  
毛萼口红花 98  
毛鹃 89  
气球果 41  
水木 150  
水仙 20  
水竹芋 143  
水芙蓉 33  
水芹花 157  
水梔花 191  
水浮莲 157  
水莲 33  
水莲蕉 143  
水横枝 190  
水薄荷 107  
火龙果 57  
火把果 187  
火把莲 128  
火杖 128  
火炬花 128  
火炬姜 212  
火星花 102  
火树 115  
火烧花 51  
火球花 16  
火球花 19  
火棘 187  
火焰木 51  
火焰花 119  
火焰树 51  
火鹤花 30  
爪哇三七草 74  
爪哇蒲桃 153  
牛心荔 24  
牛金茄 24  
王棱果 168  
瓦筒花 60  
贝壳花 107  
贝细工 76  
长生菊 69  
长芒杜英 87  
长寿花 82  
长春花 187  
长春花 23  
长春蔓 28  
长喙花生 111  
长葶鸢尾 103  
风信子 128  
风流树 204  
风铃扶桑 137  
风铃草 60  
风船唐棉 41  
风蝶草 62

## 五画

丛生鱼尾葵 170  
丛立椰子 169  
东洋桂花 94  
东洋菊 72  
丝素藤 36  
仙人果 57  
仙人指 59  
仙人扇 59  
仙人桃 59  
仙人荷花 81  
仙人掌 59  
仙人掌果 57  
仙龙达龙血树 126  
仙客来 179  
仙洞万年青 32  
仙密果 57  
兰 42  
兰屿肉桂 109  
兰草 162  
兰蕙 162  
加那利常春藤 38  
包米罂粟 172  
包袱花 61  
半支莲 179  
半年红 26  
卡特兰 161  
卡特利亚兰 161  
去蝶丽 81  
发财树 54  
台湾山苏花 43  
台湾肉桂 109  
叶子花 154  
四季秋海棠 46  
四季凌霄 52  
四季海棠 46  
四季绣球 210  
圣诞仙人掌 59  
圣诞伽蓝菜 82  
圣诞花 93  
圣保罗花 99  
对叶梅 79  
布纹球 93  
平安树 109  
末利花 158  
正榕 147  
玉树 80  
玉树珊瑚 95  
玉绣球 42  
玉蝉花 104  
瓜叶菊 70  
瓜栗 54  
生石花 14

电线莲 31  
白马骨 192  
白凤尾蕨 180  
白兰 134  
白兰花 134  
白网纹草 10  
白花石蒜 18  
白花油麻藤 118  
白狗花 25  
白狗蹄 25  
白桃花 160  
白绢草 65  
白菩提 83  
白雪草 205  
白雪姬 65  
白掌 34  
白棣棠 188  
白缅花 134  
白萼桐 207  
白蟾 191  
白蝴蝶 36  
白蝶花 160  
白鹤芋 34  
石兰 163  
石头花 14  
石竹 63  
石莲花 81  
石斛 163  
石斛兰 163  
石腊红 97  
石楠杜鹃 88  
石榴 181  
禾雀花 118  
立鹤花 12  
节节高 79  
节华 70  
鸟巢蕨 43  
龙口花 196  
龙牙花 115  
龙头花 196  
龙吐珠 207  
龙胆花 96  
龙船花 191

## 六画

亚马逊百合 19  
交剪草 101  
伞树 37  
再力花 143  
华北丁香 159  
华灰莉 132  
华胄兰 20  
印度榕 146  
印度橡皮树 146

合欢 110  
合果芋 36  
吉祥草 198  
吊兰 122  
吊兰花 163  
吊灯花 41  
吊竹兰 65  
吊竹草 65  
吊竹梅 65  
吊金钱 195  
吊金钱 41  
吊钟柳 198  
吊钟海棠 160  
向日葵 75  
地团花 186  
地棠花 186  
地锦 211  
地锦花 79  
地雷花 155  
多孔龟背竹 32  
多叶蓍 66  
多花蓼 178  
多鳞白桫欏 84  
夹竹桃 26  
仔宝 126  
安石榴 181  
安祖花 29  
尖叶杜英 87  
延命菊 68  
戎葵 137  
曲叶龙血树 125  
曲玉 14  
朱顶红 20  
朱砂根 152  
朱桐 208  
朱槿 139  
朱槿 140  
朱樱花 112  
朱蕉 123  
朱藤 119  
杂种虎头兰 162  
毕波罗树 148  
灯笼花 160  
灯笼海棠 160  
灰莉 132  
百日红 132  
百日红 133  
百日草 79  
百合竹 125  
百合花 129  
百合蒜 129  
百枝莲 20  
百结 159  
百般娇 172



米仔兰 145  
 米兰 145  
 红凤菊 74  
 红月见草 161  
 红毛毡 151  
 红火棒 128  
 红叶桑 91  
 红叶铁树 123  
 红头山肉桂 109  
 红头屿肉桂 109  
 红边竹蕉 125  
 红龙果 57  
 红龙草 15  
 红竹 123  
 红网纹草 10  
 红尾铁苋 90  
 红花继木 100  
 红花荷 100  
 红花楹 115  
 红苋草 15  
 红豆 110  
 红豆蔻 211  
 红鸡冠 15  
 红果子 152  
 红苞木 100  
 红苞芋 30  
 红苞荷 100  
 红点草 11  
 红绒球 112  
 红背竹芋 143  
 红背桂 94  
 红桑 91  
 红皱椒草 174  
 红皱藤 25  
 红继木 100  
 红艳蕉 61  
 红铜盘 152  
 红黄草 78  
 红掌 29  
 红楞 48  
 红紫木 94  
 红裹蕉 143  
 红鹤芋 30  
 网花苘麻 137  
 网格草 10  
 网球石蒜 19  
 网球花 19  
 羽叶薰衣草 106  
 老来娇 93  
 老虎 151  
 老虎芋 29  
 老蟹眼 206  
 肋杜鹃 154  
 芍药 183

血枫藤 118  
 血散薯 146  
 西瓜皮豆瓣绿 173  
 西瓜皮椒草 173  
 西洋白花菜 62  
 西洋红 108  
 西洋杜鹃 88  
 西洋蓍草 66  
 西洋樱草 180  
 西洋楼斗菜 182  
 西番莲 72  
 西番菊 78  
 西鹃 88  
 观音竹 171  
 观音莲 28  
 观赏桃 185  
 观赏辣椒 199  
 贞桐 208  
 阳桃 168

## 七画

两色芋 30  
 串珠草 83  
 丽春花 172  
 丽格海棠 46  
 伽蓝菜 82  
 何首乌 178  
 余容 183  
 佛手 193  
 佛手柑 193  
 佛手香橡 193  
 佛手椒 199  
 佛光红 151  
 佛肚树 95  
 佛桑 139  
 冷水花 205  
 君子兰 17  
 含笑 135  
 含笑梅 135  
 含羞草 118  
 寿客 70  
 寿星花 82  
 层云 57  
 库拉索芦荟 120  
 张氏紫葳 50  
 忍冬 62  
 忘忧草 127  
 扶郎花 74  
 扶桑 139  
 拟蝶唇兰 166  
 旱金莲 204  
 旱荷 204  
 旱莲花 204  
 杜虹花 206

杜鹃 154  
 杜鹃花 90  
 杨桃 168  
 杨莓花 16  
 步步高 79  
 牡丹 184  
 牡丹海棠 47  
 状元红 208  
 纹瓣悬铃花 137  
 肖粉凌霄 50  
 芙蓉 156  
 芙蓉花 138  
 芙蓉莲 33  
 芙蓉葵 138  
 芙蓉 156  
 花毛茛 184  
 花叶万年青 31  
 花叶水竹草 64  
 花叶芋 30  
 花桃 185  
 花烛 29  
 花绣球 177  
 花菖蒲 104  
 花菱草 172  
 花豌豆 117  
 芳兰山肉桂 109  
 芳香草 40  
 芹菜花 184  
 苏铁 85  
 苏薄荷 107  
 豆腐花 25  
 豆瓣绿 175  
 豆瓣菜 175  
 赤瑾 140  
 辛夷 136  
 迎春 157  
 陆莲花 184  
 驱蚊草 97  
 鸡公花 15  
 鸡爪三七 82  
 鸡血藤 118  
 鸡冠 15  
 鸡冠头 15  
 鸡冠花 15  
 鸡冠苋 15  
 鸡冠刺桐 116  
 鸡蛋花 26  
 鸡麻 188  
 麦杆菊 76  
 龟背竹 31  
 龟背芋 31

## 八画

乳毛紫金牛 151

侧耳根 194  
 兔儿牡丹 171  
 兔子花 179  
 兔耳花 179  
 刺荚黄槐 112  
 刺荚槐 112  
 刺桐 117  
 呼喝草 118  
 垂盆草 122  
 夜兰香 43  
 夜交藤 178  
 夜光花 80  
 夜合树 110  
 夜来香 43  
 夜香花 43  
 奇香花 204  
 官样花 132  
 宝石莲灯 144  
 宝莲花 144  
 岩佳 159  
 披散爵床 13  
 拖鞋兰 165  
 招财进宝 113  
 昙花 56  
 松叶牡丹 179  
 松红梅 153  
 松鼠尾 83  
 果蒲桃 152  
 欧洲报春 180  
 欧洲银莲花 182  
 欧洲樱草 180  
 欧锦葵 141  
 法国美人蕉  
 泡叶冷水花 206  
 波浪竹芋 142  
 波斯毛茛 184  
 泽米叶天南星 37  
 泽米芋 37  
 浅紫花酢浆草 167  
 爬山虎 211  
 爬树藤 39  
 爬墙虎 211  
 狗牙花 25  
 狗贴耳 194  
 玫瑰海棠 46  
 直立山牵牛 12  
 知羞草 118  
 细叶雪茄花 133  
 细叶萼距花 133  
 细叶榕 147  
 细斑粗肋草 31  
 肥猪草 33  
 肯氏南洋杉 40  
 苞叶芋 34



苞米兰 121  
 若榴 181  
 英丹 191  
 英丹花 191  
 英冠玉 58  
 英雄树 53  
 苹果竹芋 142  
 苹婆 202  
 茉莉 158  
 茉莉花 158  
 虎耳草 195  
 虎舌红 151  
 虎尾兰 131  
 虎刺 92  
 虎刺梅 92  
 转日莲 75  
 软枝黄蝉 22  
 郁金香 131  
 金凤 115  
 金凤花 40  
 金凤花 45  
 金币树 37  
 金丝荷叶 195  
 金叶木 12  
 金叶假连翘 208  
 金边瑞香 204  
 金红茵芋 192  
 金纽扣 77  
 金花茶 203  
 金鸡菊 71  
 金庞 181  
 金杯花 201  
 金杯藤 201  
 金线吊乌龟 146  
 金英花 172  
 金鱼草 196  
 金姜花 213  
 金星菊 71  
 金脉爵床 12  
 金钟花 52  
 金香藤 27  
 金晃 58  
 金盏 69  
 金盏花 69  
 金盏菊 69  
 金莲花 204  
 金钱树 37  
 金铃花 137  
 金弹子 87  
 金梅 157  
 金银花 62  
 金银藤 62  
 金琥 56  
 金粟 159

金粟兰 64  
 金腰带 157  
 金罌 181  
 金蕊 70  
 钓钟柳 198  
 雨伞朱 152  
 青苹果竹芋 142  
 青紫色 94  
 非洲万寿菊 76  
 非洲凤仙花 45  
 非洲凌霄 50  
 非洲堇 99  
 非洲菊 74  
 非洲紫苣苔 99  
 非洲紫罗兰 99  
 鱼柳梅 153  
 鱼腥草 194  
 齿叶薰衣草 106  
 变叶木 91

## 九画

冠状银莲花 182  
 刺柿 87  
 剑兰 103  
 剑叶竹芋 142  
 勋章花 73  
 勋章菊 73  
 南洋杉 40  
 南美水仙 19  
 南美苏铁 86  
 南美蟛蜞菊 79  
 咪头 55  
 姜花 213  
 将离 183  
 思维树 148  
 急性子 45  
 扁担树 110  
 扁樱桃 152  
 挂兰 122  
 指天椒 199  
 指甲花 45  
 指甲草 45  
 星点藤 34  
 映山红 90  
 春梅 186  
 春菊 68  
 柳木子 27  
 柳叶桃 26  
 柳桃 26  
 栀子 190  
 标竿花 102  
 树兰 163  
 树型杜鹃 88  
 洋凤仙 45

洋水仙 128  
 洋水仙 21  
 洋玉兰 136  
 洋芍药 72  
 洋晚香玉 102  
 洋桃 168  
 洋桔梗 96  
 洋绣球 97  
 洋荷花 131  
 洋常春藤 38  
 洋彩雀 196  
 洋紫苏 105  
 洋葵 97  
 洋蒲桃 153  
 洋蝴蝶 97  
 洒金花 45  
 洒金榕 91  
 洛阳王 184  
 洛阳石竹 63  
 洛阳花 63  
 炮仗竹 198  
 炮仗花 51  
 炮仗藤 51  
 炮弹树 48  
 独脚莲 29  
 狮子花 25  
 玻璃海棠 46  
 玻璃翠 46  
 珊瑚刺桐 115  
 珊瑚油桐 95  
 珊瑚树 115  
 珊瑚树 95  
 珍珠兰 64  
 珍珠宝莲 144  
 珍珠宝莲 207  
 相思格 110  
 秋海棠 47  
 穿地龙 79  
 绒叶合果芋 36  
 绒花树 110  
 美丁花 144  
 美人树 53  
 美人樱 210  
 美女樱 210  
 美叶凤尾蕉 86  
 美叶芋 28  
 美丽口红花 98  
 美丽月见草 161  
 美丽异木棉 53  
 美丽姜花 213  
 美国土豆 54  
 美国芦荟 120  
 美轮菊 76  
 美蕊花 112

耐冬 202  
 胜红蓟 67  
 胜春 187  
 茶花 202  
 茶花海棠 47  
 草五色梅 210  
 草夹竹桃 177  
 草芙蓉 138  
 草茉莉 155  
 草桂花 84  
 草绣球 195  
 草象牙红 108  
 草紫罗兰 84  
 草麝香 131  
 虾爪凤梨 55  
 觉树 148  
 费通花 10  
 贺春红 154  
 迷你龟背竹 32  
 重瓣玛格丽特 68  
 重瓣栀子花 191  
 钟花 60  
 钩兰 122  
 首乌 178  
 首冠藤 111  
 香柏 173  
 香菇草 205  
 香雪兰 102  
 香蕉花 135  
 香豌豆 117  
 鬼脸花 210

## 十画

倒挂金钟 160  
 倒挂金钩 102  
 凉粉子 148  
 凉粉果 148  
 凌霄 48  
 唐菖蒲 103  
 唐棉 41  
 圆叶竹芋 142  
 圆叶冷水花 206  
 圆叶椒草 174  
 圆叶蔓绿绒 32  
 圆锥果子蔓 55  
 圆锥擎天 55  
 姬凤梨 54  
 家桑 149  
 射干 101  
 扇芭蕉 150  
 捕蝇草 86  
 旅人木 150  
 旅人蕉 150  
 晃玉 93



晚山茶 202  
 栗子树 54  
 栗豆树 113  
 桂兰 122  
 桂花 159  
 桂圆菊 77  
 桃红 26  
 桃花 185  
 桑 149  
 桑树 149  
 桔梗 61  
 桔梗石竹 177  
 浪星竹芋 142  
 海石榴 181  
 海红豆 110  
 海芋 29  
 海芒果 24  
 海寿花 178  
 海南龙血树 124  
 海星花 54  
 海桐 117  
 海桐 176  
 海桐花 176  
 涂林 181  
 烧酒花 135  
 爱之蔓 41  
 爱情草 106  
 珠兰 64  
 瓶子花 200  
 瓶子草 194  
 瓶兰花 87  
 瓷玫瑰 212  
 益智 212  
 益智子 212  
 秘鲁百合 17  
 笔筒树 84  
 粉花茼蒿菊 68  
 粉花绣线菊 190  
 粉苞酸脚杆 144  
 粉萼鼠尾草 108  
 绣球 195  
 翅叶槐 112  
 翅荚黄槐 112  
 胭脂花 155  
 臭芙蓉 78  
 臭菊 78  
 臭菊花 78  
 荷包牡丹 171  
 荷包花 197  
 荷叶椒草 175  
 荷花 156  
 荷花玉兰 136  
 莲 156  
 莲生桂子花 40

莲花 156  
 莲花掌 81  
 莲雾 153  
 莺哥凤梨 55  
 蚊净香草 97  
 蚌兰 66  
 蚌壳草 86  
 袖珍椰子 170  
 透白草 205  
 透骨草 45  
 酒杯花 27  
 酒瓶兰 130  
 酒椰子 170  
 酒醉芙蓉 138  
 钱葵 141  
 铁丝草 14  
 铁苋菜 91  
 铁线草 14  
 铁线蕨 14  
 铁树 123  
 铁树 85  
 铁拳头 77  
 铁海棠 92  
 铃儿草 171  
 铃铛花 61  
 高山积雪 92  
 高尚芦荟 120  
 鸳鸯茉莉 199

## 十一画

兜兰 165  
 婪尾春 183  
 巢蕨 43  
 常春藤 39  
 常绿凌霄 52  
 弹簧草 13  
 彩叶芋 30  
 彩叶草 105  
 彩色椒 199  
 情客 159  
 救军粮 187  
 断肠草 27  
 曼陀罗树 202  
 梅花 186  
 梭鱼草 178  
 深裂叶羊蹄甲 111  
 犁食 183  
 猪仔笼 154  
 猪笼草 154  
 猫儿脸 210  
 猫尾红 90  
 球兰 42  
 球根秋海棠 47  
 痒痒树 132

硕苞蔷薇 188  
 粗糠仔 206  
 绿元宝 113  
 绿叶仙龙血树 126  
 绿巨人 35  
 绿巨人白掌 35  
 绿萝 33  
 菊花 70  
 菖兰 103  
 菡萏 156  
 菩提树 148  
 菲律宾蜡花 212  
 萍蓬草 156  
 萍蓬莲 156  
 萝卜海棠 179  
 蛇木 84  
 蛇目菊 71  
 蛇尾蔓 27  
 蛋黄花 26  
 象牙白 92  
 象牙红 115  
 象牙红 116  
 象牙红 93  
 象牙球金琥 56  
 象耳 107  
 象耳芋 29  
 象腿树 130  
 野毛栗 188  
 野芋 29  
 野萱花 101  
 铜钱草 205  
 银巨冠 65  
 银边翠 92  
 银花 62  
 银星绿萝 34  
 银脉凤尾蕨 180  
 银脉合果芋 36  
 银斑万年青 31  
 雪松 173  
 雪绢 65  
 雪铁芋 37  
 领圈花 107  
 黄大蒜 102  
 黄水仙 21  
 黄兰蝉 22  
 黄花 127  
 黄花 70  
 黄花夹竹桃 27  
 黄花夜香树 200  
 黄刺玫 189  
 黄刺金琥 56  
 黄刺莓 189  
 黄环 119  
 黄金叶 208

黄金茄 24  
 黄金珊瑚 51  
 黄金盏 69  
 黄金莲 156  
 黄金葛 33  
 黄鸢尾 104  
 黄度梅 186  
 黄梔 190  
 黄脉爵床 12  
 黄钟花 52  
 黄瓶子花 200  
 黄翁 58  
 黄莺 22  
 黄菊 71  
 黄菖蒲 104  
 黄蝉 22  
 黄鳝藤 51

## 十二画

傅延年 70  
 喜马拉雅杉 173  
 喜马拉雅松 173  
 喜姆比兰 162  
 喷泉树 51  
 奥贝沙 93  
 富红蝎尾蕉 150  
 富贵子 202  
 富贵竹 126  
 富贵花 184  
 富贵籽 152  
 斑叶水竹草 64  
 斑叶垂枝椒草 176  
 斑芝树 53  
 斑花菊 77  
 景天树 80  
 朝天椒 199  
 朝开暮落花 140  
 朝阳花 75  
 棋盘花 137  
 棋盘花 141  
 棕竹 171  
 棣棠 186  
 棱叶龙舌兰 16  
 溅红草 11  
 猩猩木 93  
 琴叶珊瑚 95  
 琴叶榕 147  
 琴叶樱 95  
 琴叶橡皮树 147  
 琼花 56  
 番茉莉 199  
 番樱桃 152  
 番蕉 85  
 番薯花 201



短穗鱼尾葵 170  
硬枝老鸦嘴 12  
硬骨凌霄 52  
筋头竹 171  
紫丁香 159  
紫乌藤 178  
紫叶山酢浆草 167  
紫叶酢浆草 167  
紫玉兰 136  
紫龙须 62  
紫阳花 195  
紫花含笑 135  
紫芳草 96  
紫芸藤 50  
紫夜香花 200  
紫松果菊 73  
紫罗兰 84  
紫茉莉 155  
紫轮菊 76  
紫金花 132  
紫星花 96  
紫绒三七 74  
紫背万年青 66  
紫背竹芋 143  
紫背桂 94  
紫荆 113  
紫瓶儿花 200  
紫铃藤 50  
紫椎花 73  
紫葳 48  
紫鹅绒 74  
紫锦凤梨 54  
紫薇 132  
紫藤 119  
缅梔 26  
缅桂 134  
缎子花 78  
腊花 42  
萱草 127  
落雪泥 99  
葡萄水仙 130  
葡萄风信子 130  
葡萄百合 130  
葡萄麝香兰 130  
葫芦树 48  
葵花 75  
裂叶落地生根 82  
道拉基 61  
铺地马鞭草 210  
阔叶铁树 86  
雁来红 23  
雄黄兰 102  
鲁贝拉茵芋 192  
鹅掌柴 39

鹅掌藤 39  
黑心花 77  
黑心金光菊 77  
黑心菊 77  
黑叶观音莲 28  
黑美人 13  
黑眼菊 77  
黑塔子 87

### 十三画

新几内亚凤仙 44  
满天星 192  
满条红 113  
照山红 90  
瑞兰 204  
睡香 204  
睡莲 157  
矮生伽蓝菜 82  
矮生椰子 170  
矮牵牛 201  
矮棕 170  
碎叶冬青 192  
碎米兰 145  
福禄考 177  
蒜香藤 50  
蒲包花 197  
蓝心菊 76  
蓝目菊 76  
蓝花丹 177  
蓝花豆 114  
蓝花鼠尾草 108  
蓝茉莉 177  
蓝壶花 130  
蓝瓶花 130  
蓝眼菊 76  
蓝雪花 177  
蓝蝴蝶 114  
蓬莱花 204  
蓬莱蕉 31  
虞美人 172  
蛾形文心兰 166  
蜂窝菊 78  
裸枝树 113  
赧桐 208  
跳舞兰 164  
辐射叶鹅掌柴 37  
锦上添花 60  
锦绣杜鹃 89  
锦被花 172  
锦紫 105  
锦葵 141  
锦蔓长春 28  
雏菊 68  
雷神 16

### 十四画

嘉德丽亚兰 161  
墙下红 108  
嫣红蔓 11  
嫦娥奔月 80  
榕树 147  
滴水观音 29  
瘦客 187  
碧冬茄 201  
碧桃 185  
端午锦 137  
翠叶芦荟 120  
翠绿玉 58  
翠雀花 183  
翠锦口红花 98  
翡翠景天 83  
舞女兰 164  
蔓长春 28  
蔓花生 111  
蔓性椒草 176  
蜀葵 137  
蜘蛛抱蛋 122  
蜡兰 42  
蜡烛花 29  
蜡烛树 49  
蜡菊 76  
蝇夹子 86  
褐斑伽蓝 83  
赛牡丹 172  
鲜艳杜鹃 89

### 十五画

墨铎 126  
德国报春 180  
暹姜 211  
橡皮树 146  
橡胶榕 146  
澳洲茶树 153  
澳洲鸭脚木 37  
熟季花 137  
瘤瓣兰 164  
箭叶芋 36  
耬斗花 182  
耬斗菜 182  
蕺菜 194  
蝴蝶兰 166  
蝴蝶花 210  
蝴蝶花 213  
蝴蝶花豆 114  
蝴蝶姜 213  
蝴蝶梅 210  
蝶兰 166  
蝶豆 114

趣情莲 81  
趣蝶莲 81  
醉蝶花 62  
飘香藤 25  
鲤鱼胆 132  
鹤顶兰 165

### 十六画以上

橙黄土三七 74  
燕子掌 80  
瓢瓜木 48  
糖钵 188  
薄荷 107  
薜荔 148  
避火蕉 85  
鞠 70  
藤萝 119  
鹰爪 21  
鹰爪兰 21  
鹰爪花 21  
攀枝花 53  
爆仗红 108  
爆仗花 198  
爆竹花 198  
藿香蓟 67  
蟹爪 60  
蟹爪兰 60  
蟹爪莲 60  
蟹叶姬凤梨 54  
麒麟花 92  
魔鬼藤 33  
鳞秕苏铁 86  
霸王花 59  
麝香豌豆 117



# 拉丁学名索引

## A

*Abutilon striatum* 金铃花 137  
*Acalypha reptans* 红尾铁苋 90  
*Acalypha wilkesiana* 红桑 91  
*Achillea millefolium* 西洋蓍草 66  
*Adenantha pavonina* var. *microsperma* 海红豆 110  
*Adiantum capillus-veneris* 铁线蕨 14  
*Aeschynanthus radicans* 毛萼口红花 98  
*Aeschynanthus speciosus* 美丽口红花 98  
*Agave potatorum* var. *verscheffeltii* 雷神 16  
*Ageratum conyzoides* 藿香蓟 67  
*Aglaia odorata* 米兰 145  
*Albizia julibrissin* 合欢 110  
*Allamanda cathartica* 软枝黄蝉 22  
*Allamanda neriifolia* 黄蝉 22  
*Alocasia amazonica* 观音莲 28  
*Alocasia macrorrhiza* 海芋 29  
*Aloe nobilis* 不夜城芦荟 120  
*Aloe vera* 库拉索芦荟 120  
*Alonsoa warscewiczii* 心叶假面花 196  
*Alpinia galanga* 红豆蔻 211  
*Alpinia oxyphylla* 益智 212  
*Alstroemeria aurantiaca* 六出花 17  
*Alternanthera dentate* cv. *Rubiginosa* 大叶红草 15  
*Althaea rosea* 蜀葵 137  
*Amygdalus persica* 桃花 185  
*Anemone coronaria* 欧洲银莲花耬斗菜 182  
*Anthurium andraeanum* 红掌 29  
*Anthurium scherzerianum* 火鹤花 30  
*Antirrhinum majus* 金鱼草 196  
*Aquilegia vulgaris* 182  
*Arachis duranensis* 蔓花生 111  
*Araucaria cunninghamii* 南洋杉 40  
*Ardisia crenata* 朱砂根 152  
*Ardisia mamillata* 虎舌红 151  
*Areca triandra* 三药槟榔 169  
*Argyranthemum gracile* cv. *Double Pink* 重瓣玛格丽特 68  
*Armeniaca mume* 梅花 186  
*Artabotrys hexapetalus* 鹰爪花 21  
*Asclepias curassavica* 马利筋 40  
*Asparagus setaceus* 文竹 121  
*Aspidistra elatior* 蜘蛛抱蛋 122  
*Averrhoa carambola* 阳桃 168

## B

*Bauhinia corymbosa* 首冠藤 111  
*Begonia mannii* 丽格海棠 46  
*Begonia semperflorens* 四季秋海棠 46  
*Begonia* spp. 秋海棠 47  
*Begonia tubehybrida* 球根秋海棠 47  
*Belamcanda chinensis* 射干 101  
*Bellis perennis* 雏菊 68  
*Bombax ceiba* 木棉 53  
*Bougainvillea spectabilis* 叶子花 154  
*Brunfelsia acuminata* 鸳鸯茉莉 199

## C

*Caladium bicolor* 花叶芋 30  
*Calathea makoyana* 孔雀竹芋 141  
*Calathea rotundifolia* cv. *Fasciata* 苹果竹芋 142  
*Calathea rufibara* cv. *Wavestar* 波浪竹芋 142  
*Calceolaria crenatiflora* 蒲包花 197  
*Calendula officinalis* 金盏菊 69

*Calliandra haematocephala* 朱樱花 112  
*Callicarpa formosana* 杜虹花 206  
*Calonyction aculeatum* 月光花 80  
*Camellia japonica* 山茶 202  
*Camellia nitidissima* 金花茶 203  
*Campanula medium* 风铃草 60  
*Campsis grandiflora* 凌霄 48  
*Canna generalis* 大花美人蕉 61  
*Capsicum annuum* var. *conoides* 观赏辣椒 199  
*Caryota mitis* 短穗鱼尾葵 170  
*Cassia alata* 刺莢黄槐 112  
*Castanospermum australe* 开心果 113  
*Catharanthus roseus* 长春花 23  
*Cattleya* spp. 卡特兰 161  
*Cedrus deodara* 雪松 173  
*Ceiba speciosa* 美丽异木棉 53  
*Celosia cristata* 鸡冠花 15  
*Cerbera mangha* 海芒果 24  
*Cercis chinensis* 紫荆 113  
*Ceropegia woodii* 爱之蔓 41  
*Cestrum aurantiacum* 黄瓶子花 200  
*Cestrum purpureum* 紫瓶儿花 200  
*Chamaedorea elegans* 袖珍椰子 170  
*Chloranthus spicatus* 珠兰 64  
*Chlorophytum comosum* 吊兰 122  
*Chrysanthemum morifolium* 70  
*Cieome spinosa* 醉蝶花 62  
*Cineraria cruenta* 瓜叶菊菊花 70  
*Cinnamomum kotoense* 兰屿肉桂 109  
*Citrus medica* var. *sarcodactylis* 佛手 193  
*Clerodendrum japonicum* 赧桐 208  
*Clerodendrum thomsonae* 龙吐珠 207  
*Clitoria ternatea* 蝶豆 114  
*Clivia miniata* 君子兰 17  
*Codiaeum variegatum* 变叶木 91  
*Coleus blumei* 彩叶草 105  
*Cordyline fruticosa* 朱蕉 123  
*Coreopsis basalis* 金鸡菊 71  
*Coreopsis tinctoria* 蛇目菊 71  
*Crassula portulaca* 玉树 80  
*Crescentia cujete* 炮弹树 48  
*Crinum asiaticum* var. *sinicum* 文殊兰 18  
*Crocasmia crocosmiflora* 102  
*Cryptanthus acaulis* 姬凤梨 54  
*Cuphea hyssopifolia* 细叶雪茄花 133  
*Cycas revoluta* 苏铁 85  
*Cyclamen perstcum* 仙客来 179  
*Cymbidium hybrid* 大花蕙兰 162  
*Cymbidium* spp. 中国兰花 162

## D

*Dahlia pinnata* 大丽花 72  
*Daphne odora* f. *marginata* 金边瑞香 204  
*Delonix regia* 凤凰木 115  
*Delphinium grandiflorum* 大花翠雀 183  
*Dendrobium* spp. 石斛兰 163  
*Dicentra spectabilis* 荷包牡丹 171  
*Dieffenbachia picta* 花叶万年青 31  
*Dionaea muscipula* 捕蝇草 86  
*Diospyros cathayensis* 金弹子 87  
*Diranthus chinensis* 石竹 63  
*Dracaena arborea* 也门铁 123  
*Dracaena cambodiana* 山海带 124



*Dracaena fragrans* 巴西铁 124  
*Dracaena marginata* 千年木 125  
*Dracaena reflexa* 百合竹 125  
*Dracaena sanderiana* 富贵竹 126  
*Duranta repens* cv. Dwarf Yellow 金叶假连翘 208

## E

*Echeveria peacockii* 石莲花 81  
*Echinacea purpurea* 紫锥花 73  
*Echinocactus grusonii* 金琥 56  
*Elaeocarpus apiculatus* 尖叶杜英 87  
*Epidendrum* spp. 树兰 163  
*Epiphyllum oxypetalum* 昙花 56  
*Ervatamia divaricata* cv. Gouyahua 狗牙花 25  
*Erythrina corallodendron* 珊瑚刺桐 115  
*Erythrina crista-galli* 鸡冠刺桐 116  
*Erythrina variegates* 刺桐 117  
*Eschscholtzia californica* 花菱草 172  
*Etlingera elatior* 瓷玫瑰 212  
*Eucharis grandiflora* 南美水仙 19  
*Eugenia uniflora* 红果子 152  
*Euphorbia marginata* 银边翠 92  
*Euphorbia milii* 虎刺梅 92  
*Euphorbia obesa* 布纹球 93  
*Euphorbia pulcherrima* 一品红 93  
*Eustoma russellianum* 洋桔梗 96  
*Exacum affine* 紫芳草 96  
*Excoecaria cochichinensis* 红背桂 94

## F

*Fagraea ceilanica* 灰莉 132  
*Fallopia multiflora* 178  
*Fatsia japonica* 八角金盘 38  
*Ficus lyrata* 琴叶榕 147  
*Ficus microcarpa* 榕树 147  
*Ficus pumila* 薜荔 148  
*Ficus religiosa* 菩提树 148  
*Ficus elastica* 橡皮树 146  
*Fittonia verschaffeltii* var. *argyroneura* 白网纹草 10  
*Fittonia verschaffeltii* 红网纹草 10  
*Freesia refracta* 小苍兰火星花 102  
*Fuchsia hybrida* 倒挂金钟 160

## G

*Gardenia jasminoides* var. *fortuniana* 白蟾 191  
*Gardenia jasminoides* 栀子 190  
*Gasteria maculata* 墨兰 126  
*Gaura lindheimeri* 山桃草 160  
*Gazania splendens* 勋章菊 73  
*Gerbera jamesonii* 非洲菊 74  
*Gladiolus gandavensis* 唐菖蒲 103  
*Gomphocarpus physocarpus* 气球果 41  
*Gomphrena globosa* 千日红 16  
*Guzmania conifera* 圆锥擎天 55  
*Gynura aurantiana* 紫鹅绒非洲菊 74

## H

*Haemanthus multiflorus* 网球花 19  
*Hedera helix* 洋常春藤 38  
*Hedera nepalensis* var. *sinensis* 常春藤 39  
*Hedychium coronarium* 姜花 213  
*Hedychium gardnerianum* 金姜花 213  
*Helianthus annuus* 向日葵 75  
*Helichrysum bracteatum* 麦杆菊 76  
*Heliconia caribaea* H. *bihai* cv. Richmond Red 富红蝎尾蕉 150  
*Hemerocallis fulva* 萱草 127  
*Hibiscus moscheutos* 芙蓉葵 138  
*Hibiscus mutabilis* 木芙蓉 138  
*Hibiscus rosa-sinensis* 扶桑 139  
*Hibiscus syriacus* 木槿 140  
*Hippeastrum rutilum* 朱顶红 20

*Houttuynia cordata* 鱼腥草 194  
*Hoya carnosa* 球兰 42  
*Hyacinthus orientalis* 风信子 128  
*Hydrangea macrophylla* 八仙花 195  
*Hydrocotyle vulgaris* 香菇草 205  
*Hylocereus undulatus* 火龙果 57  
*Hypoestes phyllostachya* 嫣红蔓 11

## I

*Impatiens balsaming* 凤仙花 45  
*Impatiens hawkeri* 新几内亚凤仙 44  
*Impatiens walleriana* 非洲凤仙花 45  
*Iris delavayi* 长葶鸢尾 103  
*Iris ensata* var. *hortensis* 花菖蒲 104  
*Iris pseudacorus* 黄菖蒲 104  
*Ixora chinensis* 龙船花 191

## J

*Jasminum nudiflorum* 迎春 157  
*Jasminum sambac* 茉莉花 158  
*Jatropha integerrima* 琴叶珊瑚 95  
*Jatropha podagrica* 佛肚树 95

## K

*Kalanchoe blossfeldiana* 长寿花 82  
*Kalanchoe laciniata* 鸡爪三七 82  
*Kalanchoe synsepala* 趣蝶莲 81  
*Kalanchoe tomentosa* 褐斑伽蓝 83  
*Kerria japonica* 棣棠 186  
*Kniphofia uvaria* 火把莲 128

## L

*Lagerstroemia indica* 紫薇 132  
*Lagerstromia speciosa* 大花紫薇 133  
*Lantana camara* 五色梅 209  
*Lathyrus odoratus* 香豌豆 117  
*Lavandula dentata* 齿叶薰衣草 106  
*Lavandula pinnata* 羽叶薰衣草 106  
*Leptospermum scoparium* 松红梅 153  
*Lilium* spp. 百合花 129  
*Lithops* spp. 生石花 14  
*Lonicera japonica* 金银花 62  
*Loropetalum chinense* var. *rubrum* 红继木 100

## M

*Magnolia grandiflora* 荷花玉兰 136  
*Magnolia liliflora* 紫玉兰 136  
*Malva sinensis* 锦葵 141  
*Mandevilla sanderi* 飘香藤 25  
*Matthiola incana* 紫罗兰 84  
*Medinilla magnifica* 宝莲花 144  
*Melocactus amoenus* 层云 57  
*Mentha haplocalyx* 薄荷 107  
*Michelia alba* 白兰花 134  
*Michelia crassipes* 紫花含笑 135  
*Michelia figo* 含笑 135  
*Mimosa pudica* 含羞草 118  
*Mirabilis jalapa* 紫茉莉 155  
*Molucella laevis* 贝壳花 107  
*Monstera deliciosa* 龟背竹 31  
*Monstera oblique* var. *expilata* 仙洞万年青 32  
*Morus alba* 桑 149  
*Mucuna birdwoodiana* 禾雀花 118  
*Murraya paniculata* 九里香 193  
*Muscari botryoides* 葡萄风信子 130

## N

*Narcissus pseudo-narcissus* 洋水仙 21  
*Narcissus tazetta* var. *chinensis* 中国水仙 20  
*Nelumbo nucifera* 荷花 156  
*Neottopteris nidus* 鸟巢蕨 43



*Nepenthes mirabilis* 猪笼草 154  
*Nerium indicum* 夹竹桃 26  
*Nolina recurvata* 酒瓶兰 130  
*Notocactus leninghausii* 黄翁 58  
*Notocactus magnificus* 英冠玉 58  
*Nuphur pumilum* 萍蓬草 156  
*Nymphaea tetragona* 睡莲 157

O

*Oenothera speciosa* 美丽月见草 161  
*Oncidium hybrid* 文心兰 164  
*Opuntia dillenii* 仙人掌 59  
*Osmanthus fragrans* 桂花 159  
*Osteospermum ecklonis* 蓝目菊麦杆菊 76  
*Oxalis triangularis* cv. *Purpurea* 紫叶酢浆草 167

P

*Pachira macrocarpa* 发财树 54  
*Paeonia lactiflora* 芍药 183  
*Paeonia suffruticosa* 牡丹 184  
*Papaver rhoeas* 虞美人 172  
*Paphiopedilum* spp. 兜兰 165  
*Parmentiera alata* 叉叶木 49  
*Parthenocissus tricuspidata* 地锦 211  
*Pelargonium hortorum* 天竺葵 97  
*Pelargonium odoratissimum* 蚊净香草 97  
*Penstemon campanulatu* 吊钟柳 198  
*Peperomia argyreia* 西瓜皮椒草 173  
*Peperomia caperata* cv. *Autumn Leaf* 红皱椒草 174  
*Peperomia obtusifolia* 圆叶椒草 174  
*Peperomia polybotrya* 荷叶椒草豆瓣绿 175  
*Peperomia scandens* cv. *Variegata* 斑叶垂枝椒草 176  
*Peperomia tetraphylla* 175  
*Petunia hybrida* 矮牵牛 201  
*Phaius tankervilliae* 鹤顶兰 165  
*Phalaenopsis hybrid* 蝴蝶兰 166  
*Philodendron oxycardium* 心叶蔓绿绒 32  
*Phlox drummondii* 福禄考 177  
*Pilea cadierei* 冷水花 205  
*Pilea nummulariifolia* 圆叶冷水花 206  
*Pistia stratiotes* 芙蓉莲 33  
*Pittosporum tobira* 海桐 176  
*Platycodon grandiflorus* 桔梗 61  
*Plumbago auriculata* 蓝雪花 177  
*Plumeria rubra* cv. *Acutifolia* 鸡蛋花 26  
*Podranea ricasoliana* 紫芸藤 50  
*Pontederia cordata* 梭鱼草何首乌 178  
*Portulaca grandiflora* 太阳花 179  
*Primula vulgaris* 欧洲报春 180  
*Pseudocalymma alliaceum* 蒜香藤 50  
*Psychopsis papilio* 拟蝶唇兰 166  
*Pteris ensiformis* cv. *Victoriae* 银脉凤尾蕨 180  
*Punica granatum* 石榴 181  
*Pyracantha fortuneana* 火棘 187  
*Pyrostegia venusta* 炮仗花 51

R

*Ranunculus asiaticus* 花毛茛 184  
*Ravenala madagascariensis* 旅人蕉 150  
*Rhapis excelsa* 棕竹 171  
*Rhododendron hybrida* 石楠杜鹃 88  
*Rhododendron hybrida* 西洋杜鹃 88  
*Rhododendron pulchrum* 毛鹃 89  
*Rhododendron simsii* 杜鹃花 90  
*Rhodoleia championii* 红花荷 100  
*Rhodotypos scandens* 鸡麻 188  
*Rhoeo spathacea* 小蚌花 66  
*Rosa bracteata* 硕苞蔷薇 188  
*Rosa hybrida* 月季 187  
*Rosa xanthina* 黄刺玫 189  
*Rudbeckia hirta* 黑心菊 77

*Russelia equisetiformis* 炮仗竹 198

S

*Saintpaulia ionantha* 非洲紫罗兰 99  
*Salvia farinacea* 蓝花鼠尾草 108  
*Salvia splendens* 一串红 108  
*Sanchezia nobilis* 金脉爵床 12  
*Sansevieria trifasciata* 131  
*Saraca dives* 中国无忧树 119  
*Sarracenia purpurea* 瓶子草 194  
*Saxifraga stolonifera* 虎耳草 195  
*Schefflera actinophylla* 澳洲鸭脚木 37  
*Schefflera arboricola* 鹅掌柴 39  
*Schlumbergera bridgesii* 仙人指 59  
*Scindapsus aureus* 绿萝 33  
*Scindapsus pictus* cv. *Argyraeus* 星点藤 34  
*Sedum morganianum* 白菩提 83  
*Serissa japonica* 六月雪 192  
*Sinningia speciosa* 大岩桐 99  
*Skimmia japonica* cv. *Rubella* 鲁贝拉茵芋 192  
*Solandra nitida* 金杯藤 201  
*Spathiphyllum floribundum* cv. *Clevelandii* 白鹤芋 34  
*Spathiphyllum floribundum* cv. *Maura Loa* 绿巨人 35  
*Spathodea campanulata* 火焰木 51  
*Sphaeropteris lepifera* 笔筒树 84  
*Spilanthus oleracea* 桂圆菊 77  
*Spiraea japonica* 日本绣线菊 190  
*Stephania dielsiana* 金线吊乌龟 146  
*Sterculia nobilis* 苹婆 202  
*Stromanthe sanguinea* 紫背竹芋 143  
*Syngonium podophyllum* 合果芋 36  
*Syngonium wendlandii* 绒叶合果芋 36  
*Syringa oblata* 紫丁香 159  
*Syzygium samarangense* 洋蒲桃 153

T

*Tagetes erecta* 万寿菊 78  
*Tagetes patula* 孔雀草 78  
*Tecoma stans* 黄钟花 52  
*Tecomaria capensis* 硬骨凌霄 52  
*Telosma cordata* 夜来香 43  
*Thalia dealbata* 水竹芋 143  
*Thevetia peruviana* 黄花夹竹桃 27  
*Thunbergia erecta* 硬枝老鸦嘴 12  
*Thunbergia grandiflora* 大花老鸦嘴 13  
*Tradescantia fluminensis* cv. *Variegata* 斑叶水竹草 64  
*Tradescantia sillamontana* 白雪姬 65  
*Tropaeolum majus* 旱金莲 204  
*Tulipa gesneriana* 郁金香虎尾兰 131

U

*Urachites lutea* 金香藤 27

V

*Vanda* spp. 万代兰 167  
*Verbena hybrida* 美女樱 210  
*Vinca major* 蔓长春 28  
*Viola tricolor* 三色堇 210  
*Vriesea carinata* 莺哥凤梨 55

W

*Wedelia trilobata* 南美蟛蜞菊 79  
*Wistevia sinensis* 紫藤 119

Z

*Zamia furfuracea* 鳞秕苏铁 86  
*Zamioculcas zamiifolia* 金钱树 37  
*Zebrina purpusii* 吊竹梅 65  
*Zinna elegans* 百日草 79  
*Zygocactus truncatus* 蟹爪兰 60



# 参考文献

【1】薛聪贤编著：《台湾花卉实用图鉴》，台湾普绿有限公司，1998年

【2】金波编辑著：《常用花卉图谱》，中国农业出版社，1998年

【3】克里斯托弗·布里克尔主编：《世界园林植物与花卉百科全书》，河南科技出版社，2005年

【4】曾宋君，段俊姜编著：《姜目花卉》，中国林业出版社，2003年

【5】中国科学院中国植物志编辑委员会：《中国植物志》，科学出版社，1979—2004年

【6】徐民生、谢维荪编著：《仙人掌类及多肉植物》，中国经济出版社，1991年

## 部分图片作者名录

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 桂鸿：P20上左图                       | P141上中图，P156右中图，P178上左图，P191左 |
| 林庆民：P157左下图                     | 下图，P203上图                     |
| 徐晔春：其他图片                        | 张波：P17右下二图                    |
| 许旭芒：P18中图，P23右图，P40右下图，P45上左    | 张永新：P17右下三图                   |
| 图，P53上右图，P62左下图，P66右图，P70上左     | 朱永斌：P14左中图                    |
| 图，P75右图，P81上左图，P82左下图，P94右图，    | 庄伟光：P124下左图                   |
| P101右图，P118右图，P122右下二图，P132右下图， |                               |